

867
Informe

DETERMINACION DE LA FAUNA FOSIL CONTENIDA EN TRECE
MUESTRAS DE SUPERFICIE PROCEDENTES DE FORTUNA (MURCIA).-

Del presente material fósil, unicamente hemos podido determinar, con cierta seguridad, el correspondiente a cinco de las muestras, que llevan las referencias: 27-35 AD-LC 81; 27-35 AD-LC 82; 27-35 AD-LC 83; 27-35 AD-LC 84 y 27-35 AD-LC 85.

El de las restantes, a semejanza de lo que ocurría en otra serie de muestras de la misma procedencia, estudiadas recientemente, está integrado por un conjunto de estructuras, que pudieran atribuirse a colonias de Algas incrustantes, y solo lo señalamos, a título de mera posibilidad ó hipótesis.

• 27-35 AD-LC 52 X

Organismos coloniales que recuerdan al género Botryococcus (?) -----

Eoceno-
Actual (?)

✓ 27-35 AD-LC 55

Posibles organismos coloniales semejantes a los de la muestra anterior. Pudiera atribuirse al genero Botryocium (?) -----

Eoceno-Actual (?)

• 27-35 AD-LC 67 ✓

Organismos coloniales, atribuibles con las consiguientes dudas a los géneros siguientes:

Dactylopora (?) sp. -----

Eoceno-Actual(?)

Acicularia (?) sp. -----

Montiense-Actual(?)

× 27-35 AD-LC 71 ✓

Organismos coloniales de género y especie indeterminables. -----

Edad indeterminada

× 27-35 AD-LC 72 ✓

Organismos coloniales (¿Algas incrustantes?) de género y especie indeterminables. -----

Edad indeterminada

× 27-35 AD-LC 73 X

Organismos coloniales que pudieran ----- ¿Cretácico?
atribuirse a Algas incrustantes. ----- ¿Terciario?

~~Falta~~ 27-35 AD-LC 78 X

Organismos coloniales (¿Algas incrustantes?)
semejantes a los de la muestra anterior. -- Posible Cretácico-
Terciario(?)

~~Falta~~ 27-35 AD-LC 81 X

Nannolytoceras tripartitum Raspail ----- Bajociense superior
Organismos coloniales de género y especie
indeterminables. ----- Edad indeterminada

× 27-35 AD-LC 82

Phylloceras aff. kudernatschi Hauer ----- Bajociense superior
Calloviense
Nannolytoceras tripartitum Raspail ----- Bajociense superior
Morphoceras aff. ocellatum Buckman ----- Bajociense-Bathon-
se inferior.

~~Falta~~ 27-35 AD-LC 83 X

Nannolytoceras cf. tripartitum Raspail ----- Bajociense superior
Lamellaptychus sp. ----- Dogger-Malm. (?)

x 27-35 AD-LC 84 X

Terebratula (Waltonithyris) cf. midfordensis Muir-Wood . -----

Bajociense-Bathonienense.

Nannolytoceras tripartitum Raspail ----

Bajociense superior.

Lamellaptychus sp. -----

Dogger-Malm.(?)

((x 27-35 AD-LC 85 X

Lamellaptychus sp. (cf. L. inflexicosta
(?) (Trauth) -----

Oxfordiense-Berriense (?)

x 27-35 AD-LC 88 X

Organismos coloniales de género y especie indeterminables. -----

Edad indeterminada

((Conclusiones..- Unicamente podemos asignar una edad determinada a las muestras siguientes:

27-35 AD-LC 81 }
27-35 AD-LC 82 }
27-35 AD-LC 83 }
27-35 AD-LC 84 }

----- Bajociense superior-Bathonienense

27-35 AD-IC 85

Posible Jurásico super:

En cuanto a las restantes muestras, en realidad no podemos atribuirles ninguna edad determinada, ya que pueden corresponder a distintos niveles dentro del Mesozoico-Terciario.