

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 5 7 9 13 15 19 P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Formación de Azuaga en proximidad del granito de Peñas Pardas. Dominio de Sierra Albarrana.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Morqueado producido por metamorfismo de contacto.

4- EDAD

PRECAMBRIICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - VALORACION-PROBABLE... P - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

MACULOSA. GRANOBLASTICA. BLASTOPELITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, SERICITA, CLORITA, CPACOS, CIRCON, OXIDOS, FRAGMENT

OS-DE-ROCA

OBSERVACIONES

Roca lutitica en origen, con escasa fracción arena, fina a muy fina, arcillosa y con fragmentos de rocas.

Metamorfismo de contacto con texturas maculosas. Recristalización de sericita-moscovita y clorita, propios de condiciones de grado muy bajo.

Fracturas con óxidos y con cuarzo.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

TARDI- A POSTHERCINICO

10- CLASIFICACION

PIZARRA MOSQUEADA (CORREANA)

ANALISIS QUIMICO

MIGMATITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1 5 7 9 13 15 19

2- DATOS DE CAMPO

Pisanos del Carbonífero Inferior en proximidad del Complejo de los Ojuelos - La Coronada. Aluvión magmático de Villavieja - La Coronada.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca pisanosa de color muy oscuro, compacta. Indicios de metamorfismo de contacto.

4- EDAD

CARBONIFERO INFERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A 44 - BUENA B 45
- DATACION ABSOLUTA B 44 VALORACION - PROBABLE P 45
- DATACION PALEONTOLOGICA C 44 - DUDOSA D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

MACULOSA BLASTOPELITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO SERICITA BIOTITA OPACOS CIRCON

Roca lutítica en origen (pisanosa), afectada por metamorfismo de contacto con neoformación incipiente de biotita

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO D - REGIONAL
B - DINAMICO E - PLURIFACIAL
C - DE SOTERRAMIENTO

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO
B - BAJO D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA MUY INCIPIENTE

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

TARDI - A POSTHERCINICA

10- CLASIFICACION

AZARRA MOSQUEADA

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGBD 2041 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Muestra de Formación de Anaga en proximidad de granito de Peñas Pardas. Dominio de Sierra Albarrana.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca bandada y con esquistosidad de espaciada oblicua a las bandas.

4- EDAD

PRECAMBRIICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - D
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION-PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLITICO BLASTICA NIVELES CON REEMPLAZAMIENTOS

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, SERICITA, MOSCOVITA, BIOTITA, PLAGIOCLASA, FELDSPATO

TO-POTASICO, OPACOS, CIRCON, ESFENA, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico-arenoso, laminado. Afectada por tres procesos sucesivos: deformación y metamorfismo regional, prácticamente obliterado. Habría producido orientación de la roca paralela al laminado primario. Blastesis de moscovita-sericita y biotita, de grano muy fino.

Reemplazamiento metasomático de plagioclasa-feldespato potásico en niveles pelíticos exclusivamente. Estaría en relación con la intrusión del granito de Peñas Pardas.

Creación de una esquistosidad de fractura, oblicua al bandado, con remodelación a la misma del feldespato potásico y la plagioclasa.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

D-A

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO B - BAJO D - ALTO

B

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Regional: Precámbrico? Hercínico? Contacto: Tardíhercínico.

10- CLASIFICACION

FILITA METASOMATIZADA (CORNEANA)

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGBD2040 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Muestra de la Formación de Azuaga afectada por metamorfismo de contacto inducido por el granito de Peña Parda. Dominio de Sierra Albarrana.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca filítica fina, esquistosada y mosqueada.

4- EDAD

PRECAMBRIKO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA ESQUISTOSA; MACULOSA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA SERICITA MOSCOVITA BIOTITA OPACOS

IRCOM OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutitico con escasa fracción arena, algo feldespática. de aspecto arenítico.

Afectada por dos procesos diferentes:

- Deformación y metamorfismo regional, que origina la esquistosidad de folio patente en la muestra, con blastosis asociada de sericita - moscovita y biotita verdosa.

- Metamorfismo de contacto, que produce textura maculosa, por concentración de óxido de Fe, y, mas localmente, recristalización decaída de las micas.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D - A

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

B

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA (REGIONAL)

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico? Tandihercínico

10- CLASIFICACION

FILITA MOSQUEADA

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGBD2038 T 15 19 CO P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

Muestra de cuarcitas negras de sucesión de esquistos y cuarcosquistos (Sucesión Montemolín). Dominio de Valencia de las Torres - Cua Mariana. Grupo de Córdoba - Fuentesovejuna.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca cuarcítica muy oscura fuertemente orientada. "Cuarcita negra".

4.- EDAD

RIFEENSE MEDIO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A VALORACION - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C VALORACION - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOBLASTICA. NIVELES MUY ESQUISTOSOS

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA FELDSPATO - POTASICO MOSCOVITA BIOTI

TA OPACOS GRAFITO EPIDOTA CLORITA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento arenoso fino, cuarcítico, con escasa componente feldespática. Fracción lutita que aparece según niveles esquistosos: corresponde a una concentración secundaria.

Afectada por deformación, con una componente dinámica importante, y metamorfismos, que crean una orientación muy importante de la roca, con granulación - recristalización del cuarzo, y concentración de la componente lutítica en niveles, en los que aparece recristalizada a moscovita - biotita - epidota - clorita.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

8.- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico ? Hercínico

10.- CLASIFICACION

CUARCITA ESQUISTOSA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA

EMP

REC

Nº MUESTRA

TA

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGBD 2037 T

CO

P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Roca arcósica de la Formación Tonesirboles, Dominio de Zafra-Alarcón, Córdoba. Cima de Villaviciosa.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca detritica, gruesa, muy feldespática, sin deformación penetrativa apreciable. Fracturillas irregulares con relleno.

4- EDAD

VENDIENSE-OVETIENSE

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA: A
- DATACION ABSOLUTA: B
- DATACION PALEONTOLOGICA: C

A

VALORACION - BUENA: B

- PROBABLE: P

- DUDOSA: D

B

P

D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOSAMITICA

46

99

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA FELDESPATO-POTASICO FRAGMENTOS-DE-R

100

153

OCAS MOSCOVITA, SERICITA, MOSCOVITA OPACOS CIRCON APATIT

154

207

0 OXIDOS

208

261

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento arenoso muy grueso, rico en feldespatos, con frecuentes fragmentos volcánicos variados, desde grano fino a cuarcocristalinos, y algunos claros de moscovita detritica. Los granos no muestran apenas redondeamiento, y están embebidos en una matriz sericitica recristalizada verosimilmente en condiciones de grado muy bajo.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO

B - DINAMICO

C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL

E - PLURIFACIAL

D

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO

B - BAJO

C - MEDIO

D - ALTO

A

266

8- ZONA METAMORFICA

SERICITA-MOSCOVITA

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Hercínico.

10- CLASIFICACION

META-ARCOSA META-ARCOSA

309

362

ANÁLISIS QUÍMICO

363

MIGMATITA

364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 536 NG BD 2032 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Roca neisica en sucesión de neises y anfibolitas (neises de Asuaga. Dominio de Valencia de las Torres. Cmo Munano. Grupo de Córdoba-Fuenteovejuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca granuda, de grano medio (granítica) fuertemente deformada.

4- EDAD

PROTEROZOICO MEDIO-SUPERIOR PROTEROZOICO MEDIO-SUPERIOR

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

MILONITICA NEISICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO ALBITA FELDSPATO-POTASICO BIOTITA OPACOS CIRCO

N CLORITA SERICITA MOSCOVITA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca granítica en origen, intensamente deformada.

La deformación es de carácter dinámico, y produce granulación del cuarzo y de bordes de grano de feldspatos, microclivisación, fracturación interna, y doblados de masas en plagioclaras. fracturas que cortan a todo (correspondían a una fase algo mas tardia) A este proceso al parecer se asocia una imponente blastesis de biotita de grano muy fino, y de sericita-moscovita sobre plagioclara.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL DB 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO B - BAJO D - ALTO A 266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico. Hercínico.

10- CLASIFICACION

PROTOMILONITA, ORTONEIS

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1 5 7 9 13 15 19 P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Calizas asociadas a serie pelítico-arenosa parecida a la Formación de Azuaga. Dominio de Obejo-Valsequillo-Puebla de la Reina. Unidad alóctona (Obejo-Espiel)

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca carbonatada recristalizada, brechificada.

4- EDAD

PRECAMBRICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION-PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOBLASTICA, BRECHIFICADA

COMPOSICION MINERALOGICA

DOLOMITA CUARZO FELDSPATO-POTASICO MOSCOVITA OXIDOS

PACOS CIRCON

OBSERVACIONES

Roca mármorea dolomítica, impura: contiene una cierta proporción de cuarsa, y de moscovita, formada probablemente a partir de sericita diseminada. El feldespato potásico podría ser componente original de la roca, pero aparece, junto a cuarsa, rellenando las múltiples fracturas originadas por brechificación.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D

7- GRADO DE METAMORFISMO

sin datos

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

sin datos

MOSCOVITA AL MENOS

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambrio y/o Hercínico.

10- CLASIFICACION

MARMOL DOLOMITICO

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGA 13018 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Formación metamórfica con macroquistas, y metapelítica al SE de Villaharta. Dominio Osejo - Valdeguilla - Pueblo de la Reina. Unidad aloctona Osejo - Espiel.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa con microplegues de aspecto fluidal.

4- EDAD

PRECAMBRIICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A VALORACION - BUENA... B

- DATAION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P

- DATAION PAL EONTOLOGICA... C 44 VALORACION - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANO LEPIDOBLASTICA ESQUISTOSA MICROPLEGADA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO SERICITA MOSCOVITA OPACOS CIRCON FELDSPATOS, OX

IDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico - arenoso, fino, algo feldespático.

Afectado por dos fases de deformación: una primera sin esquistosa y sin metamórfica. Origina la esquistosidad de flexo patente en la muestra, con blastos de sericita - moscovita lepidoblástica. Esta esquistosidad sería paralela a la laminación primaria.

La segunda origina un intenso microplegado de tendencia isoclinal de la esquistosidad anterior. A él se asocia una esquistosidad de crenulación, espaciada, en el plano axial, con reorientación mecánica importante.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL

C - DE SOTERRAMIENTO E - PLURIFACIAL 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO

B - BAJO D - ALTO 266

8- ZONA METAMORFICA

SERICITA-MOSCOVITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

CUARZO ESQUISTO

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1 5 7 9 13 15 19 P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Secuencia de esquistos y neises microlíticos (Neises de Azuaga). Dominio de Valencia de las Torres - Cova Meriana. Grupo de Córdoba - Fuenteobajuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca micácea esquistosa.

4- EDAD

PROTEROZOICO MEDIO-SUPERIOR PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - VALORACION - PROBABLE... P - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA, ESQUISTOSA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA FELDSPATO-POTASICO MOSCOVITA BIOTITA

TA GRANATE OPACOS CIRCON ESFENA TURMALINA CLORITA OXID

OS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico - arenoso, grueso, cuarcítico con una cierta proporción de feldspatos.

Se reconocen ^{tres} fases de deformación.

- Una primera sinmetamórfica, y sinesquistosa, con moscovita sinuematita y biotita y granate algo más tardíos.

- Una segunda que crea una esquistosidad espaciada, oblicua a la anterior, con reorientaciones mecánicas.

Mas tardía es una fase que crea fracturillas irregulares, subparalelas, en las que se produce depósito de plagioclasa, feldspato potásico y clorita.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL C - DE SOTERRAMIENTO E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

GRANATE

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico, Hercínico

10- CLASIFICACION

CUARZOESQUISTO CON GRANATE

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGBD 2028 T 15 19 CO P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

Material detritico del Carbonifero de la alineación magmática de Villavieja - de Coronada. Metamorfismo de contacto inducido por los gneiss del complejo de los Ojuelos.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca mosqueada con laminación primaria. En la lámina se aprecia "de visu" una esquistosidad espaciada oblicua a la laminación.

4.- EDAD

CARBONIFERO INFERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A - BUENA B - BUENA B
- DATACION ABSOLUTA B - VALORACION - PROBABLE P - B
- DATACION PALEONTOLOGICA C 44 - DUDOSA D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NIVELES BLASTOPELITICOS Y -SAMITICOS. DECUSADA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO SERICITA MOSCOVITA CLORITA ANFIBOL OPACOS CIRCO

MESFENA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutitico - arenoso, fino, laminado.

Afectada por metamorfismo de contacto, que produce blastesis decusada de sericita - moscovita, clorita - biotita y anfíbol incoloro.

De visu en la lámina se reconoce una esquistosidad espaciada, de fractura, oblicua a 50° ~~se reconoce~~

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

A 262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

B 266

8.- ZONA METAMORFICA

ANFIBOL

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Tardiberámico

10.- CLASIFICACION

CORNEANA

309

362

(Pizarra mosqueada)

ANÁLISIS QUÍMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1536 N6 B D 2019 T

PROFUNDIDAD
15

PROVINCIA
CO

CLASIFICACION EFECTUADA POR:
P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Amfibolita intercalada en neises de Azuaga. Dominio de Valencia de las Torres - Cerro Muriano. Grupo de Córdoba Fuenteovejuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca anfibólica fuertemente orientada.

4- EDAD

PROTEROZOICO MEDIO-SUPERIOR

- POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION-PROBABLE... P
- BUENA... B
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOBLASTICA BANDEADA

COMPOSICION MINERALOGICA

HORNBLENDA PLAGIOCLASA FELDSPATO-POTASICO BIOTITA OPA
COS APATITO RUTILO ESFENA SERICITA MOSCOVITA CLORITA
XIDOS

OBSERVACIONES

Roca anfibólica fuertemente orientada, bandeadada. La textura original no es precisable en absoluto, dado lo evolucionado de la actual. En cuanto a composición, sería monzonítica. Constituida actualmente por una paragénesis propia de metamorfismo producido en condiciones de grado bajo, con hornblenda y biotita (retrometamórfica??) como minerales característicos. La alteración sufrida por la plagioclasa imposibilita determinar su composición. De acuerdo con los datos regionales, esta paragénesis puede corresponder en su mayor parte a retrogradación posterior a un proceso producido en condiciones más restrictas (Gr. Medio-Alto).

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO

C - MEDIO
D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

HORNBLENDA-BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico, Hercínico

10- CLASIFICACION

AMFIBOLITA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 5 7 9 13 15 19

1536 NG BD 92 7 CO P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

Roca anfibólica en sucesión de esquistos y neises meloníticos (neises de Aguaga), Dominio de Valencia de las Torres - Curo Menano. Grupo de Córdoba - Fuentesbejauro.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca porfiroclástica esquistosada.

4.- EDAD

PRECAMBRIICO. PROTEROZO. M-S

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA. A VALORACION - BUENA. B

- DATACION ABSOLUTA. B VALORACION - PROBABLE. P

- DATACION PALEONTOLOGICA. C 44 VALORACION - DUDOSA. D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA BLASTOPORFIDICA

COMPOSICION MINERALOGICA

OLIGOCCLASA - ANDESINA HORNBLENDA FELDSPATO - POTASICO CUA

RZO EPIDOTA GRANATE CLORITA OPACOS CIRCON SERICITA OXI

DOS

OBSERVACIONES

Roca originada por el metamorfismo de una roca de composición intermedia - básica, probablemente porfídica en origen: se trataría de un pórfido o una lava andesítica.

Afectada por al menos una fase de deformación, sinmetamórfica, que origina una esquistosidad de flujo marcada por hornblenda nematoblástica, a la que acompañan granate y epidota.

Degradación (o retro metamorfismo?) ulterior, con clonificación del anfíbol y del granate y sericitización de plagioclasa.

Segregaciones y remobilizaciones de feldespato potásico.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL

C - DE SOTERRAMIENTO E - PLURIFACIAL

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO B - BAJO D - ALTO

8.- ZONA METAMORFICA

HORNBLENDA - GRANATE - OLIGOCCLASA - ANDESINA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico Hercínico

10.- CLASIFICACION

NEIS ANFIBOLICO

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 5 7 9 13 15 19 P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

La Roca neísa en sucesión de esquistos y neises miloníticos (Neises de Aguaga). Dominio de Valencia de las Torres - Ceno Meriano. Grupo de Córdoba Fuentesovejuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca feldespática, de aspecto lástico, en la que se aprecia una grossa orientación

4- EDAD

PRECAMBRIICO - PROTEROZOICO MS

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A VALORACION - BUENA B

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

CATACLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO OLIGOCLASA GRANATE CLORITA BIOTITA EPIDOTA FELD

ESPAATO - POTASICO SERICITA MOSCOVITA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca original cuarsa-feldespática de origen ígneo: podría tratarse de una roca toboosa, con grandes litoclastos y fenoclastos de plagioclasa en matriz cuarsa-lutítica, o una roca subvolcánica porfídica o gaseada plutónica granuda afectadas por un proceso dinámico.

En cualquier caso, denota los efectos de dos fases de deformación y/o metamorfismo:

- la primera originaría la blastesis de grandes cristales de granate; no se observa relación entre esta blastesis y deformación coetánea alguna.

- la segunda tendría carácter dinámico: originaría la catoclasia de la roca, con blastesis asociada de clorita-biotita verdosa y epidota más tardía

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

C - DE SOTERRAMIENTO

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

266

8- ZONA METAMORFICA

GRANATE Y CLORITA-BIOTITA VERDOSA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Cenozoico, Precámbrico, Hercínico.

10- CLASIFICACION

NEIS CATACLASTICO

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NG BD 89 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Sucesión de esquistos y neises miloníticos (neises de Aguaga). Grupo de Córdoba. Fuenteovejuna. Dominio de Valencia de las Torres - Cans Mariano.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Muestra esquistosada y microplegada, con diferenciados claros, feldespáticos.

4- EDAD

PRECAMBRIICO, PROTEROZOICO M.S.

21 PROTEROZOICO MEDIO - PROTEROZOICO SUPERIOR 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A VALORACION - BUENA B P

- DATACION ABSOLUTA B

- DATACION PALEONTOLOGICA C 44

VALORACION - PROBABLE P

- DUDOSA D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA MOSCOVITA BIOTITA GRANATE CLORITA; E 100 153

SFENA OPACOS CIRCON OXIDOS SERICITA 154 207

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico-arenoso cuaso-feldespática, afectada por dos fases de deformación:

- la primera es sinmetamórfica y sinesquistosa; y origina una esquistosidad de flexo marcada por blastesis lepidoblástica de moscovita y biotita. El granate se relaciona también con esta fase, como mineral tardicuasi-tico (corta en parte a la esquistosidad) a sinmetamórfica.
- la segunda fase origina plegues suaves de la esquistosidad previa.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL 262

C - DE SOTERRAMIENTO E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO 266

8- ZONA METAMORFICA

GRANATE 268 308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambrio, hercínico

10- CLASIFICACION

PLAGIOCLASICO

CUARZO ESQUISTO BIOTITICO CON GRANATE 309 362

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGBD 88 T 15 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Secuencia de esquistos y neises microlíticos (neises de Azuaga). Dominio de Valencia de las Torres - Cera Murano. Grupo de Córdoba - Fuentesovejuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca oscura, esquistosada. Se aprecia un suave micoplegado.

4- EDAD

PRECAMBRIICO. PROTEROZOICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - VALORACION-PROBABLE... P - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA ESQUISTOSA MICROPLEGADA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO FELDSPATO - POTASICO MOSCOVITA BIOTITA GRANATE

LAGIOCLASA CLORITA OPACOS GRAFITO CIRCON ESFENA SERICITA

OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico-arenoso cuaso-feldespático.

Se reconocen tres fases de deformación:

- La primera es sinmetamórfica. Origina una esquistosidad de flujo marcada por blastesis lepidoblástica de moscovita y escasa biotita, y blastesis de granate. Se reconoce solamente en microlitos y pliegues traspuestos por la segunda esquistosidad.

- La segunda fase es también sinesquistosa y sinmetamórfica: origina la esquistosidad más patente en la roca, marcada por blastesis sinuematítica de moscovita y clorita.

- La tercera produce pliegues de desigual desarrollo. Diferenciados y remobilizados de cuaso-feldespato potásico, cloritización del granate, en relación probablemente con la fase de

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO C - DE SOTERRAMIENTO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

GRANATE Y MOSCOVITA-CLORITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrica, Hercínico

10- CLASIFICACION

FELDSPATICO CUARZOESQUISTO CON GRANATE

1.- IDENTIFICACION

N° HOJA				EMP	REC	N° MUESTRA				TA	PROFUNDIDAD				PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:				
1	5	3	6	N	G	B	D			8	2			T						
				5	7	9				13				15	19					

2.- DATOS DE CAMPO

2.- DATOS DE CAMPO Sucesión de esquistos y neises metamórficos. Dominio de Valencia de las Torres. Cerr. Mercurio. Grupo de Córdoba - Fuentesovejuna.

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO Roca esquistosa 50% iniconocible.

4.- EDAD

PRECAMBRICO. PROTEROZO. MS

-POSICION ESTRATIGRAFICA	A	-BUENA	B
PROCEDIMIENTO-DATACION ABSOLUTA	B	VALORACION-PROBABLE	P
-DATACION PALEONTOLOGICA	C	-DUDOSA	D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPI DOBLASTICA ESQUISTOSA MILONITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA MOSCOVITA BIOTITA GRANATE ANDALUCIT

100 153

A, OF ACOS CIRCUN ESTENA, CLORITA SERICITA OXIDOS

[illegible]

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico-arenoso cuaso-fel-
despático. Afectada por dos fases tectonometamórficas:

- La primera origina la blastesis de grandes placas de moscovita sin orientación aparente alguna. La biotita ^{la andalusita} y el granate son probablemente paragenéticos con estas.

- La segunda es de carácter eminentemente dinámico. crea una esquistosidad de flujo con granulación del cuarzo y reorientación de minerales. No se aprecia recristalización metamórfica asociada a esta fase, pero probablemente se produzca la cloritización casi total del granate.

Las tardías son una esquistosidad espaciada oblicua a la anterior, y un juego de fracturas perpendiculares, que no llegan a constituir esquistosidad.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

262

D	B		
---	---	--	--

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO B C
B - BAJO D - ALTO

8.- ZONA METAMORFICA

GRANATE-ANDALUCITA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambrio, Hercínico.

10 - CLASIFICACION

PLAGIOCLAST

CUARZO ESQUISTO MOSCOWITICA CON GRANATE Y ANDALUCITA

309 36

(E.M.?)

ANALISIS QUIMICO ☐ 36.3

MIGMATITA ☐ 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 N6 B0 83 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

sucesión de esquistos y neises miloníticos (neises de Azuaga). comuna de Valencia de las Torres. Censo Mariano. Grupo de Córdoba-Fuenteobeguera.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosada, con blastos miloníticos de granate.

4- EDAD

PRECAMBRIICO. PROTEROZOICO. M.S.

2. PROTEROZOICO MEDIO - PROTEROZOICO SUPERIOR 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A

- DATACION ABSOLUTA B

- DATACION PALEONTOLOGICA C

VALORACION - BUENA B

- PROBABLE P

- DUDOSA D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA PROTEROZOICO MEDIO - PROTEROZOICO SUPERIOR

GRANOLEPIDOBLASTICA ESQUISTOSA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO MOSCOVITA BIOTITA GRANATE SILICATOS-DE-ALUMINIO

OPACOS CIRCON SERICITA-MOSCOVITA CLORITA RUTILO OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutitico - arenoso, cuarcitico.

En la muestra se aprecia una primera fase con blastesis de moscovita, biotita, granate y silicatos de aluminio (andalucita y posible estaurolita), que crecen al parecer totalmente desorientados, al menos en su mayor parte.

con posterioridad se produce una fase de deformación sinéctica, con una cierta componente dinámica, en relación con la cual se puede producir blastesis de moscovita.

Una segunda fase origina una esquistosidad de fractura espaciada oblicua a la anterior.

Degradación notable de la roca: cloritización del granate, sericitización de silicatos de aluminio.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO

B - DINAMICO

C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL

E - PLURIFACIAL

DB

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO

B - BAJO

C - MEDIO

D - ALTO

BC

266

8- ZONA METAMORFICA

GRANATE-ANDALUCITA-CESTAUROLITA?

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico, Hercínico.

10- CLASIFICACION

MICACEO

CUARZOESQUISTO CON GRANATE ANDALUCITA Y CESTAUROLITA?

309

362

ANALISIS QUIMICO

363

MIGMATITA

364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536NG8D 85 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Anfibolitas intercaladas en la sucesión de reiss de Azuaga. Dominio de Valencia de las Torres. Cmo Mercurio. Grupo de Córdoba. Fuenteovejuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca anfibolítica con bandeo tectónico muy potente

4- EDAD

PRECAMBRIICO. PROTEROZ. M-S

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NEMATOBLASTICA BANDEADA

COMPOSICION MINERALOGICA

HORNBLENDA PLAGIOCLASA CUARZO EPIDOTA CLORITA OPACOS E

SFENA CIRCON APATITO SERICITA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca anfibolítica bandeada, producida por metamorfismo regional, en condiciones de grado bajo-medio, a partir de una roca básica probablemente lávica o tobaea, de composición cuarsandesítica.

Afectada por un proceso de deformación simetamófica, que origina el bandeo, y blastesis neomatoblástica de hornblenda verdosa, paragenética con una plagioclasa de ~~baja~~ composición indeterminada (probable oligoclasa - andesina).

Se reconoce una fase posterior que origina un juego de superficies de fractura espaciadas, en relación con las cuales hay depósito de clorita - epidota. También epidota en roca.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO C - DE SOTERRAMIENTO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

BC 266

8- ZONA METAMORFICA

HORNBLENDA VERDE

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico - Hercínico

10- CLASIFICACION

ANF. SOLITA

309

362

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	BD	74	T		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Muestra muy leucocrata de los neises de Aruaga, Dominio de Valencia de las Torres - Cera Munana. Grupo de Córdoba - Fuentesobezuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca neisica con orientación bien definida

4- EDAD

PRECAMBRIKO. PROTEROZO. M.S

21 PROTEROZOICO MEDIO - PROTEROZOICO SUPERIOR 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - VALORACION - PROBABLE... P - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

MILONITICA SOBRE T. ORIGINAL GRANULAR DE GRANO MEDIO

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, ALBITA-OLIGOCLASA, FELDSPATO-POTASICO, BIOTITA, C

100 153

LORITA MUSCOVITA OPACOS ESFENA CIRCON SERICITA

154 207

208 261

OBSERVACIONES

Roca original cuarsa-feldspática, probablemente granuda de grano medio (podría corresponder a un granito o diferenciado leucocrático).

Afectada por un proceso dinámico, que origina una grossa esquistosidad, marcada por elongación, orientación y granulación de los minerales originales.

En cuanto a procesos blasticos asociados, no se reconoce con certeza ninguno: la biotita presente en la roca podría ser primaria, o bien corresponder a este tipo de procesos, al igual que la escasa moscovita reconocida.

Esquistosidad de fractura perpendicular a la dinámica.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

B 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

AB 266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA ? 268 308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambriko - Hercinico

10- CLASIFICACION

LEUCANEIS, PROTO-MILONITICA

NEIS LEUCOCRATO PROTO-MILONITICO

309 362

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NG8D 73 T 15 19 CO P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

Amfibolitas en la sucesión de neises de Azuaga.
Dominio de Valencia de las Torres. Cera Munano. Grupo de
Córdoba - Fuentesolegura.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

roca básica con deformación y meta-
morfismo. (amfibolita) orientación roca patente.

4.- EDAD

PRECAMBRIICO. PROTEROZOICO M-S

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA. A - BUENA B
- DATACION ABSOLUTA. B VALORACION - PROBABLE. P
- DATACION PALEONTOLOGICA. C 44 - DUDOSA. D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NEMATOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

ANDESINA HORNBLENDA EPIDOTA ESFENA OPACOS FELDES PATO-P

OTASICO SERICITA MOSCOVITA

OBSERVACIONES

Roca producto del metamorfismo regional en condicio-
nes de grano medio de una roca básica de compo-
sición diorítica o gabroídica, y de textura original gra-
nular de grano fino, como mas probable.

La paragénesis estable es andesina - hornblenda
marfón - verdosa. Hay blastesis de epidota presumible-
mente retro metamórfica, proceso que puede haber produ-
cido también la casi total sericitización de plagioclasa,
y la decoloración parcial del anfíbol.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D 262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

C 266

8.- ZONA METAMORFICA

ANDESINA - HORNBLENDA MARROW VERDOSA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambriico - Hercínico

10.- CLASIFICACION

ANFIBOLITA

1.- IDENTIFICACION

N° HOJA	EMP	REC	N° MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NGBD		69	T		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

2.- DATOS DE CAMPO Muestra de anfíbolitas de la sucesión de reises
de Azuaga. Dominio de ^{valencia} V. de las Torres. ^{como} C. Humano. Grupo de Córdoba.
- Fuentesbejauna.

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO *Orientación no muy patente. en roca
amfibolítica. de grano medio.*

4.- EDAD

PRECAMBRIÇO PROTEROZOÍAS

-POSICION ESTRATIGRAFICA.....A	☒	-BUENA.....B	☒
PROCEDIMIENTO-DATACION ABSOLUTA.....B	☒	VALORACION-PROBABLE.....P	☒
-DATACION PALEONTOLOGICA.....C	44	-DUDOSA.....D	45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NEMATOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

PLAGIOCLASA HORNBLENDA FELDSPATO-POTÁSICO CUARZO EPID

OTA ESFENA OPACOS APATITO CLORITA SERICITA

154 20

208		26
OBSERVACIONES		

Roca original de composición (monso-) diorítica o gabrica, de grano medio, en la que los ferromagnesianos han recristalizado en condiciones de metamorfismo regional. La paragénesis originada es plagioclasa (indeterminada) - hornblenda verde, que procede probablemente de prooceno titanífero, a la vista de la cantidad de esfena producida.

Mas tardía debe ser la reoformación de epidota sobre las plagioclases, a la que acompañaría la sericitización de las mismas.

Deformación simetamórfica poco potente

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

262

7-GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO 
B - BAJO D - ALTO

8.- ZONA METAMORFICA

HORNBLENDA VERDE-PLAGIOKLASA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambrian & Hercynian

10.- CLASIFICACION

ANFIBOLITA

309

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA ☐ 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NGBD		68	T		CO	P. Higuera.
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Muestra de los neises de Azuaga. Dominio de Valencia de las Torres. Cmo Murano. Grupo de Córdoba. Fuentesbeja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca cuarsa-feldespática, leucocrata, fuertemente orientada.

4- EDAD

PRECAMBRIICO. PROTEROZO M-S

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A VALORACION - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 VALORACION - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NEISICA MILONITICA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, ALBITA-OLIGOCLASA, FELDESPATO-POTASICO, EPIDOTA B

100 153

10TITA CLORITA OPACOS CIRCON APATITO ESFENA SERICITA C

154 207

XIDOS

208 261

OBSERVACIONES

Roca cuarsa-feldespática intensamente milonitizada, de naturaleza original imprevisible.

Afectada por un proceso dinámico, que produce una gruesa pero patente esquistosidad de flujo, con granulación del cuarsa, que adquiere texturas ribbon. A este proceso se asocia blastesis muy gruesamente lepidoblastica de biotita-clorita, y de epidota, que se concentran en "mojillos".

Fracturillas tardías, en varias etapas, con remobilización de cuarsa, feldespato potásico y epidota, fundamentalmente

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

B 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

B 266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico, Hercínico.

10- CLASIFICACION

LEUCANEIS, NEIS MILONITICA

MEIS LEUCOCRATO MILONITICO

309

362

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	BD	67	7		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Muestra de los neises de Azuaga. Dominio de Valencia de los Torres. Cuenca Murciana. Grupo de Córdoba - Fuentes de Béjar.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca neísea orientada y ligeramente brechificada.

4- EDAD

PRECAMBRIICO. PROTEROZO. MS

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - VALORACION - PROBABLE... P - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NEISICA MILONITICA. BRECHIFICADA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO FELDSPATO - POTASICO OLIGOCLASA BIOTITA CLORITA

MOSCOVITA OPACOS CIRCON TURMALINA ESFENA RUTILO OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca acida cuyo origen es difícil de elucidar, puesto que está intensamente deformada. Los caracteres texturales que presenta (megacrinitas de feldspatos en matriz bastante homogénea, de grano medio-fino) permiten establecer la posibilidad de que corresponde a una roca hipobasica.

Afectada por un proceso de metamorfismo dinámico, que produce una gran esquistosidad, con elongación y flujo del cuarzo, y al que acompaña una ~~gran~~ blastesis groseramente epidoblástica de biotita, clorita (puede ser retrometamorfica) y moscovita (escasa).

Plegues suaves de la esquistosidad. Fracturillas con FdK, cuarzo, clorita, y óxidos.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

B

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

B

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambriico Hercinico.

10- CLASIFICACION

NEIS MILONITICO

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGBD 63 7 15 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Muestra de los reises de Aruaga. Dominio de Valencia de las Torres - Cova Muiñano. Grupo de Córdoba - Fuenteovejuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca silicea gris, orientada.

4- EDAD

PROTEROZOICO MEDIO-SUP.

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

MILONITICA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA FELDSPATO-POTASICO SERICITA-MOSCOW

100 153

ITA CLORITA EPIDOTA OPACOS CIRCON

154 207

208 261

OBSERVACIONES

Roca cuarsa-feldespática milonitizada, procedente de roca porfídica o granuda??, de composición riódacítica.

Afectada por un proceso dinámico importante, con granulacion del cuarsa y fracturación y trituración parcial de los feldespatos, que crea una gresca esquisto-
dad, a la que se asocia blastesis biotoblástica de clorita-biotita??, irregularmente distribuida sobre la leucocrato del material.

Más tardías son la blastesis de epidota y la remobilización a fractanillas del feldespato potásico.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

B 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

A 266

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA-EPIDOTA

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico, Hercínico

10- CLASIFICACION

NEIS MILONITICO LEUCONEIS

NEIS LEUCOCRATO MILONITICO

309

362

ANÁLISIS QUÍMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	BD	60	1		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Nº de burocrato en sucesión de rios de Asuaga
 Dominio de Valencia de las Torres. Cera Manana. Grupo
 de Córdoba. Fuentesobezuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca cuarsa-feldespática intensamente
 tectonizada

4- EDAD

PROTEROZOICO MEDIO-SUP.

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C
 VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

MILONITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, PLAGIOCLASA, FELDSPATO-POTASICO, CLORITA, BIOTITA,
 SERICITA, MOSCOVITA, OPACOS, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca cuarsa-feldespática intensamente tectonizada,
 de carácter original prácticamente imposible de esta-
 blecer, dado que todos los caracteres texturales origina-
 les están obliterados por la milonitización.

Esta deformación milonítica es muy intensa: ha ori-
 ginado la granulación prácticamente total de los compo-
 nentes primarios de la roca. A ella se asocia una blas-
 tesis de biotita verdosa. Clorita de grano muy fino
 oxidación ulterior importante

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO
 D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

B

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO
 C - MEDIO
 D - ALTO

AB

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA VERDOSA INCIPIENTE

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambriaco, Hercínico

10- CLASIFICACION

ULTRAMILONITICA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGBD 55 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Rocas anfibóticas intercaladas en la sucesión de neises de Arzaga. Dominio de Valencia de los Tones. Cmo Munano. Grupo de Córdoba - Fuenteobertura.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca bandada anfibótica, muy orientada, con niveles de diferente granulometría

4- EDAD

PRECAMBRIICO PROTEROZO M-S

21 PROTEROZO MEDIO-PROTEROZO SUPERIOR 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A VALORACION - BUENA B

- DATACION ABSOLUTA B VALORACION - PROBABLE P

- DATACION PALEONTOLOGICA C 44 VALORACION - DUDOSA D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

MILONITICA A GRANO-NEMATOBLASTICA BANDEADA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

OLIGOCLASA CUARZO HORNBLENDA FELDSPATO-POTASICO OPAKO

100 153

S APATITO EPIDOTA CLORITA SERICITA OXIDOS

154 207

208 261

OBSERVACIONES

Roca anfibótica bandada, con niveles de diferentes granulometría y composición mineralógica cuantitativa. Podría tratarse de un bandado primario, propio de una volcánita intermedia - básica.

Afectada por un proceso de deformación semi-metamórfica, con una notable componente dinámica, que origina una esquistosidad de flexión. En parte está clástica, marcado por granulación de cuarzo y blastesis nematoblástica de anfíbol.

Clorita y epidota probablemente corresponden a un proceso retemamórfico ulterior.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

C - DE SOTERRAMIENTO E - PLURIFACIAL 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

B C 266

8- ZONA METAMORFICA

OLIGOCLASA-HORNBLENDA Y CLORITA-EPIDOTA

268 308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambriico, Hercínico

10- CLASIFICACION

NEIS ANFIBOLICO

309 362

Neis anfibólico con niveles de anfibolita.

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	BD	52	T		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Muestra de neises leucocratos de Azuaga. Dominio de Valencia de las Torres. Cmo Muriano. Grupo de Córdoba-Fuenteobezuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca cuarsa-feldespática fuertemente orientada.

4- EDAD

PRECAMBRIICO. PROTEROZOICO MEDIO-PROTEROZOICO SUPERIOR

PROCEDIMIENTO: -POSICION ESTRATIGRAFICA... A -BUENA... B -DATACION ABSOLUTA... B -VALORACION-PROBABLE... P -DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 -DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NEISICA, MILONITICA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO ALBITA-OLIGOCLASA FELDESPATO-POTASICO OPACOS ES

100 153

FEN A PATITO BIOTITA SERICITA OXIDOS

154 207

208 261

OBSERVACIONES

Roca cuarsa-feldespática, muy leucocrata, afectada por un proceso dinámico que confiere a la roca textura neísica, por granulación del cuarsa, que origina una grossa pero potente esquistosidad, y que produce una intensa fracturación, y granulación parcial de los feldespatos.

La naturaleza original de la roca no se reconoce: podría tratarse tanto de una roca porfídica como granuda.

Cinturón regional (confolitas encajadas en la serie) permiten suponer la existencia de un proceso previo de metamorfismo en condiciones de grado medio-alto, que aquí no se reconoce, dado lo leucocrato del material.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A- DE CONTACTO B- DINAMICO D- REGIONAL E- PLURIFACIAL

C- DE SOTERRAMIENTO

DB

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

No reconocible

A- MUY BAJO B- BAJO C- MEDIO D- ALTO

266

8- ZONA METAMORFICA

No reconocible

268 308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambrio, Hercínico.

10- CLASIFICACION

LEUCANEIS, NEIS MILONITICA

NEIS LEUCOCRATO MILONITICO

309 362

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
 1536 N5BD 36 7 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Neis leucocrato en sucesión de neises de Aguaga.
 Dominio de Valencina de las Torres - Cima Merinos. Grupo de Córdoba.
 - Fuenteobajuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca cuarsa-feldespática muy onetada, de aspecto neisico.

4- EDAD

PROTEROZOICO MEDIO-SUPERIOR

- POSICION ESTRATIGRAFICA... A

- DATACION ABSOLUTA... B

- DATACION PALEONTOLOGICA... C

A

- BUENA... B

VALORACION-PROBABLE... P

- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

MILONITICA, GRANOLEPIDOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, SERICITA, MOSCOVITA, Biotita, CLORITA, EPIDOTA, OPACOS, CIRCON, APATITO, RUTILO, ESFENA, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca cuarsa-feldespática milonitizada. Su ~~origen~~ textura original ha sido obliterada totalmente por la deformación dinámica ulterior, de manera que puede proceder desde de un granito a una toba gruesa.

Afectada por deformación dinámica, que origina esquisto de fleijo por granulación del cuarsa y ~~baja~~ blasto sinuematosa de sericita-moscovita.

La neoformación de clorita-biotita verdosa-epidota es posterior a la deformación, y podría relacionarse con el proceso hidotermal que deposita estos minerales en fracturas de la roca.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO

B - DINAMICO

C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL

E - PLURIFACIAL

BD

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO

B - BAJO

C - MEDIO

D - ALTO

A

266

8- ZONA METAMORFICA

SERICITA-MOSCOVITA, BIOTITA, TARDIA

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico, Hercínico

10- CLASIFICACION

MILONITA (ORTONEIS)

309

362

ANALISIS QUIMICO

363

MIGMATITA

364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 5 3 6 N 6 B 0 3 3 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Amfibolita en la sucesión de neises de Azuaga.
Dominio de Valencia de las Tones - Cmo Menano. Grupo de
Córdoba - Fuentebajuna

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca anfibólica muy orientada, con
cristales de plagioclasa de hasta 1.5-2 mm.

4- EDAD

PRECAMBRIKO PROTEROZOICO M-S

21

PROTEROZOICO MEDIO - PROTEROZOICO SUPERIOR

- POSICION ESTRATIGRAFICA... A

- DATACION ABSOLUTA... B

- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B

VALORACION - PROBABLE... P

VALORACION - DUDOSA... D

44

45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NEMATOBLASTICA

46

99

COMPOSICION MINERALOGICA

ANDESINA HORNBLENDA CUARZO BIOTITA CLORITA MICA-BLANCA

100

153

OPACOS FELDSPATO-POTASICO ESFENA SERICITA OXIDOS

154

207

208

261

OBSERVACIONES

Roca anfibólica orientada, procedente de roca equia básica de textura original verosimilmente porfídica, a la vista de la presencia de antiguos fenocristales de plagioclasa, que aparecen totalmente sericitizados.

Apetada por un proceso de deformación sinmetamórfica, que origina blastesis nematoblastica de anfíbol (hornblenda median - verdosa) paragenética con andesina. Se reconocen también como minerales de neoforación biotita (cloritizada) y una mica incolora de baja birefringencia (margarita??)

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO

B - DINAMICO

C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL

E - PLURIFACIAL

DB

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO

B - BAJO

C - MEDIO

D - ALTO

CB

266

8- ZONA METAMORFICA

HORNBLENDA-ANDESINA

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambrio, Hercínico

10- CLASIFICACION

ORTOANFIBOLITA

309

362

ANÁLISIS QUÍMICO

363

MIGMATITA

364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 5 7 9 13 15 19 P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Muestra de los neises de Azuaga. Dominio de Valencia de los Tones. Ceno Muriano Grupo de Córdoba - Fuenteobertura.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca neíseica, con augen de feldespatos de hasta 1'5-2 mm. Orientación muy patente.

4- EDAD

PRECAMBRICO PROTEROZOICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P
- DATACION PAL EONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NEISICA, MILONITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

ALBITA - OLIGOCLASA, FELDESPATO - POTASICO, CUARZO, CLORITA, E

PIDOTA, OPACOS, CIRCON, APATITO, RUTILO, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca neíseica, p milonítica, procedente de una roca sílica de textura original inconocible, pero verosimilmente granada de grano medio, dada la falta de feldespatos en la matriz, que se habría originado por granulación del cuerso, fundamentalmente.

El proceso dinámico está acompañado de blastesis epidoblástica de clorita - biotita - anfíbol fibroso??; ~~los~~ estos dos últimos están casi totalmente reemplazados por clorita, y la identificación del anfíbol es problemática.

La granulación del cuerso y la blastesis epidoblástica de los ferromagnesianos indicados originan una gresosa pero muy patente esquistosidad cataclástica.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL DB
C - DE SOTERRAMIENTO E - PLURIFACIAL 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO B
B - BAJO D - ALTO 266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA AL MENOS

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

NEIS MILONITICO

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGBD 8 T 15 CO P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

2.- DATOS DE CAMPO Sucesión de esquistos y neises meloníticos (Neises de Azuaga). Dominio de Valencia de las Torres. Ceno Meridiano. Grupo de Córdoba-Fuentesovejuna.

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO Roca esquistoada, con blastos inferiores a 1 mm., con fracturillas rellenas de material hidrotermal.

4.- EDAD

PRECAMBRI CO. PROT EROZO ¹⁰ ¹¹ ¹² ¹³ ¹⁴ ¹⁵ ¹⁶ ¹⁷ ¹⁸ ¹⁹ ²⁰ ²¹ ²² ²³ ²⁴ ²⁵ ²⁶ ²⁷ ²⁸ ²⁹ ³⁰ ³¹ ³² ³³ ³⁴ ³⁵ ³⁶ ³⁷ ³⁸ ³⁹ ⁴⁰ ⁴¹ ⁴² ⁴³ ⁴⁴ ⁴⁵ ⁴⁶ ⁴⁷ ⁴⁸ ⁴⁹ ⁵⁰ ⁵¹ ⁵² ⁵³ ⁵⁴ ⁵⁵ ⁵⁶ ⁵⁷ ⁵⁸ ⁵⁹ ⁶⁰ ⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵ ⁶⁶ ⁶⁷ ⁶⁸ ⁶⁹ ⁷⁰ ⁷¹ ⁷² ⁷³ ⁷⁴ ⁷⁵ ⁷⁶ ⁷⁷ ⁷⁸ ⁷⁹ ⁸⁰ ⁸¹ ⁸² ⁸³ ⁸⁴ ⁸⁵ ⁸⁶ ⁸⁷ ⁸⁸ ⁸⁹ ⁹⁰ ⁹¹ ⁹² ⁹³ ⁹⁴ ⁹⁵ ⁹⁶ ⁹⁷ ⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰ ¹⁰¹ ¹⁰² ¹⁰³ ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ ¹⁰⁶ ¹⁰⁷ ¹⁰⁸ ¹⁰⁹ ¹¹⁰ ¹¹¹ ¹¹² ¹¹³ ¹¹⁴ ¹¹⁵ ¹¹⁶ ¹¹⁷ ¹¹⁸ ¹¹⁹ ¹²⁰ ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵ ⁴⁵⁶ ⁴⁵⁷ ⁴⁵⁸ ⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹ ⁴⁶² ⁴⁶³ ⁴⁶⁴ ⁴⁶⁵ ⁴⁶⁶ ⁴⁶⁷ ⁴⁶⁸ ⁴⁶⁹ ⁴⁷⁰ ⁴⁷¹ ⁴⁷² ⁴⁷³

-POSICION ESTRATIGRAFICA.....A	A	-BUENA.....B	P
PROCEDIMIENTO-DATACION ABSOLUTA.....B		VALORACION-PROBABLE.....P	
-DATACION PALEONTOLOGICA.....C	44	-DUDOSA.....D	45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA ESQUISTOSA

COMPOSICION MINERALOGICA

100	CUARZO	PLAGIOCLASA	FELDSPATO-POTASICO	MOSCOVITA	81071
154	TA	GRANATE	SILICATO-DE-ALUMINIO	OPACOS	CIRCON TURMALINA
208	A	ESFENA	APATITO	CLORITA	OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico-arenoso, cuarzo-feldespático. Afectada por al menos dos fases de deformación - la primera es sinmetamórfica. Origina una esquistosidad de flujo marcada por blastesis epidoblástica de moscovita y biotita; el granate, y un silicato de aluminio indentificable por estar totalmente desilicificado serían tardicinemáticos respecto a esta fase se aprecia una cierta componente dinámica en esta deformación. La segunda origina una esquistosidad espaciada oblicua a la anterior.

Diversas segregaciones paralelas a S, y fracturas, rellenas por plagioclasa, feldespato potásico, apatito y esfena.

Contaminación del granate y sensibilización del subiato de aluminio

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO - B C
B - BAJO D - ALTO

8.- ZONA METAMORFICA

GRANATE

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico, Hercínico

10.- CLASIFICACION

METALAI FELDEPATICO R. KODACITA, METAVOLCANITIN- SGIDH

CUARZO ESQUISTO MOSCOWITICO CON GRANATES

(E M ?)

ANALISIS QUIMICO ☐ 363

MIGMATITA ☐ 364

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA				EMP	REC	Nº MUESTRA		TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1	5	3	6	NG	BD			4		CO	P. Higuera
1	5	7	9					13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

DATOS DE CAMPO Neis leucocrato en sucesión de neises y anfíbolitas (neises de Azuaga). Dominio de Valencia de las Torres. Cerro Murano. Grupo de Córdoba - Fuentesovejuna.

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO Roca porfídica silícea, sin deformación apreciable a nivel de muestra de mano.

4.- EDAD

PROTEROZOICO MEDIO-SUPERIOR	-POSICION ESTRATIGRAFICA.....A	-BUENA.....B
21	PROCEDIMIENTO-DATACION ABSOLUTA.....B	VALORACION-PROBABLE P.....P
43	-DATACION PALEONTOLOGICA.....C	-DUDOSA.....D
	44	45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

MILONITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

PLAGIOCLASA CUARZO FELDSPATO-POTASICO EPIDOTA CLORITA

OPACOS CIRCON APATITO RUTILO SERICITA CARBONATO

208
OBSERVACIONES

Roca porfírica ácida, constituida por fenocristales de plagioclasa sericitizados embebidos en una matriz de cuarsosfeldespato potásico ~~con epidota y clon~~ granulados con clonita y epidota.

La roca podía proceder incluso de una roca granu-
la de grano medio-grueso, con granulación total
del cuarzo y el feldespato potásico.

clorita y epidota podían tener origen metamórfico, y serían tardías respecto a la deformación dinámica que afecta a la roca.

Fracturas con remobilización de feldespato potásico, y
otras, más tardías, con cuarzo y carbonatos.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO A B
B - BAJO D - ALTO 266

8.- ZONA METAMORFICA

CLORITA-EPIDOTA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

OGENÉTICAS Precâmbrico, Hercínico.

10.- CLASIFICACION

MILONITA 9 WEIS MILONITICO

ANÁLISIS QUÍMICO	363
------------------	-----

MIGMATITA ☐ 364

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NE	BD	2	T		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

sucesión de cuarsesquistos y neises microlíticos.
Dominio de Valencia de las Torres. Cmo Murano. Grupo de
Córdoba-Fuenteovejuna.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

cuarsesquisto microlítico con esquistosidad plegada y fracturillas tardías.

4.- EDAD

PRECAMBRIICO-PROTEROZOICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION-PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANDOLEPIDOBLASTICA ESQUISTOSA MICROPLEGADA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA MOSCOVITA FELDSPATO-POTASICO ESFEN

A CIRCON TURMALINA OPACOS, SERICITA CLORITA OXIDOS B, OT

ITA

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lútilico-arenoso, cuars-feldespático.

Afectada por diversas etapas de deformación:

- Al menos una sinmetamórfica y sinesquistosa, que origina una esquistosidad de flujo marcada por blastesis lepidoblástica de moscovita sinclinal, que podría ser también en parte tardía (blastos desorientados respecto a esta esquistosidad), y de biotita.

Posteriormente esta esquistosidad está afectada por más de una fase de deformación: al menos dos de plegamiento, y una o dos de fracturación, que originan una geometría de conjunto bastante compleja.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

266

8.- ZONA METAMORFICA

MOSCOVITA-BIOTITA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Hercínico. Precámbrico.

10.- CLASIFICACION

CUARZOESQUISTO MOSCOVITICO

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
 1536N6A13019 T 15 19 CO P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

FORMACION METAMÓRFICA CON CUARZO ESQUISTOS Y
 METABASITAS AL SE DE VILLANARTA DOMINIO OBEJO - VALSEQUE.
 LLO - PUERTA DE LA REINA. Unidad alóctona (Obejo - Espiel)

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa, con porfirocristales
 de plagioclasa y fenomagnesiano. Color verdoso.

4.- EDAD

PRECAMBRICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A VALORACION - BUENA... B
 - DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 VALORACION - DUDOSA... D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOPORFIDICA ESQUISTOSA NEMATOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

HORNBLENDA PLAGIOCLASA CUARZO CLORITA, BIOTITA FELDESPA

TO - POTASICO OPACOS APATITO ESFENA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca original básica - intermedia, porfídica, con-
 tituida por fenocristales de anfíbol, y mas escasos
 de plagioclasa, en una matriz esquistosa y
 recristalizada, de caracteres originales inconocibles.

Afectada por deformación y metamorfismo,
 que produce una esquistosidad de flujo, con
 blastesis nematoblástica de anfíbol, y que esta-
 biliza la paragénesis hornblenda verde, plagiocla-
 sa - epidota.

La plagioclasa aparece en parte remplazada por
 cuarzo

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL
 C - DE SOTERRAMIENTO E - PLURIFACIAL 262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO B - BAJO D - ALTO 266

8.- ZONA METAMORFICA

HORNBLENDA VERDE

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico, Hercínico.

10.- CLASIFICACION

METAANDESITA, ANFIBOLITA

ANÁLISIS QUÍMICO 363

MIGMATITA 364

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA
1336	N	Q	A	5049T
1	5	7	9	13

PROFUNDIDAD

--	--	--	--

15

PROVINCIA

--	--

19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:
A. GARROTE

2.- DATOS DE CAMPO

DOMINIO DE ZAFRA - MONESTERIO. ROCAS RIOLITICAS EN EL CONTACTO MECANICO ENTRE LAS UNIDADES DE LOMA DEL AIRE Y ALANIS

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

ROCA ESQUESTOSADA, RIOLITICA, DE COLOR ROSADO, FENOCRISTALES DE FELDSPATO DE 1-3 MILIMETROS

4.- EDAD

HERCINICA

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA..... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

44 VALORACION - BUENA B
- PROBABLE P
- DUDOSA D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUISTOJA BLASTOPORFIDICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO FELDSPATO-POTÁSICO PLAGIOCLASA SERICITA

OPACOS ESSENA CIRCON

0x1d05

OBSERVACIONES

ROCA VOLCANICA RIOLITICA CON FENOCRISTALES DE PLAGIOCLASA
Y CUARTO Y MATRIZ ORIGINALMENTE VITREA.

DESARROLLO DE UNA FAJE SINESQUILISTA POR FLOCLASTOS DE PLACOCASA
DEFORMADOS. MATRIZ- MESOSTASIS FORMADA POR CUARTO-FELDSPATO POTAS-
SICO- MICA INCOLORA POR UN PROCESO DE DEVITRIFICACION
FRACTURAS TARDIAS RELLENAS DE OXIDOS

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D- REGIONAL
E- PLURIFACIAL

262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO
B - BAJO D - ALTO

C - MEDIO
D - ALTO

4	
---	--

8.- ZONA METAMORFICA

WICA IN COLORA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

10.- CLASIFICACION

309 METARIDOLITA 36

ANALISIS QUIMICO ☐ 363

MIGMATITA ☐ 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1336	MA	AS	5050	T			A GARROTE
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

DOMINIO DE ZAFRA - MONESTERIO. FORMACION TORREAR-
BOLES DE LA UNIDAD DE ALAMIS. ZONA DE CONTACTO MEC-
NICO CON LA UNIDAD DE LOMA DEL AIRE

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

ROCA ARCOSA MUY POCO ESTRUCTURADA

4- EDAD

CAHBRILLO INFERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A ☒ VALORACION - BUENA... B ☐
- DATACION ABSOLUTA... B ☐ VALORACION - PROBABLE... P ☐
- DATACION PALEONTOLOGICA... C ☐ VALORACION - DUDOSA... D ☐

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOPSAMITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARTO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, SERICITA MOSCO-

UITA-DETritica, CALCITA, CARBONATO, ANQUERITA

OBSERVACIONES

ARCOSA CON CLASTOS DESIGUALMENTE REDONDEADOS
PEQUEÑOS CLASTOS DE ROCA: CHERT, ROCAS VOLCANICAS MICROCRIS-
TALINAS (VIDRIOS DESUTRIFICADOS)
ROCA POCO ESTRUCTURADA, EVIDENCIAS DE UNA FASE DE DEFOR-
MACION MARCADA POR UN LIGERO ALARGAMIENTO PREFERENTE
DE CLASTOS

FRACTURAS TARDIAS RELENAS DE CUARTO Y/O CALCITA

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

A

A- DIAGENESIS

8- ZONA METAMORFICA

268 308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS HERCINICA

10- CLASIFICACION

ARCOSA METAMORFIZADA

309

362

ANÁLISIS QUÍMICO ☐ 363

MIGMATITA ☐ 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1336 NA A 5043 T
 1 5 7 9 11-03-2 13

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

A CARROTE

2- DATOS DE CAMPO

DOMINIO DE ZAFRA - MONESTERIO. UNIDAD DE VALVERDE
 DE LLERENA. FORMACION MALCOCANADO. TIPO TOBALEO
 SERICITICO

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

ROCA TOBALEA SERICITICA, ESQUITOSA, CLASTOS DE PLAGIOCLASA

4- EDAD

RIFEENSE SUP. - UENDIENSE
 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUITOSA PORFIROCLASTOS MESOSTASIS GRANULOPIDOCLASTICA
 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

PLAGIOCLASA, MICA-INCOLORA, SERICITICA, CUARZO, CALCITA
 100 153

CLORITA, OPACOS, CIRCON, APATITO, ESFENA, OXIDOS
 154 207

OBSERVACIONES

ROCA ORIGINAL: TOBA CRISTALINA DE COMPOSICION AUDA
 UNA FAJE TECTONOMETAMORFICA CON BLASTESIS SINTECTONICA DE
 CUARZO, CLORITA, CALCITA Y MICA INCOLORA. LA CALCITA SE
 FORMA POR DESCALIFICACION DE PLAGIOCLASAS. CALCITA EN ZONAS
 DE SOMBRA DE PRESION DE PORFIROCLASTOS Y REMOVLITADA
 EN FRACTURAS IRREGULARES TARDIAS
 MINERALIZACION DE PIRITA.

FAJE POSTERIOR CON ALGUNOS MICROPLIEGUES SUAVES

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO

C - MEDIO
 D - ALTO

266

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA
 268

309

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

PROTEROZOICO TERMINAL

10- CLASIFICACION

METATOBA SERICITICA
 309

362

ANALISIS QUIMICO
 363

MIGMATITA
 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1306	NA	AG	5074T				B. GARROTE
1	5	7	9 AG-074-13		15	19	

2- DATOS DE CAMPO

DOMINIO DE ZA FRA MONESTERIO. UNIDAD DE VALVERDE
DE LLERENA. FORMACION MALLOCIADO. TRAMO ANDESITICO
CLASTICO

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

CONGLOMERADO DE CLASTOS ANDESITICOS EN MATRIZ TOBACEA.
ROCA ESQUISTOSA.

4- EDAD

RIFEENSE SUPERVENDIENSE

PROCEDIMIENTO	- POSICION ESTRATIGRAFICA... A	- BUENA... B
	- DATACION ABSOLUTA... B	VALORACION-PROBABLE... P
	- DATACION PALEONTOLOGICA... C	- DUDOSA... D
	44	45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOPSEFITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

PLAQUIOCLASAS, CLORITA, SERICITA, OPACOS, ESPENA, LEUCOXENO

CUANZO, CALCITA,

APATITO

OBSERVACIONES

CLASTOS DE :

- ROCAS PORFIDICAS CON MICROFENOCRISTALES DE PLAQUIOCLASA Y MATRIZ
UITREA
- ROCAS PORFIDICAS FLUIDALES CON FENOCRISTALES DE PLAQUIOCLASA
Y MICROCRISTALES DE PLAQUIOCLASA

MATRIZ TOBACEA CON CLASTOS DE PLAQUIOCLASA Y SERICITA Y
CLORITA

UNA FASE DE DEFORMACION SINESQUISTOSA, S MATERIA-
LIZADA POR ORIENTACION DE SERICITA Y CLORITA. ALARGAMIENTO
DE CLASTOS SEGUN LA ESQUISTOSIDAD

FASE TARDIA QUE MICROPLIEGA LA ESQUISTOSIDAD

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO	D - REGIONAL
B - DINAMICO	E - PLURIFACIAL
C - DE SOTERRAMIENTO	262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO	C - MEDIO
B - BAJO	D - ALTO
266	4

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS PROTEROZOICO TERMINAL

10- CLASIFICACION METACONGLOMERADO TUFACEO
METACONGLOMERADO VULCANOCLASTICO

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1336	NA	AG	5076T				A. GARROTE
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

DOMINIO DE SIERRA ALBARRANA. FORMACION AWAGA.

PROXIMIDADES DE LA FALLA DE MALLOCINADO

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

ROCA ESQUELÍSTICA FICITICA CON NIVELES CON DIFERENTE GRANULO METRIA

4.- EDAD

PROTEROZOICO SUP.

PROCEDIMIENTO	- POSICION ESTRATIGRAFICA A	- BUENA B
	- DATACION ABSOLUTA B	VALORACION - PROBABLE P
	- DATACION PALEONTOLOGICA C	- DUDOSA D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUELÍSTICA LEPIDOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARTO PLACIOCLASA MICA INCOLORA CLORITA BIOTITA MARON

VERDOSA, MOSCOVITA - DETRITICA,

ESFENA OPACOS CIRCON TURMALINA RUTILO OXIDOS

OBSERVACIONES

SEDIMENTO LUTITICO - ARCILLOSO CON INTERCALACIONES LIMOLITICAS
CON PEQUEÑOS CLASTOS DE CUARTO Y PLACIOCLASA
UNA FASE TECTONOMETAMORFICA SIN ESQUELÍSTICA CON BLASTESIS
SINTECTONICA DE MICA INCOLORA, BIOTITA Y CLORITA

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO	D - REGIONAL
B - DINAMICO	E - PLURIFACIAL
C - DE SOTERRAMIENTO	

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO	C - MEDIO
B - BAJO	D - ALTO

8.- ZONA METAMORFICA

CLORITA - BIOTITA MARON - VERDOSA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

PRECAMBRIKO TERMINAL

10.- CLASIFICACION

FICITICA

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1 336 NA AG 5087T 15 19 A. GARROTE

2- DATOS DE CAMPO

DOMINIO DE ZAFRA MONESTERIO. UNIDAD DE VALVERDE DE LERENA. FORMACION MALCORNADO. TRAMO VULCANOCLASTICO BASICO

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

ROCA TOBALEA, PLACIOCLASICO - CLORITICA. NIVELES CON DIFERENTE GRANULOMETRIAS

4- EDAD

RIFEENSE SUP. - ^{ERRORE} VEMDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - DATACION ABSOLUTA... B - VALORACION - PROBABLE... P - DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUELUSTOSA PORFIROCLASTICA 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

PLACIOCLASAS CLORITA CUARTO SERICITA OPACOS OXIDOS 100 153

GRAN TURALINA APATITO 154 207

OBSERVACIONES

ROCA ORIGINAL: TOBA DE COMPOSICION BASICA.
CLASTOS DE PLACIOCLASA, ALGUNOS DE ROCAS VOLCANICAS CON MICROCRISTALES Y VIDRIO, CLASTOS ESCASOS DE CUARTO.
UNA FASE TECTONOMETAMORFICA SIN ESQUELUSTOSA CON BLASTESIS DE ABUNDANTE CLORITA Y CANTIDADES MENORES DE CUARTO Y MICA INCOLORA.
LA CLORITA LEPIDOBLASTICA ENVUELVE A LOS PEQUEÑOS CLASTOS.
SUAVE MICROPLEGADO TARDIO DE LA ESQUELUSTOSIDAD

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO 266

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA 268 308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS PROTEROZOICO TERMINAL

10- CLASIFICACION

METATOBA PLACIOCLASICO-CLORITICA 309 362

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1336 WAA 5090T 15 19 A GARROTE

2- DATOS DE CAMPO

DOMINIO DE ZAFRA-MONESTERIO. UNIDAD DE VALVERDE
DE LLERENA. FORMACION MALCOCINADO.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

ROCA TOBACEA PLACIOCLASICO-CLORITICA CON OXIDOS

4- EDAD

21 43 RIFEENSE SUP. - UENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

46 99 ESQUISTOSA

COMPOSICION MINERALOGICA

100 153 PLACIOCLASA CLORITA CUARTO SERICITA OXIDOS OXIDOS

154 207 ESFENA CIRCON

208 261 PIRITA

OBSERVACIONES

ROCA ORIGINAL: MATERIAL TOBACEO DE GRANO FINO.
UNA FASE TECTONOMETAMORFICA SINESQUISTOSA. BIASTESIS
SINTERTONICA DE CLORITA Y SERICITA. S DESTACADA POR
LA TINCION DE OXIDOS
EVIDENCIAS DE UNA FASE POSTERIOR CON ESQUISTOSIDAD
ESPACIADA.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL
262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO
266

8- ZONA METAMORFICA

268 308 CLORITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

PROTEROZOICO TERMINAL

10- CLASIFICACION

309 362 METATOSA PLACIOCLASICO-CLORITICA

ANALISIS QUIMICO
363

MIGMATITA
364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1336	NA	AA	50927				A. CARROTE
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

DOMINIO DE ZAFRA - MONESTERIO. UNIDAD DE VALVERDE DE
LLENENA. FORMACION MALLOCINADO. TRAMO VOLCANO CLASTICO DUBO

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

TOBA LITICO CRISTALINA SERICITICA

4- EDAD

RIPEENSE SUP. - VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B - VALORACION - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUISTOSA PORFIDOCLASTOS EN MESOSTASIS SERICITICA LEPI-
46 DOBLASTICA 99

COMPOSICION MINERALOGICA

SERICITA, CUARTO, PIRALOCCLASA, 100 153

BIOTITA, FERROSPATO-POTASICO, 154 207

OPACOS ESFENA, CIRCON, OXIDOS 208 261

OBSERVACIONES

ROCA ORIGINAL: TOBA LITICO-CRISTALINA. MATRIZ CINERITICA.

CLASTOS DE CUARTO CON FORMAS CORROIDAS Y DE PIRALOCCLASAS.

FRAGMENTOS DE ROCAS:

- VIDRIOS DESVITIFICADOS EN ARENADOS MICROCRISTALINOS CUARTO.
FERROSPATOS
- ROCAS VOLCANICAS CON FENOCRISTALES Y MATRIZ MICROCRISTALINA
- ROCAS DETRITICAS

UNA FASE TECTONOMETAMORFICA SINESBUSTOSA CON BLASTESIS DE
SERICITA LEPIDOBLASTICA. ESTA S ENVUEVE A LOS CLASTOS
ALARGADOS.

FASE POSTERIOR CON S ESPACIADA CON LIGERA ORIENTACION
DE SERICITA.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

266

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA 268 308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

PROTEROZOICO TERMINAL

10- CLASIFICACION

METATOBA CRISTALINA-ALTA, METATOA-ACIDA
META LITICO CRISTALINA ACIDA SERICITICA 309 362

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
1336 MA AAS093 T
1 5 7 9 AG-092-213

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

A GARROTE

2- DATOS DE CAMPO

DOMINIO DE ZAFRA-MONESTERIO. UNIDAD DE VALVERDE DE
LLERENA. FORMACION MALCOCENADO. TRAMO VULCANO CLASTICO ACIDO

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

ROCA TOBACEA SERICITICA, ESQUITOSA, LITICO-CRISTALINA

4- EDAD

RIFEENSE SUPERIOR - VENDEIENSE

21

43

PROCEDIMIENTO

- POSICION ESTRATIGRAFICA... A

- DATACION ABSOLUTA... B

- DATACION PALEONTOLOGICA... C

- BUENA... B

- VALORACION-PROBABLE... P

- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUITOSA BLASTOPSEFITICA

46

99

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARTO, SERICITA, COMO PRINCIPAL COMPONENTE, PLACIOCLASA

100

153

BIOTITA, CLORITA, FERROSPATO-POTASICO

154

207

OPACOS, CIRCON, ESFENA, BIOTITA

208

261

OBSERVACIONES

ROCA VULCANOCLASTICA. CLASTOS MONOCRISTALINOS DE PLACIOCLASA.

FRAGMENTOS DE ROCAS:

- GRANITOIDE TIPO CERRO DE LA BOMBA con CUARTO y PLACIOCLASA
- CLASTOS VITREOS DESVITRIFICADOS
- ROCAS VOLCANICAS con MICROCISTALES y MATRIZ DE GRANO MUY FINO.

UNA FASE SIN ESQUITOSA. BLASTESIS LEPODOLASTICA DE SERICITA y ALARGAMIENTO DE CLASTOS. S POSTERIOR ESPALDADA

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO

B - DINAMICO

C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL

E - PLURIFACIAL

D

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO

B - BAJO

C - MEDIO

D - ALTO

A

266

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

PROTEROZOICO TERMINAL

10- CLASIFICACION

METATOBA CRISTALINA - LITICA

METATOBA LITICO-CRISTALINA SERICITICA

309

362

ANÁLISIS QUÍMICO

363

MIGMATITA

364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1336 NGA AG 5094 T 15 19 A - GARROTE

1 5 7 9 M-092-313

2- DATOS DE CAMPO

DOMINIO DE ZAFRA-MONESTERIO. LUGAR DE VALVERDE DE
LLERENA. FORMACION MALCOCANADO. TRAMO VULCANOCLASTICO ACIDO

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

ROCA VULCANOCLASTICA, SERICITICA, ESQUISTOSA. CLASTOS DE
ROCA VOLCANICA DE HASTA 2 CENTIMETROS

4- EDAD

RIFEENSE SUPERIOR - VENDESIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - VALORACION - PROBABLE... P - DATAION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOPSEFITICA 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

SERICITA CUARTO PLAGIOCLASA FELDSPATO-POTASICO 100 153

CLORITA CLORITA 154 207

OPALOS CIRCON ESFENA OXIDOS 208 261

OBSERVACIONES

ROCA VULCANOCLASTICA CON ALGUNOS CLASTOS MONOCRISTALINOS DE
CUARTO Y PLAGIOCLASA. Y ABUNDANTES FRAGMENTOS DE ROCAS IGMAS:

- VIDRIOS VOLCANICOS ACIDOS DESVITRIFICADOS A AGREGADOS MICRO-
CRISTALINOS CUARTO - FELDSPATICOS.
- ROCAS VOLCANICAS PORFIDICAS ACIDAS
- ROCAS MICROCRISTALINAS CUARTO - FELDSPATICAS CON CLORITA
- GRANITOIDE TONALITICO CON CUARTO - PLAGIOCLASA.

UNA FASE TECTONOMETAMORFICA CON BLASTESIS LEPIDOBLASTICA
DE SERICITA - ALARGAMIENTO DE CLASTOS.

UNA S ESPACADA POCO MANIFIESTA

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL
C - DE SOTERRAMIENTO E - PLURIFACIAL 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO B - BAJO D - ALTO 266

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA 268 308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS PROTEROZOICO TERMINAL

10- CLASIFICACION

METATOLITA CRISTALINA-LITICA, METATOLITA-ACIDA

METATOLITA LITICO-CRISTALINA ACIDA SERICITICA 309 369

ANÁLISIS QUÍMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	SC	1514	T		CO	
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Esquistos y cuarcosquistos con cuarcitas negras.
 Dominio de Valencia de las Torres - Censo Murciano. Grupo de
 Córdoba - Puenteobispo.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa microplegada, de
 grano muy fino, cuarcos-feldespática.

4- EDAD

RIFEENSE MEDIO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C
 VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NEISICA. MICROPLEGADA. MILONITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO FELDSPATO - POTASICO ALBITA MOSCOVITA BIOTITA CI

RCON OPACOS ESFENA SERICITA CLORITA

OBSERVACIONES

Roca neisica probablemente derivada de volcanita
 riolitica.

Blastos pseudomáticos respecto a la esquistosidad
 mas patente (milonitica), de moscovita y biotita?

Deformación dinámica con esquistosidad de flexo
 catoclástico, y granulación / recristalización de cuarcos -
 moscovita y biotita (que pasa a clorita). Granulación
 menos acusada de los feldespatos.

Microplegues posteriores, de geometría cilíndrica.

Cuarcos y feldespato potásico remobilizados a fracturas
 tardías.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO
 D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

DA-B

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO
 C - MEDIO
 D - ALTO

B

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

LEUCONEIS
 NEIS MILONITICO DE GRANO MUY FINO (LEUCOCRATICO)

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	SC	1516	7		CO	
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Esquistos y cuarsosquistos con cuarcitas negras.
 Dominio de Valencia de las Torres. Cmo Murceno. Grupo
 de Cordoba. Fuentesovejuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca neisica de grano muy fino
 brechificada.

4- EDAD

R1 FEENSE MEDIO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A ☒ - BUENA B ☐
 - DATACION ABSOLUTA B ☐ VALORACION - PROBABLE P ☒
 - DATACION PALEONTOLOGICA C 44 - DUDOSA D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BRECHOIDE NEISICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO ORTOSA ALBITA SERICITA MOSCOVITA BIOTITA CLORIT

A OPACOS ESFENA CIRCON OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca neisica procedente de material cuerso. feldes-
 patos de origen incierto: posible volcánica volitica,
 o granitoide.

Procesos previos a la brechificación muy enmascara-
 dos por ésta: se reconoce una deformación diná-
 mica que originará la textura neisica, con granula-
 ción importante del cuerso, y fracturación importante
 de los feldespatos.

La brechificación de la roca origina trituración asociada
 a zonas de fractura irregulares y de diversas orientaciones.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO
 D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

☒ B ☐ D ☐ E

7- GRADO DE METAMORFISMO

sin datos

A - MUY BAJO
 B - BAJO
 C - MEDIO
 D - ALTO

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

8- ZONA METAMORFICA

sin datos

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

LEUCANEN, BRECHA TECTONICA
 NEIS BRECHIFICADO (LEUCOCRATICO)

ANALISIS QUIMICO ☐

MIGMATITA ☐

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1536 N65C1510 T

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

CO

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

2- DATOS DE CAMPO

Secuencia de esquistos y cuarcosquistos con cuarcitas
 negras dominio de Valencia de las Torres - Cmo Munano. Grupo de
 Córdoba - Fuenteobezuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca neisica de grano fino.

4- EDAD

RIFEENSE MEDIO - 8

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A
 - DATACION ABSOLUTA B
 - DATACION PALEONTOLOGICA C

VALORACION - BUENA B
 - PROBABLE P
 - DUDOSA D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NEISICA MILONITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, ALBITA-OLIGOCLASA, FELDSPATO-POTASICO, MOSCOVITA

BIOTITA, OPACOS, CIRCON, ESFENA, SERICITA, CLORITA, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de material cuarcoso. feldespáticos de
 origen incerto: probablemente se trate de una roca
 ígnea ácida granuda.

Afectada por una fase dinámica que produce la
 neisificación de la roca; sin embargo, moscovita
 y biotita serían previas a esta fase, y no parecen
 estar previamente orientados.

La fase dinámica produce una esquistosidad de
 flujo cataclástico, con granulación generalizada de cuar-
 zo y biotita, y parcial de feldespato y moscovita.

Esquistosidad espaciada oblicua a la de flujo.
 Fracturas con remobilización de sericita y óxidos.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

DA - B

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO

C - MEDIO
 D - ALTO

B

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA AL MENOS

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

NEIS MILONITICO

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 5 7 9 13
 1536N65C1512T

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

CO

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

2.- DATOS DE CAMPO

Sucesión de esquistos y cuarsosquistos con cuar-
 citas negras. Dominio de Valencia de las Torres. Censo
 Meridiano. Grupo de Córdoba-Fuenteobezuna.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa, moscovítica, con
 abundantes porfiroblastos de granate.

4.- EDAD

R I F E E N S E M E D I O
 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

LEPIDOBLASTICA. PORFIROBLASTICA. MILONITICA. MICROPLEGADA
 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO. PLAGIOCLASA. MOSCOVITA. BIOTITA. GRANATE. CIRCON. OP
 100 153

ACOS. ESFENA. SERICITA. CLORITA. OXIDOS
 154 207

OBSERVACIONES

Roca procedente de material cuarsos-feldespático de origen
 incierto. Por sus caracteres actuales parece derivar de un se-
 dimento lutítico-arenoso, cuarsos-feldespático, fino.

Se reconoce en la muestra un proceso metamórfico
 que origina la moscovita, la biotita y el granate que, co-
 mo en muestras precedentes, serían precinematíticos respecto
 a la esquistosidad más rotente.

Esta esquistosidad se relacionaría con una deformación
 esencialmente dinámica, con intemperación de moscovita y
 blastesis de sericita.

Posterior sería una fase de crenulación, con esquistos-
 idad esporádica.

Fracturas tardías con relleno por minerales secundarios.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

DA-B

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO

C - MEDIO
 D - ALTO

B

8.- ZONA METAMORFICA

GRANATE

268

308

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10.- CLASIFICACION

MILONITA.

ESQUISTO MOSCOVITICO CON GRANATE (NEIS MILONITICO)

309

362

ANÁLISIS QUÍMICO
 363

MIGMATITA
 364

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1536 NGSC 1508 7

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CO

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

2.- DATOS DE CAMPO

sucesión de esquistos y cuarcosquistos con cuarcitas negras. Dominio de Valencia de los Tones. Cuenca de Almería. Grupo de Córdoba. Fuentesobezuna.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Esquisto moscovítico con un nivel neíseo. Trituración

4.- EDAD

RIFEENSE MEDIO

- POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 PROCEDIMIENTO - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

EN PARTE LEPIDOBLASTICA Y EN PARTE NEÍSICA. MILONITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, FELDSPATO-POTÁSICO, PLAGIOCLASA, MOSCOVITA, BIOTI-
 TA, SILLIMANITA, ANDALUCITA, OPACOS, CIRCON, RUTILO, CLORITA
 MICA-INCOLORA, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico - arenoso grueso. Afectada por al menos un evento metamórfico con formación de biotita, moscovita, sillimanita (fibrolita) andalucita en porfiroblastos heliciticos. sillimanita prismática de transformación de algunos blastos de andalucita, y feldespato potásico. Al parecer se trata de una blastesis estática, ~~no~~ no acompañada de esquistosidad.

Deformación dinámica ulterior, con trituración y ~~es-~~ ventación mecánica de las micas, retrogradación de silicato de aluminio, granulación y recristalización del cuarcos, y desarrollo de una esquistosidad cataclástica.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO
 D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

DA-B

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO
 C - MEDIO
 D - ALTO

LD

8.- ZONA METAMORFICA

SILLIMANITA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10.- CLASIFICACION

ESQUISTO MOSCOVITICO, NEIS DE SILICATOS DE ALUMINIO, MILONITIZADO

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 5 7 9 13
 1536 NG SC 1507 T

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CO 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

2- DATOS DE CAMPO

Secuencia de esquistos y cuarcosquistos con cuarcitas negras. Dominio de Valencia de las Torres. Cmo Muriano. Grupo de Córdoba - Fuenteovejuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Anfibolita esquistosa de grano medio.

4- EDAD

RIFEENSE MEDIO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANONEMATOBLASTICA. BRECHIFICADA

COMPOSICION MINERALOGICA

OLIGOCLASA HORNBLENDA BIOTITA ACTINOLITA CLORITA EPIDOTO

TA CALCITA OPACOS APATITO SERICITA ESFENA OXIDOS

OBSERVACIONES

Anfibolita derivada verosimilmente de una roca ígnea básica intercalada en la secuencia lutítica - arenosa, que la embola.

Afectada por deformación y metamorfismo, que produce una gruesa esquistosidad o un bandeo. con blastesis nematoblástica de anfíbol y epidoblástica de biotita.

Retrogradación importante, que sustituye a hornblenda y biotita por actinolita - clorita, esfena, epidoto y calcita.

Bedificación tardía con remobilización de los minerales retrometamórficos.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO
 D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO
 C - MEDIO
 D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

OLIGOCLASA - HORNBLENDA - BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínica.

10- CLASIFICACION

ANFIBOLITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NG 5C 1502 T 15 19

2- DATOS DE CAMPO

Formación de neises y anfibolitas (neises de Azuaga). Dominio de Valencia de los Tones - Ceno Muriato. Grupo de Córdoba - Fuentesobezuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca neisica de grano medio y color marrón.

4- EDAD

PROTEROZOICO - RIFEENSE - INF. ERIÓ

21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A VALORACION - BUENA B

- DATACION ABSOLUTA B A VALORACION - PROBABLE P

- DATACION PALEONTOLOGICA C 44 VALORACION - DUDOSA D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NEISICA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO OLIGOCLASA MOSCOVITA BIOTITA GRANATE FELDSPATO

100 153

- POTASICO OPACOS APATITO ESFENA CIRCON SERICITA CLORIT

154 207

A OXIDOS

208 261

OBSERVACIONES

Roca original probablemente ígnea granítica, porfídica?, afectada por al menos una fase de deformación sinmetamórfica, que origina neisificación con granulización - recristalización del cuarsa concentrado en 'ribbons'. Las plagioclases se conservan como porfirocristales, y han sido granulados en parte. Blastesis de moscovita, biotita y granate.

Con posterioridad al desarrollo de la esquistosidad tiene lugar una importante fracturación, con relleno de minerales secundarios en las fisuras.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL

C - DE SOTERRAMIENTO E - PLURIFACIAL

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO B

B - BAJO D - ALTO

266

8- ZONA METAMORFICA

GRANATE

268 308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrica? Hercínico

10- CLASIFICACION

NEIS BIOTITICO - GRANATIFERO

ORTONEIS CON GRANATE

309 362

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 5 3 6 N G S C 1 2 9 5 T
 1 5 7 9 13

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

2- DATOS DE CAMPO

Formación Malicónada. Dominio de Zafra-Alarcón.
 - Córdoba. Grupo de Córdoba-Fuenteobeguena.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa de color verdoso, brechificada y con abundantes segregaciones de cuarsos.

4- EDAD

RIFEENSE SUP. + VENDIENSE
 21 43

PROCEDIMIENTO

- POSICION ESTRATIGRAFICA... A

- DATACION ABSOLUTA... B

- DATACION PALEONTOLOGICA... C

A

- BUENA... B

VALORACION-PROBABLE... P

- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUISTOSA, PORFIRIOCLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO SERICITA BIOTITA CLORITA OPACOS ESFENA FELDES PA

TO-POTASICO

OBSERVACIONES

Roca procedente de material proclástico sílico, con fenoclastos de cuarsos, y litoclastos formados por cuarsos muy heterométricos y sericita.

Afectada por deformación semi-metamórfica, que crea una esquistosidad de bleije con blastos fundamentalmente de sericita de grano muy fino.

Posteriormente la esquistosidad ha sido microplegada y fracturada.

Diversas fracturas con relleno de cuarsos, feldespato potásico, opacos, y biotita en diversas proporciones.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO

B - DINAMICO

C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL

E - PLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO

B - BAJO

C - MEDIO

D - ALTO

A 266

8- ZONA METAMORFICA

SERICITA

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

METAPOBA-ACIDA

309

362

ANÁLISIS QUÍMICO

363

MIGMATITA

364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	SC	1298	T		CO	
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Amfibolitas en Neises de Asuaga. Dominio de Valencia de las Torres. Cerro Murano. Grupo de Sierra Córdoba - Fuenteobezuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca anfibólica esquistosa, de grano fino, muy fracturada y alterada.

4- EDAD

PROTEROZOICO-RIFEENSE INT.

PROCEDIMIENTO

- POSICION ESTRATIGRAFICA... A

- DATACION ABSOLUTA... B

- DATACION PALEONTOLOGICA... C

A

- BUENA... B

VALORACION-PROBABLE... P

- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANO-NEMATOBLASTICA FRAGMENTACION IMPORTANTE

COMPOSICION MINERALOGICA

OLIGOCLASA ANFIBOL FELDSPATO-POTASICO BIOTITA CUARZO

EPIDOTA OPACOS ESFENA SERICITA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca anfibólica procedente de roca ígnea básica de grano fino (volcánica). con pozos antiguos fenocristales de plagioclasa y anfíbol.

Deformación y metamorfismo que se materializa en una esquistosidad de flujo con blastesis nematoblastica de anfíbol (hornblenda verde pálido - actinolita).

Cubos de sulfuros oxidados en relación con fracturas y diseminados en la roca.

El feldespato potásico sería de origen secundario: en parte aparece en fracturas, y el resto aparece por lo general en proximidad de las mismas.

Cuaso en fracturas irregulares - discontinuas

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO

B - DINAMICO

C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL

E - PLURIFACIAL

D

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO

B - BAJO

C - MEDIO

D - ALTO

B

266

8- ZONA METAMORFICA

HORNBLENDA/ACTINOLITA-OLIGOCLASA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico y Hercínico.

10- CLASIFICACION

ANFIBOLITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	SC	1292	7		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO Neises de Azuaga. Dominio de Valencia de las
Tones. Ceno Murano. Grupo de Cordoba- Fuenteobayuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO Roca neísica de grano medio, fracturada y oxidada.

4- EDAD PROTÉROZOICO-RIFEENSE INFERIOR
21 43
-POSICION ESTRATIGRAFICA... A
-PROCEDIMIENTO... B
-DATACION ABSOLUTA... B
-DATACION PALEONTOLOGICA... C
VALORACION -BUENA... B
-PROBABLE... P
-DUDOSA... D
44 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NEISICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, OLIGOCLASA, BIOTITA, GRANATE,
CLORITA, MOSCOVITA, OPACOS, APATITO, CIRCON, SERICITA, OXIDO
S

OBSERVACIONES

Roca procedente de material cuarcó-feldespático de origen ígneo.

Afectado por una deformación sinistramórfica, con formación de una esquistosidad de flujo marcada por blastesis de biotita lepidoblástica y elongación de los demás componentes (fundamentalmente el cuarcó). Granate algo más tardío.

La biotita y el granate aparecen posteriormente do-
ritizados.

Fracturas con trituración local y remobilización ocasional de cuarcó y feldespato potásico.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO	D - REGIONAL
B - DINAMICO	E - PLURIFACIAL
C - DE SOTERRAMIENTO	

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO	C - MEDIO
B - BAJO	D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

GRANATE

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Précámbrico, Hercínico.

10- CLASIFICACION NEIS BIOTITICO-GRANATIFERO

NEIS CON GRANATE

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NG 5C 1269 T 15 19

2.- DATOS DE CAMPO

2- DATOS DE CAMPO *Excreción de esquistos y cuarcos esquistos con lignita y
cuarcitas negras. Dominio de Valencia de las Torres. Cerro
Muriano. Grupo de Córdoba- Fuentesobezuna.*

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO *Roca esquistosa de grano fino (baja cristalinidad)*

4.- EDAD

RIFESSE MEDIO

-POSICION ESTRATIGRAFICA.....A	-BUENA.....B
PROCEDIMIENTO-DATACION ABSOLUTA.....B	VALORACION-PROBABLE.....P
-DATACION PALEONTOLOGICA.....C	-DUDOSA.....D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPI DOBLASTICA PORFIROCLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO ALBITA-OLIGOCLASA, MOSCOVITA BIOTITA OPACOS CIRC

ON TURMALINA ESFENA SERICITA CLORITA OXIDOS

208
OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico-arenoso fino, con porfiroclastos de plagioclasa (albita actualmente), de probable origen volcánico de tamaño notablemente superior a la media.

Se reconocen en la muestra al menos dos fases de deformación:

- Una primera semimeta-mórfica y sin esquistosa, ~~origina~~ ^{origina} con blastesis lepidoblástica, sincinemática. de moscovita y biotita de grano muy fino que define la esquistosidad de flujo.

- Una segunda que crea una esquistosidad espacia-
da subparalela a la de flexo, con ondulación asociada

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D- REGIONAL
E- PLURIFACIAL

262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO 8
B - BAJO D - ALTO

-266

8.- ZONA METAMORFICA

B. OTITA INCIPIENTE

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Pre-cambrico? Hercínico.

10.-CLASIFICACION

10-CLASIFICACION FILITA, ESQUISTO PLAGIOCLÁSICO
FILITA-ESQUISTO ALBITICO

309

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	SC	1261	T		CO	
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

cuarcita negra en sucesión de esquistos y cuarcosquistos. Dominio de Valencia de las Torres. Ceno Manano. Grupo de Córdoba-Fuentesobezuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca silicea de color negro, grano muy fino, y fracturas con opacos.

4- EDAD

RIFEENSE MEDIO

PROCEDIMIENTO: - POSICION ESTRATIGRAFICA... A ☒ - BUENA... B ☐
- DATACION ABSOLUTA... B ☐ VALORACION-PROBABLE... P ☒
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANO BLASTICA ELONGADA, HETEROMETRICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO GRAFITO BIOTITA KCLORITA ESFENA OPACOS FELDES PAT

0 - POTASICO OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento silíceo de origen químico-bioquímico, rico en materia orgánica.

Se reconocen en la muestra dos deformaciones diferentes:

- Una primera sinmetamórfica y sinesquistosa, con elongación y cementación de los granos de cuarzo, y con blastesis de biotita

- Una segunda con fracturación importante, y relleno hidrotermal de cuarzo, cuarzo-clorita, biotita, biotita-esfena, cuarzo-feldespato potásico, etc.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL ☒
E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO ☒
C - MEDIO
D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

CUARCITA GRAFITOSA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536N65C1255T 15 19

2- DATOS DE CAMPO

Sección de esquistos y cuarsosquistos con cuarcitas negras. Dominio de Valencia de las Torres. Cuenca Muriana. Grupo de Córdoba. Fuentesovejuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa microplegada.

4- EDAD

RIFEENSE MEDIO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A - DATACION ABSOLUTA B - DATACION PALEONTOLOGICA C

VALORACION - BUENA B - PROBABLE P - DUDOSA D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

NEURO - PROTROPICA - INTERIOR

TEXTURA

LEPIDOBLASTICA MICROPLEGADA; PORFIROBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CLARIDO MOSCOVITA BIOTITA GRANATE OPACOS TURMALINA CIRC

ON OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico que embala una cierta fracción arena, muy fina y cuarcítica. Se reconocen en la muestra tres fases de deformación:

- Una primera semimetamórfica y sinerquistosa: origina la esquistosidad de flujo patente en la muestra, con blastesis de moscovita y biotita lepidoblásticas, y de granate helitítico, sin a tardicrenomático. Segregaciones de cuarzo paralelas a la esquistosidad.
- La segunda origina un microplegado intenso de la esquistosidad anterior, al que se asocia una esquistosidad de crenulación, de plano axial.
- La tercera origina una crenulación menos desarrollada, oblicua a la anterior.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO C - DE SOTERRAMIENTO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

GRANATE

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Preámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

MICASQUISTO CON GRANATE

309

362

(Esquisto)

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	5C	1258	T		CO	
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Superación de esquistos y cuarcos esquistos con cuarcitas negras. Dominio de Valencia de las Tonas. Censo Mariano. Grupo de Cordoba-Fuenteovejuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa con granates.

4- EDAD

RIFEENSE MEDIO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A A - BUENA B P
- DATACION ABSOLUTA B VALORACION - PROBABLE P
- DATACION PALEONTOLOGICA C 44 - DUDOSA D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA, PORF, ROBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA MOSCOVITA Biotita GRANATE OPACOS ES

FENA TURMALINA CIRCON SERICITA CLORITA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutitico - arenoso, con fracción arena cuarcítica de grano medio, y escasas plagioclusas.

Se reconocen en la muestra dos fases de deformación:

- Una primera sinmetamorfica: crea una esquistosidad de flujo con blastesis epidoblástica de moscovita y biotita. Granate tándemático, posteriormente cloritizado.
- Una segunda que crea una esquistosidad espaciada muy continua oblicua a la de flujo.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

B 266

8- ZONA METAMORFICA

GRANATE

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

CUARZOESQUISTO CON GRANATE

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	5C	1249	T		CO	
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO Anfibolita en Formación neisico-migmatítica (neises de Azuaga). Dominio de Valencia de las Torres. Cerro Muriano. Grupo de Córdoba-Fuentesovejuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO Anfibolita de grano fino, color verdoso, esquistosa, y con porfirocristales de plagioclasas.

4- EDAD PROTEROZOICO MEDIO-SUP.

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A ☒ - BUENA B ☐
 - DATACION ABSOLUTA B ☐ VALORACION-PROBABLE P ☒
 - DATACION PALEONTOLOGICA C 44 - DUDOSA D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANONEMATOBLASTICA. PORFIROCRISTALES DE PLAGIOCLASA

COMPOSICION MINERALOGICA

OLIGOCLASA-ANDESINA, HORNBLENDA-VERDE, ACTINOLITA, CLORIT

A, OPACOS, ESFENA, APATITO, FELDESPATO-POTASICO, SERICITA, O

XIDOS

OBSERVACIONES

Anfibolita procedente de roca ígnea básica porfírica, en la que se conservan los antiguos fenocristales de plagioclasa, de hasta 2-2'5 mm.

Deformada y metamorfoseada: la roca muestra una esquistosidad marcada por blastesis rena-toblástica de anfíbol. La paragénesis estable es oligoclasa, andesina - hornblenda verde, propia de condiciones de grado bajo-medio. Actinolita y clorita se forman en una fase retrorretrometamórfica a partir de la hornblenda.

Fracturas con rellenos diversos: cuarzo, feldespato potásico, opacos...; los menores definen una esquistosidad espaciada, de fractura.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO
 D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

D

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO
 C - MEDIO
 D - ALTO

BC

8- ZONA METAMORFICA

OLIGOCLASA/ANDESINA-HORNBLENDA VERDE

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico, Hercínico.

10- CLASIFICACION

ORTOANFIBOLITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 5 3 6 N G S C 9 3 4 7

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

2- DATOS DE CAMPO

Formación de Azuaga en proximidad de granito de Peñas Paudas. Dominio de Sierra Albarrana.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca laminada en origen, con evidencias de metamorfismo de contacto

4- EDAD

PRECAMBRIICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A
 - DATACION ABSOLUTA B
 - DATACION PALEONTOLOGICA C

VALORACION - BUENA B
 - PROBABLE P
 - DUDOSA D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTO-SAMITICA Y PELITICA MACULOSA GRANOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, SERICITA, MOSCOVITA, BIOTITA, OPACOS, CIRCON, ANDALU

CITA, PLAGIOCLASA, FELDSPATO-POTASICO, CLORITA, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca basica procedente de sedimento lutitico arenoso, con alternancia de niveles peliticos y granoblasticos, cuarciticos.

Metamorfismo de contacto con blastesis de sericita-moscovita y biotita, y posible andalucita, que caracterizan la parte alta de las cornearas de albita-epidoto.

Feldspatos que reemplazan parcialmente a los niveles arenosos. Tambien, plagioclasas (albita) en fracturas.

Otras fracturas con relleno de cuarzo, o de óxido de hierro tambien asociada a fracturas.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

A 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO

C - MEDIO
 D - ALTO

B 266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA-ANDALUCITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

TARDI-A POST-HERCINICA

10- CLASIFICACION

CORNEANA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	SC	906	T		CO	
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Tramos pisanos en el complejo Volcánico de Enlilas-
- El Paredón. Alinación magnética de Villarviosa-La Corona.
nada.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

laminación patente

4- EDAD

CARBONIFERO INFERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A ☒ - BUENA B ☐
- DATACION ABSOLUTA B ☐ VALORACION-PROBABLE P ☒
- DATACION PALEONTOLOGICA C 44 - DUDOSA D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ALTERNANCIA DE T BLASTO- PELITICA Y SAMITICA. MACULOSA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, SERICITA, MOSCOVITA, CLORITA, PLAGIOCLASA, OPACOS, C

IRCON, APATITO, OXIDOS

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

A ☒ ☐ ☐
262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

A ☒ ☐
266

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

TARDI A POST HERCINICO

10- CLASIFICACION PIZARRA, METAGRAUWACA

ALTERNANCIA DE PIZARRAS Y METAGRAUWACAS

309

362

ANÁLISIS QUÍMICO ☐
363

MIGMATITA ☐
364

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 5 3 6 N 6 5 C 1 6 4 1 T

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CO

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

Sucesión de esquistos y cuarsosquistos con cuarcitas negras. Dominio de Valencia de las Torres. Censo Mariano. Grupo de Córdoba-Fuenteobispo.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca filitica, fina, esquistosa.

4.- EDAD

RIFEENSE MEDIO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOCEPIDOBLASTICA. ESCASOS PORFIROCLASTOS

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, PLAGIOCLASA, FELDSPATO-POTASICO, SERICITA, MOSCOVITA

CLORITA, BIOTITA, OPACOS, CIRCON, TURMALINA, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento mixto detritico-volcanoclastico, con porfiroclastos de cuarzo y ~~de~~ plagioclasa, y matrix muy ferromagnesiaca como principales aportes igneos.

Afectada por un primer proceso de deformación, que produce la zona esquistosidad de flujo con blastesis sincinemática de sericita-moscovita y clorita-biotita epidoblástica, de grano muy fino.

Una segunda fase de deformación origina una esquistosidad asociada, muy continua, y con orientación asociada, oblicua a la anterior.

Fracturas con remobilización de feldespato K y clorita.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

D 262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO

C - MEDIO
 D - ALTO

BA 266

8.- ZONA METAMORFICA

BIOTITA-CLORITA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrica? Hercínico.

10.- CLASIFICACION

ESQUISTO FELDSPATICO

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 5 7 9 13 15 19 CO P. Hiqueras

2- DATOS DE CAMPO

sucesión de micasquistos con intercalaciones de
neises. Dominio de Valencia de las Torres Cno Muriano.
Grupo de Sierra Albarrana.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa, moscovítica, con
porfiroblastos multimetres. de granate y otros(s).

4- EDAD

PRECAMBRIICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A - BUENA B - BUENA B
- DATACION ABSOLUTA B VALORACION-PROBABLE P
- DATACION PALEONTOLOGICA C 44 - DUDOSA D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUISTOSA. PORFIROBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO MOSCOVITA BIOTITA GRANATE ESTAUROLITA OPACOS TV

RMALINA ESFENA CIRCON CLORITA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico - arenoso.
Afectada por una primera deformación sinmetamórfica, con blastos de moscovita sinuematita, y biotita, granate, y estaurolita tardicinemáticas.
Al menos dos fases tardías, con sendas esquistosidades de fractura oblicuas entre si y a la de flujo.
Oxidación importante ligada a las esquistosidades de fractura.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

0

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

C

8- ZONA METAMORFICA

ESTAUROLITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico y hercínico.

10- CLASIFICACION

MICASQUISTO CON GRANATE Y ESTAUROLITA

ANALISIS QUIMICO

MIGMATITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536NGSC1635 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Cuarzos feldespáticos tabbedados. Confinio de Valen-
cia de las Torres. Cno Muriano. grupo de Sierra Albanana.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca cuarcítica, muy fina, feldespáti-
ca, y finamente laminada, o esquistosada.

4- EDAD

PRECAMBRIICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A VALORACION - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B - PROBLEMA... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOBLASTICA ELONGADA. MICAS LEPIDOBLASTICAS

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO FELDSPATO-POTASICO PLAGIOCLASA MOSCOVITA CIRCO

NO PACOS ESFENA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento arenoso, fino, muy
feldespático, con escasa componente lutítica.

Afectada por una fase de deformación, que pro-
duce una esquistosidad de flujo, con blastesis
de moscovita a partir de la escasa componente
lutítica, y elongación de los granos detriticos, que
aparecen totalmente cementados.

Fracturillas tardías con relleno de cuarzo y óxidos

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

AD ?
266

8- ZONA METAMORFICA

MOSCOVITA AL MENOS

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico y/o hercínico.

10- CLASIFICACION

CUARCITA FELDSPATICA (META-ARCOSA FINA)

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	N6	5C	1598	T		CO	
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Esquistos y cuarsosquistos con cuarcitas negras.
 Dominio de Valencia de las Tonas. ~~Cast~~ Muriano. Grupo
 de Córdoba Fuentesovejuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa, moscovítica, be-
 chificada.

4- EDAD

RIFEENSE MEDIO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A ☒ VALORACION - BUENA B ☐
 - DATACION ABSOLUTA B ☐ - PROBABLE P ☒
 - DATACION PALEONTOLOGICA C 44 - DUDOSA D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA. BRECHIFICADA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA FELDSPATO POTASICO MOSCOVITA BIOTI

TA OPACOS CIRCON TURMALINA APATITO ESFENA SERICITA CLO

RITA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca original: sedimento lutítico - arenoso algo feldes-
 pático, fino - medio.

Afectada por una fase al menos de deformación
 sin metamorfica, con clastos epidoblastica de mos-
 covita y biotita; esta fase probablemente presenta
 una certa componente dinámica.

Micropleques suaves posteriores, con esquistosidad asociada.

Por último se produce brechificación, con texturación
 asociada a algunas fracturas; procesos de alteración
 y remobilización / relleno de ciertos minerales en
 fracturas (feldespato potásico fundamentalmente)

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO
 D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

DB

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO
 C - MEDIO
 D - ALTO

B

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico ? Hercínico.

10- CLASIFICACION

CUARZOESQUISTO MOSCOVITICO

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA

EMP

REC

Nº MUESTRA

TA

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGSC1583 7

15

CO

2- DATOS DE CAMPO

Material detritico grueso, arcósico, en Formación Malacornado. Gran Dominio de Valencia de las Torres. Cuenca Muriana. Cuenca de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca detritica, arenosa, cuarzo-feldespática, esquistosa.

4- EDAD

RIFEENSE SUP. - VENDIENSE

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA. A

- DATACION ABSOLUTA. B

- DATACION PALEONTOLOGICA. C

A

VALORACION - BUENA. B

- PROBABLE. P

- DUDOSA. D

44

45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOSAMITICA. ESQUISTOSIDAD INCIPIENTE

46

99

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, PLAGIOCLASA, FRAGMENTOS-DE-ROCA, SERICITA, MOSCOV

100

153

LITA, CLORITA, BIOTITA, EPIDOTA, FELDESPATO-POTASICO, OPACOS

154

207

APATITO, ESFENA, OXIDOS

208

261

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento arenoso, de grano medio-fino, con matrix sericitica-clorítica. Tracción arena constituida por cuarzo, plagioclasa, y fragmentos de rocas variadas, fundamentalmente volcánicas, si bien se reconocen algunas metamórficas, intercrecimientos gráficos... Mas escasos son los clastos de feldespato potásico y micas detriticas (biotita).

Deformación y metamorfismo, que se traducen en blastesis groseramente cindoblastica de sericit-moscovita, clorita-biotita y epidota. Se define una esquistosidad incipiente.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO

B - DINAMICO

C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL

E - PLURIFACIAL

D

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO

B - BAJO

C - MEDIO

D - ALTO

AB

266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA INCIPIENTE

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

METAARCOSEA LITICA

META-ARCOSEA LITICA

309

362

ANÁLISIS QUÍMICO

363

MIGMATITA

364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA

EMP

REC

Nº MUESTRA

TA

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536NGSC1578T

CO

2- DATOS DE CAMPO

Formación Malcoínado. Dominio de Valencia de los Tones. Ceno Manano. Grupo de Córdoba-Fuenteovejuna.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa laminada.

4- EDAD

PROTEROZOICO

RIFEENSE INFERIOR

- POSICION ESTRATIGRAFICA... A

PROCEDIMIENTO - DATACION ABSOLUTA... B

- DATACION PALEONTOLOGICA... C

A

- BUENA... B

VALORACION - PROBABLE... P

- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUISTOSA, LEPIDOBLASTICA MICROPLEGADA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, SERICITA, MOSCOVITA, BIOTITA, CLORITA, ALAGIOCLASA

FELDSPATO-POTASICO, OPACOS, CIRCON, ESFENA, APATITO, OXIDO

S

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico de posible derivación cinerítica.

Afectada por tres fases de deformación:

- Una primera sinmetamórfica y sinesquistosa, con blastesis lepidoblástica de sericita - moscovita y clorita.
- Biotita verdosa, elongación del cuarsa, y segregaciones paralelas a S₁ de este último.
- Microplegues de tendencia angular.
- Fracturación irregular, con oxidación asociada.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO

B - DINAMICO

C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL

E - PLURIFACIAL

D

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO

B - BAJO

C - MEDIO

D - ALTO

AB

266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA INCIPIENTE

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico

10- CLASIFICACION

FILITA, METACINERITA

FILITA O META-CINERITA

309

362

ANÁLISIS QUÍMICO

363

MIGMATITA

364

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NG5C 1576 T 15 19

2.- DATOS DE CAMPO

sucesión de esquistos miloníticos y neises (neises de Azuaga). Dominio de Valencia de las Torres. Cmo Murano. Grupo de Córdoba-Fuenteovejuna.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa monovítica.

4.- EDAD

PROTEROZOICO RIFEENSE INFERRIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A VALORACION - BUENA B

- DATACION ABSOLUTA B A VALORACION - PROBABLE P

- DATACION PALEONTOLOGICA C 44 VALORACION - DUDOSA D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

LEPIDOBLASTICA PORFIROBLASTICA MICROPLEGADA MILONITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA MOSCOVITA BIOTITA GRANATE OPACOS CI

RCON APATITO ESPENA SERICITA CLORITA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de posible sedimento lutítico - arenoso.

Afectada por un primer proceso metamórfico con blastesis de moscovita, biotita y granate.

Fase posterior de carácter dinámico, con reorientación, granulacion, y recrystalización de micas (pasan a sericita y clorita) que definen una esquistosidad de flujo cataclástico.

Fase posterior con microfleques de diversas orientaciones con esquistosidad espacuada asociada.

Por último se produce una fracturación con fisuras rellenas por minerales secundarios.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D - B

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

B

8.- ZONA METAMORFICA

GRANATE

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico. Hercínico.

10.- CLASIFICACION

MICASQUITO CON GRANATE (MILONITIZADO)

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1 5 7 9 13 15 19 P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Muestra de la Formación Malacón, afectada por metamorfismo de contacto. Dominio de Zafra-Alarcón-Córdoba. Cuenca de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca "mosqueada" en la que se aprecia una débil orientación

4- EDAD

RIFEENSE SUP. + VENDEENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA. A A - BUENA B B
- DATACION ABSOLUTA. B VALORACION - PROBABLE. P P
- DATACION PALEONTOLOGICA. C 44 - DUDOSA. D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOBLASTICA, DECUSADA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA FELDSPATO-POTASICO SERICITA-MOSCOV

ITA CLORITA-BIOTITA OPACOS CIRCON TURMALINA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico arenoso fino, cuarzo-feldespático.

Afectada por metamorfismo de contacto, que produce blastesis de sericita-moscovita y clorita-biotita verdosa (localmente, y en su mayor parte asociada a broturillas, junto a feldespato potásico)

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

A

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

BA

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA INCIPIENTE, VERDOSA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Tardihercínico.

10- CLASIFICACION

CORNEANA, PIZARRA MOSQUEADA

ANALISIS QUIMICO

MIGMATITA

363

364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 536 NGA 13000 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

cuarcitas entre materiales datados como silíceos. Dominio de Obispo - Valsequillo - Puebla de la Reina. Unidad autóctona.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca detritica gruesa, feldespática, cementada.

4- EDAD

SILURICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A 44 - BUENA... B 45
- DATACION ABSOLUTA... B - VALORACION-PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, PLAGIOCLASA, FELDSPATO-POTASICO, SERICITA, MOSCOV

ITA, OPACOS, CIRCON, ESFENA, APATITO, FRAGMENTOS-DE-ROCA

OBSERVACIONES

Roca detritica, arenosa, desprovista de matriz lutitica. Se trata en origen de un sedimento arenoso grueso (tamaño medio-grueso), muy feldespática, con algunos fragmentos de roca, volcánicos, microcristalinos.

Afectadas por un proceso metamórfico, que produce recristalización - cementación de los granos detriticos, pero no produce orientación apreciable de la roca.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

sin datos

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

266

8- ZONA METAMORFICA

sin datos

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Hercínico

10- CLASIFICACION

META-ARCOSEA METAARCOSEA

309

362

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1 5 7 9 13 15 19 P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Rocas detriticas inmaduras con niveles de carbonatos datados como silúneos. Dominio de Obejo-Valsequillo-Puebla de la Reina. Unidad autóctona.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca detritica, arenosa, algo moscovítica, escasamente orientada.

4- EDAD

SILURICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - VALORACION - PROBABLE... P - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA FELDSPATO-POTASICO MOSCOVITA BIOTITA

TA OPACOS CIRCON ESTENA SERICITA CLORITA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca detritica arenosa fina, maso-feldespática, con componente lutitica totalmente recrystalizada. Se reconocen bolas de arena que probablemente correspondan a fenomenos de bioturbacion.

Afectada por una deformacion semi-metamorfica, que origina blastesis groseramente epidoblástica de moscovita y biotita de notable cristalinidad, a partir de la escasa componente lutitica.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO C - DE SOTERRAMIENTO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Hercinico.

10- CLASIFICACION

META SUBGRAUVACA FELDSPATICA

ANALISIS QUIMICO

MIGMATITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536NGAI3003 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Muestra de seis pelitos - arenosa parecida a Form. Azuaga, próxima a zona de fractura. Dominio de Obejo - Valsequillo - Puebla de la Reina. Unidad alóctona.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca lutítica - arenosa, con 50% reconocible, bolas de arena, y 5% muy oblicua a 50°.

4- EDAD

PRECAMBRICO - ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A VALORACION - BUENA... B D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRAND LEPI DOBLASTICA ESQUISTOSA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO SERICITA MOSCOVITA CLORITA OPACOS APATITO CIRCO

N ESFENA PLAGIOCLASA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca esquistosa procedente de sedimento lutítico - arenoso, de fracción arena cuarcítica con muy escasa proporción de feldespatos.

Afectada por una primera fase de deformación sin-metamórfica con una cierta componente dinámica, que se traduce en la creación de una esquistosidad de fleije con blastos de sericita - moscovita y clorita - biotita verdosa?, y en granulación / elongación del cuarzo. Cabe la posibilidad de que el proceso dinámico sea posterior al termodinámico que habría producido la blastesis de las micas, que se habrían reorientado mecánicamente en el proceso dinámico.

Segunda fase de deformación con esquistosidad espasada oblicua a la de fleije.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL AB

C - DE SOTERRAMIENTO E - PLURIFACIAL 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO A

B - BAJO D - ALTO 266

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico y/o hercínico.

10- CLASIFICACION

ESQUISTO MILONITICO

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGA 3004 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Muestra de serie metamorfa con intercalaciones de metavolcanitas ácidas y básicas. Base de la unidad de Obejo-Espiel. Dominio de Obejo-Valsequillo-Puebla de la Reina.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca de aspecto porfidico, orientada, muy sericitica

4- EDAD

PRECAMBRIICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A - BUENA B - VALORACION - PROBABLE P - DUDOSA D

- DATACION ABSOLUTA B - 44

- DATACION PALEONTOLOGICA C - 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

LEPIDOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO SERICITA MOSCOVITA FELDSPATO-POTASICO BIOTITA

OPACOS CIRCON

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento ~~lutita~~ sericitica, muy fina con clastos ocasionales mayores de cuarzo y feldspatos, muy heterométricos, y con venas o segregaciones micromáticas de cuarzo-feldspatos.

Afectada por un proceso de deformación sinmetamórfica, que crea una patente esquistosidad de fleijo con blastesis lepidoblástica de sericita moscovita.

Se reconoce una fase posterior con formación de un kink, en relación con la cual se produce remodelación de feldspato potásico y biotización.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

A

266

8- ZONA METAMORFICA

SERICITA-MOSCOVITA

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico - Hercínico.

10- CLASIFICACION

METACINERITA, ESQUISTO

META-CINERITA O ESQUISTO SERICITICO

309

362

ANÁLISIS QUÍMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

153 6NGA 73005 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Rocas básicas en serie basal de la unidad de Obejo - Espiel. Dominio de Obejo - Valsequillo. Puebla de la Reina.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca básica fina, orientada.

4- EDAD

PRECAMBRIICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A 1 - BUENA... B P
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTO-HIALINA

COMPOSICION MINERALOGICA

VIDRIO CLINOANFIBOL EPIDOTA CLORITA PLAGIOCLASA CUARZO

OPACOS CALCITA

OBSERVACIONES

Roca básica prácticamente vítrea, y cuya mineralogía y posición geológica son indicativos de que ha sufrido un proceso tectonometamórfico.

En cuanto a minerales primarios, cabe incluir el anfíbol y la plagioclasa. La epidota, la clorita, y la calcita ~~serían~~ y el cuarzo serían producto de metamorfismo en condiciones de grado muy bajo, con decalcificación y liberación de sílice que pasan a constituir los minerales de neoformación. Esta mineralogía podría igualmente atribuirse a una alteración sintética con la extensión de la roca.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

A 266

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA-EPIDOTA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico. Hercínico.

10- CLASIFICACION

METAVOLCANITA - BASICA

META-VOLCANITA BASICA

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
 1 5 7 9 13 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Seis pelítico-arenosa parecida a Formación de Ariza. Dominio de Obejo-Valsequillo-Puebla de la Reina. Unidad alóctona (Obejo-Espiel)

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca laminada lutítico-arenosa. Se reconocen S. y S., son bastante oblicuos.

4- EDAD

PRECAMBRICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
 - DATACION ABSOLUTA... B VALORACION-PROBABLE... P
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOPELITICA CON NIVELES BLASTOSAMITICOS

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA SERICITA MOSCOVITA BIOTITA OPACOS T

URMALINA CIRCON APATITO OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento laminado, lutítico-arenoso. La fracción arena, muy fina, es algo feldespática. Laminación marcada por diferencias en las proporciones relativas de lutita y arena.

Afectada por una deformación semimetamórfica, que crea una esquistosidad de fleije con clastes de sericita-moscovita y biotita de grano muy fino, biotita blástica. Esta esquistosidad es oblicua a S., sufriendo una notable refracción en los niveles arenosos de mayor potencia.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO
 D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO
 C - MEDIO
 D - ALTO

B 266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico. Hercínico.

10- CLASIFICACION

FILITA LAMINADA

309

362

Filita con láminas arenosas.

ANÁLISIS QUÍMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGA I 3007 T 15 CO P Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Serie pelítica-arenosa parecida a Form. de Azuaga
 Dominio de Obeja-Valsequillo - Puebla de la Reina.
 Unidad alóctona (Obeja-Espiel)

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca detritica fina. Se reconoce S₀ y la linealidad de intersección de S₀ con S₁.

4- EDAD

PRECAMBRICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A VALORACION - BUENA... B
 - DATACION ABSOLUTA... B - PROBABLE... P
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOSAMITICA Y BLASTOPELITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA SERICITA MOSCOVITA BIOTITA CLORITA

OPACOS ESFENA CIRCON TURMALINA FELDSPATO POTASICO OXI

DOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento laminado lutitico-arenoso. Se reconoce un predominio de los niveles arenosos (grauvágicos o subgrauvágicos, algo feldespáticos), que llegan a alcanzar 1.5-2 cm. de potencia.

Afectada por dos fases de deformación:

- Una primera metamórfica. Origina una blastesis epidoblástica de sericita-moscovita, clorita y biotita, de grano muy fino, que definen una esquistosidad de flujo con refracciones muy patentes, semejantes a las que se observan en menor escala en la muestra AI-3006

- Una segunda fase que crea una esquistosidad de fractura, espaciada, ligeramente oblicua a la de flujo, y en relación con la cual se produce oxidación

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO
 D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO
 C - MEDIO
 D - ALTO

B 266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico y/o Hercínico.

10- CLASIFICACION

FILITITA ARENOSA, LAMINADA

ANÁLISIS QUÍMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	AI	3008	T		Co	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

2.- DATOS DE CAMPO *Serie pelítico-arenosa parecida a Formación de Aruaga.*
Muestra tomada próxima a zona de fractura. Dominio de Obejo-
-Valsequillo - Pueblo de la Reina. Unidad alóctona (Obejo-Espiel)

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO *Roca filitica oscura. So y Si, muy poco
patentes.*

4.- EDAD

PRECAMBRIICO-ORDOVICICO

-POSICION ESTRATIGRAFICA..... A	-BUENA..... B
PROCEDIMIENTO-DATACION ABSOLUTA..... B	VALORACION-PROBABLE P
-DATACION PALEONTOLOGICA..... C	-DUDOSA..... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTO-PELITICA X SAMITICA ESQUISTOSA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, PLAGIOCLASA, SERICITA, MOSCOVITA, CLORITA, BIOTITA

OPACOS CIRCON ESFENA OXIDOS

208
OBSERVACIONES

Roca filítica procedente de sedimento lutítico-arenoso. La fracción arena es escasa, tamaño fino, y algo feldespática.

afectada por una fase principal de deformación, que crea una esquistosidad de fluye con blastesis de sericita, moscovita epidoblástica, y diversas fases tardías, con micropleques de la esquistosidad y esquistosidades espaciadas, de fractura, de sistematización estadística prácticamente imposible: se reconocen al menos dos muy oblicuas.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO

A	
---	--

B - BAJO D - ALTO

8.- ZONA METAMORFICA

SERICITA-MOSCOVITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico 2% Hercínico

10.- CLASIFICACION

FILITA

ANALISIS QUIMICO ☐ 363

MIGMATITA ☐ 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536N6A130107 15 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

serie filitica-arenosa, parecida a Formación de Azuaga. Muestra tomada en proximidad de zona de fractura. Dominio de Obejo - Valsequillo - Puebla de la Reina. Unidad

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca pisanosa o filitica, fina, esquistosa.

4- EDAD

PRECAMBRICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION-PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUISTOSA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, SERICITA, MOSCOVITA, CLORITA, BIOTITA, FELDSPATO - P

OTASICO, OPACOS, TURMALINA, ESTENA

OBSERVACIONES

Roca filitica procedente de sedimento lutitico-arenoso con inclusiones milimetricas arenosas, granuquicos, de difícil observación en la lámina.

Afectada por una fase principal de deformación, sinmetamórfica, que origina una esquistosidad de flexión con blastesis epidoblastica de sericita-moscovita y biotita-clorita?, sinmetamórficas, y por una o dos fases tardías, con esquistosidad de fractura, esparada, en relación con las cuales se produce oxidación.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

BA 266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA INCIPIENTE

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambrio, Hercinico

10- CLASIFICACION

FILITICA

ANÁLISIS QUÍMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 5 3 6 N G A I 3 0 1 1 T 15 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Muestra del granito del Escribano, en proximidad de zona de fractura.

Comunión de Obeja - Valsequillo - Puebla de la R. Unidad albitica (Obeja-Espiel)

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca granuda, rosada (acida), con evidencias de deformación importante.

4- EDAD

RIFEENSE SUP. - VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - VALORACION - PROBABLE... P - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

MILONITICA. NEISICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, ALBITA, OLIGOCLASA, FELDSPATO-POTASICO, EPIDOTA, C

LORITA, SERICITA, MOSCOVITA, OPACOS, APATITO, CIRCON, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca milonitica procedente de granito de grano medio, cuya textura original ha sido totalmente oblterada.

La deformación milonitica se traduce en traslocaciones intergranulares, granulacion del cuarsos, y parcial de feldespatos, y deformación interna de estos ultimos. Se reconocen bandas bien delimitadas en las que se produce una importante reduccion del tamaño de grano.

Blastesis de epidota y clorita tardias respecto a la deformación dinamica.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA-EPIDOTA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambrico, Hercinico.

10- CLASIFICACION

ORTO-NEIS MILONITICO ORTONEIS, NEIS MILONITICO

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
 1 5 7 9 13 15 19 P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

serie filitica-arenosa parecida a Formación de Azuaga.
 Dominio de Obejo-Valsequillo-Puebla de la Reina. Unidad alóctona
 (Obejo-Español)

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca filitica fina. Se reconoce una
 cierta laminación (niveles < 1 mm arenosos).

4.- EDAD

PRECAMBRIICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
 - DATACION ABSOLUTA... B VALORACION-PROBABLE... P
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUISTOSA, CRENULADA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO SERICITA, MOSCOVITA CLORITA, BIOTITA OPACOS TURMA

LINA ESFENA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca filitica procedente de sedimento lutitico-arenoso.
 No se reconoce la laminación que se aprecia en la
 muestra de mano, ya que la fracción arena apa-
 rece dispersa en la lutita.

Afectada por al menos dos fases de deformación:
 una primera sinmetamórfica, que crea una esquisti-
 tudad de flexo con blastos epidoblásticos de sericita
 -moscovita y clorita biotita vedosa algo mas tardía,
 ya una segunda que crenula intensamente a la esquisti-
 tudad anterior.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO
 D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

D 262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO
 C - MEDIO
 D - ALTO

AB 266

8.- ZONA METAMORFICA

CLORITA-BIOTITA INCIPIENTE

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambrio y/o hercinico.

10.- CLASIFICACION

FILITA

ANÁLISIS QUÍMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536NGAI3013 T 15 19 C0 P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Material volcánico asociado al granito del Escudo. Cerro de Obejo - Valdequillo - Puebla de la Reina. Unidad alóctona (Obejo - Espiel)

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca cuarsa-feldespática esquistosa.

4- EDAD

RIFEENSE SUP^{ERIOR} - VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - VALORACION - PROBABLE... P - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA, BDA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO FELDSPATO - POTASICO PLAGIOCLASA MOSCOVITA BIOTI

TA CLORITA OPACOS CIRCON TURMALINA APATITO SERICITA OX

1005

OBSERVACIONES

Roca cuarsa-feldespática de origen incierto. Probablemente corresponda a una roca porfídica, subvolcánica o volcánica incluida en la serie. En cualquier caso, su composición sería riolítica.

Afectada por una primera fase sinmetamórfica con una cierta componente dinámica, que origina una gran esquistosidad de fleijo con clastos de moscovita y biotita sinclinalmente, y granulación parcial del cuarsa. En relación con esta fase se produce segregación de feldespato potásico a favor de la esquistosidad.

Una segunda fase origina pliegues de la esquistosidad. Esta muy poco desarrollada.

Retrogradación (cloritización) de la biotita

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL DB
C - DE SOTERRAMIENTO E - PLURIFACIAL 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO B
B - BAJO D - ALTO 266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico ? Hercínico.

10- CLASIFICACION

METARIPOLITA

METARRIOOLITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536NGAI3014 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Riolitas asociadas al granito del Escubano. Comi-
mo de Obeso-Valseguillo - Puebla de la Reina. Unidad alóctona
(Obeso - Espiel)

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca silícea muy orientada (flujo?)
y en parte brechificada.

4- EDAD

RIFEENSE SUP-^{epire} VENDOENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA. A VALORACION - BUENA. B
- DATACION ABSOLUTA. B VALORACION - PROBABLE. P
- DATACION PALEONTOLOGICA. C VALORACION - DUDOSA. D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO FELDSPATO - POTASICO PLAGIOCLASA CLORITA OPACOS
CIRCON APATITO SERICITA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de volcánita ácida, de composición
volcánica y textura granular de grano fino a muy
fino.

La roca aparece afectada por al menos dos fases
de deformación:

- Una primera sinmetamórfica, que origina la
orientación de la roca, con crecimiento granoblástico
de los minerales fundamentales, y blastesis biotita-
blástica de clorita - (biotita verdosa).

- La segunda crea una esquistosidad de fractura
oblicua a la de flujo. La interferencia de ambas pro-
duce en la muestra de mano el aspecto brechoidal.
Remoción tardía de feldespato potásico.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

A 266

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

METARIOLITA

METARRIOLITA

ANÁLISIS QUÍMICO 363

MIGMATITA 364

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA

EMP

REC

Nº MUESTRA

TA

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536NGAT3015T

CO

P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

Muestra de rocas básicas de la serie metamórfica de la Unidad alóctona. Comunidad de Obejo - Valdequillo - Puebla de la Reina.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca vendosa de grano muy fino orientada y fracturada.

4.- EDAD

PRECAMBRICO

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA. A
- DATACION ABSOLUTA. B
- DATACION PALEONTOLOGICA. C

A

VALORACION - BUENA. B
- PROBABLE. P
- DUDOSA. D

B

45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOPORFIDICA

46

99

COMPOSICION MINERALOGICA

HORNBLENDA PLAGIOCLASA CUARZO EPIDOTA ESFENA OPACOS CA

100

153

LCITA OXIDOS SERICITA CLORITA

154

207

208

261

OBSERVACIONES

Roca básica porfídica deformada y alterada. La roca original correspondería a una lava andesítica - cuarsandesítica?, porfídica, con fenocristales de anfíbol de hasta 700-800 micras en matrices microcristalina a de grano muy fino.

Afectada por deformación y metamorfismo, que produce una gruesa orientación de la roca. Blastéris de epidota, y liberación de sílice y calcio que constituyen respectivamente cuarsos y calcita. El anfíbol sería paragenético con estas condiciones, y procedería, probablemente, de una primaria diferente.

Removilización algo tardía de la calcita y el cuarsos neoformados.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO

B - DINAMICO

C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL

E - PLURIFACIAL

D

262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO

B - BAJO

C - MEDIO

D - ALTO

B

266

8.- ZONA METAMORFICA

HORNBLENDA VERDE

268

308

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico, Hercínico

10.- CLASIFICACION

METAANDESITA

META-ANDESITA

309

362

ANALISIS QUIMICO

363

MIGMATITA

364

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536N6A73026 T 15 19 CO P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

Sucesión de micarquistos y paragneises. Dominio de Valencia de las Torres. Ceno Manano. Grupo de Sierra Albanara.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa tipo neis micáceos.

4.- EDAD

PRECAMBRIICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

PORFIROBLASTICA, ESQUISTOSA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO ALBITA MOSCOVITA BIOTITA GRANATE DISTENA SILLIMANITA

ANITA OPACOS CIRCON TURMALINA OXIDOS SERICITA CLORITA

OBSERVACIONES

Roca procedente de material cuarno-feldespático de origen incierto, y de composición inicial muy aluminica.

Afectado por un primer proceso metamórfico, con blastos de biotita, granate, andalucita y sillimanita, y moscovita mas tardia, en grandes blastos desordenados. La plagioclasa podria ser tambien, al menos en parte, de origen blástico.

Se reconoce una segunda fase con deformación de caracter dinámico, que produce la orientacion patente en la muestra, a la que se asocia retrogradación de algunos minerales.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D, B

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

CD

8.- ZONA METAMORFICA

DISTENA-SILLIMANITA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico y/o Hercínico.

10.- CLASIFICACION

NEIS MICACEOS, NEIS MICACEOS, NEIS CILINDRICOS-SILLIMANITICO.

NEIS CON DISTENA-SILLIMANITA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGA73027 T 15 19 CO P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

Suena de micarquistos y paraneises. Somino de Valencia de los Torres. Ceno Merano. Grupo de Suena Albarrana.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa, cuarsa feldespática, con niveles mas o menos micáceos.

4.- EDAD

PRECAMBRIICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO ALBITA MOSCOVITA BIOTITA GRANATE FELDSPATO-POT

ASICO OPACOS CIRCON SERICITA OXIDOS TURMALINA

OBSERVACIONES

Roca procedente de material cuarsa-feldespático con una cierta componente pelítica.

Afectada por un primer proceso de deformación, sin metamorfismo, con blastosis de moscovita, biotita y granate, sin a tectonemático. Los minerales micáceos definen una gresca esquistosidad.

Una segunda fase de deformación origina pliegues de geometría mal definida en la esquistosidad anterior.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL C - DE SOTERRAMIENTO E - PLURIFACIAL

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

8.- ZONA METAMORFICA

GRANATE

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico y hercínico.

10.- CLASIFICACION

NEIS BIOTITICO-GRANATIFERO

NEIS BIOTITICO CON GRANATE

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NGA	I3028	T			C	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Muestra tomada en el contexto de un granito milonitizado, alojada en una zona de fractura, y relacionada con materiales del grupo de Sierra Albarrana

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca brechoide, con clastos de tamaño muy variable.

4- EDAD

HERCINICO

PROCEDIMIENTO	-POSICION ESTRATIGRAFICA... A	-BUENA... B
	-DATACION ABSOLUTA... B	VALORACION-PROBABLE... P
	-DATACION PALEONTOLOGICA... C	-DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

MILONITICA O BLASTOSEFITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO FRAGMENTOS-DE-ROCA SERICITA MOSCOVITA CLORITA

FELDSPATO-POTASICO OPACOS CIRCON OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca brechoide de origen probablemente tectónico, dado que aparece en un contexto granítico. Clastos constituidos casi exclusivamente por cuarcos, probablemente debido a degradación de los feldspatos. Recristalización de la matrix - mesostasis, con blastesis de sericita - moscovita y clorita, de grano muy fino ambos. Oxidación asociada a las superficies de fractura.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO	D - REGIONAL
B - DINAMICO	E - PLURIFACIAL
C - DE SOTERRAMIENTO	

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO	C - MEDIO
B - BAJO	D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Hercinico

10- CLASIFICACION

BRECHA RECRISTALIZADA MILONITA BLASTOMILONITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NS	AI	3030	T			P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Sección de micarginita y paragneises. Dominio de Valencia de las Torres - Coto Muro. Grupo de Sierra Albanana.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca aparentemente indeformada, porfídica.

4- EDAD

PRECAMBRIICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NEISICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA CLORITA, BIOTITA SERICITA, MOSCOVITA

OPACOS ESFENA APATITO ALLANITA

OBSERVACIONES

Roca neisica, procedente de material cuaso-feldspático de origen incierto: podría tratarse de un granito (s.l.), o hasta de una toba. La presencia en una elevada proporción, y con grandes tamaños de grano, de esfena y apatito, fundamentalmente, hablan en favor de la primera posibilidad.

Afectada por deformación y recristalización metamórfica, ^{que han} originado la textura neisica, con blastesis de ~~biotita~~ biotita (posteriormente cloritizada?) y moscovita.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico y/o hercínico.

10- CLASIFICACION

ORTONEIS

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NGA	I3031	T				P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO Roca fina, laminada, y brechificada.

4- EDAD

21	43	PROCEDIMIENTO	- POSICION ESTRATIGRAFICA... A	- BUENA... B
			- DATACION ABSOLUTA... B	VALORACION-PROBABLE... P
			- DATACION PALEONTOLOGICA... C	- DUDOSA... D
			44	45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA (MILONITICA?) BRECHIFICADA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA SERICITA MOSCOVITA CLORITA Biotita

OPACOS CIRCON ESFENA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca esquistosa, orientada, muy rica en plagioclasa, procedente o bien de un sedimento arenoso, o bien de una roca ígnea ácida; en el segundo de los casos habria sufrido una deformación milonítica, con una importante reducción del tamaño de grano, y posteriormente habria recrystalizado.

En el primer caso (metasedimento) la roca habria sufrido una deformación semimetamórfica y sin esquistosa, con sericita - moscovita y clorita - biotita verdosa como minerales característicos.

Brechificación importante, a la que se asocia cloritización, removilización de cuarzo y plagioclasa, y oxidación.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO	D - REGIONAL
B - DINAMICO	E - PLURIFACIAL
C - DE SOTERRAMIENTO	262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO	C - MEDIO
B - BAJO	D - ALTO
265	AB

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA-BIOTITA VERDOSA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

10- CLASIFICACION ESQUISTO MILONITICA

ESQUISTO (MILONITICO?) BRECHIFICADO

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NGBD		6	7		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

Muestra de la Formación Malacónado. Dominio de Zafra-Alarcos - Córdoba. Grupo de Cerro de Villavieja

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca porfídica con orientación muy patente.

4.- EDAD

PRECAMBRIICO SUPERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOPORFIDICA, GRANOLEPIDOBLASTICA, BRECHO, DE

COMPOSICION MINERALOGICA

OLIGOCLASA, CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, SERICITA, MOSCOVITA

TA, CLORITA, BIOTITA, OPACOS, CIRCON, APATITO, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca volcánica ácida deformada y metamorfizada. No se reconoce si en origen correspondía a una lava o a una toba, dado que existen procesos de brechificación tardía que producen "seudo" clastos que pueden confundirse con litoclastos auténticos. De ser una lava sería de textura porfídica, con matriz microcristalina microlítica.

Afectada por un proceso de deformación semimetamórfica, que origina blastesis epidoblástica de sericita-moscovita y clorita-biotita verdosa, de grano muy fino, sericiniticas.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

8.- ZONA METAMORFICA

BIOTITA INCIPIENTE

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Hercínico Precámbrico?

10.- CLASIFICACION

METALAVA, METATOBA, METARIODACITA, METAULCANITA-ACIDA

META-LAVA TOBA RIODACITICA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	BD	9	T		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Muestra de la Formación Malesonado. Dominio de Zafra-Alarcón - Córdoba. Cuenca de Villaviciosa.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca conglomerática o aglomerática fuertemente orientada (esquistada) y microplegada.

4- EDAD

PRECAMBRIICO SUPERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A ☒ VALORACION - BUENA... B ☒
 - DATACION ABSOLUTA... B ☐ VALORACION - PROBABLE... P ☐
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C ☐ VALORACION - DUDOSA... D ☐

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA, BLASTOSEFITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, OLIGOCLASA, CLORITA, BIOTITA, SERICITA, MOSCOVITA, P

ISTACITA, OPACOS, OXIDOS

OBSERVACIONES

Aglomerado volcanoclastico deformado y metamorfoseado, constituido por grandes clastos, en su totalidad de origen volcanico, de composición y caracteres texturales variados: lavas básicas, porfidos andesíticos, granitoides...

La matriz es tobácea. Comporta litoclastos menores semejantes a los de mayor tamaño, y fenoclastos inferiores al milímetro de cuarcos volcanicos y plagioclasa. Su matriz, a su vez, es muy cloritica.

Afectado por un proceso dinamo-termico que origina una gruesa esquistosidad de flujo, con blastesis de clorita-biotita verdosa lepidoblástica y sericita-moscovita lepidoblástica, y de epidota.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D ☐

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

BA ☐

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA INCIPIENTE

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambrio? Hercinico

10- CLASIFICACION

METAAGLOMERADO ACIDO

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	BD	12	T		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

Material detritico fino de edad Carbonifera Inferior, de la alineación magmática de Villavieja de la Coronada.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca detritica bandeada. Se reconoce S₀ y diversas fracturas subparalelas, normales a S₀

4.- EDAD

CARBONIFERO INFERIOR

PROCEDIMIENTO	-POSICION ESTRATIGRAFICA... A	-BUENA... B
-DATACION ABSOLUTA... B	A	B
-DATACION PALEONTOLOGICA... C	44	45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOSAMITICA Y BLASTOPELITICA. BANDEADA (S₀)

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO SERICITA MOSCOVITA CLORITA PLAGIOCLASA OPACOS
IRCON ESFENA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca detritica recristalizada, constituida por una alternancia de lutitas y gneissos en origen.
Se reconoce un nivel gneissico con un contacto brusco (muro?) y otro gradual (techo?).
Fracción arena muy rica en cuarzo.
Recristalización metamórfica de la componente lutítica, en sericita - moscovita y clorita.
Fracturas tardías con cuarzo + clorita.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO	D - REGIONAL
B - DINAMICO	E - PLURIFACIAL
C - DE SOTERRAMIENTO	262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO	C - MEDIO
B - BAJO	D - ALTO
266	A

8.- ZONA METAMORFICA

CLORITA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Hercinico (Tardi)

10.- CLASIFICACION

PIZARRA, METAGRAUWACA
PIZARRAS Y METAGRAUWACAS

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	BD	16	T		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

Muestra de rocas ácidas de Formación Malocinado.
Dominio de Zafra-Alanis-Córdoba. Cima de Villavieja.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca silicea rosada de aspecto brechoso, con fracturillas mayores rellenas por cuarzo.

4.- EDAD

PRECAMBRIICO SUPERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOPORFIDICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO OLIGOCLASA FELDSPATO-POTASICO CLORITA, BIOTITA

SERICITA, MOSCOVITA OPACOS CIRCON OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca original porfídica ácida, constituida por fenocristales de plagioclasa sódica de hasta 5mm embebidos en matriz microcristalina de cuarzo-feldespato potásico-plagioclasa con abundante fenomagnesiano cuya naturaleza original no se reconoce.

Afectada por un proceso metamórfico, que produce la blastesis de clorita-biotita verdosa y sercita-moscovita de grano muy fino, y por un proceso posterior de brechificación, que produce abundantes fracturillas, que se rellenan por remobilización de feldespato potásico y biotita marrón y verde, por cuarzo hidrotermal (mas tardío), y óxidos de Fe-Mn.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO

C - MEDIO
D - ALTO

BA

8.- ZONA METAMORFICA

BIOTITA INCIPIENTE

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico

10.- CLASIFICACION

META-RIOLITA META RIOLITA

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	80	17	T		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Dique de rocas ácidas que encaja en materiales carboníferos, en proximidad de la mina "Mirabuenos".

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca silicea de aspecto milonítico.

4- EDAD

TARDI-HERCINICO

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

A

VALORACION - BUENA... B

- PROBABLE... P

- DUDOSA... D

P

45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

MILONITICA

46

99

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, ALBITA-OLIGOCLASA, OPACOS, CIRCON, ESFENA, CLORITA

100

153

SERICITA, CALCITA, DOLOMITA

154

207

OBSERVACIONES

208

261

Roca milonitizada, que procede de una roca ígnea ácida de textura original inconocible: podría ser desde una roca porfídica, con grandes fenocristales de cuarzo y plagioclasa, hasta una roca granada, de grano medio.

La roca es muy leucocrata; como feno-magnesianos únicamente se reconoce clorita.

El proceso dinámico produce una intensa granulación del cuarzo, y meno de la plagioclasa, y una completa desorganización textural de la muestra, ya el se asocian una cloritización y sericitización notable, y carbonatación en relación con las fracturillas.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO

C - MEDIO
D - ALTO

A

266

8- ZONA METAMORFICA

SERICITA, CLORITA

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Tardihercinica.

10- CLASIFICACION

MILONITA, NEIS MILONITICA, LEUCONELIS

MILONITA, O NEIS LEUCOCRATO MILONITICO

309

362

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	80	23	7		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Dique de rocas ácidas, que encaja en materiales carboníferos, de la alineación magmática de Villavieja-La Corrada.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca silicea de aspecto porfídico, orientada y brechificada.

4- EDAD

TARDI-HERCINICO

PROCEDIMIENTO	-POSICION ESTRATIGRAFICA... A	-BUENA... B
-DATACION ABSOLUTA... B	A	P
-DATACION PALEONTOLOGICA... C	44	45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

MILONITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, ALBITA-OLIGOCLASA, FELDSPATO-POTASICO, OPACOS, ESFENA, CIRCON, APATITO, CLORITA, EPIDOTA, SERICITA, CARBONATO

OBSERVACIONES

Roca milonítica, procedente de roca ácida de textura original reconocible: podía ser tanto porfídica como granuda de grano medio.

Constituida en origen por cuarzo, plagioclasa sódica, biotita (se reconocen pseudomorfos cloríticos) y feldespato potásico (escaso).

El proceso dinámico se traduce en granulación ^{en total} y fleije del cuarzo, que produce una grosera esquistosidad, y parcial de los demás componentes, en mayor o menor grado. A este proceso se asocian cloritización, epidotización, carbonatación y sericitización, que pueden estar en relación con un proceso hidrotermal o bien con un metamorfismo asociado a la milonitización.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO	D - REGIONAL
B - DINAMICO	E - PLURIFACIAL
C - DE SOTERRAMIENTO	262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO	C - MEDIO
B - BAJO	D - ALTO
266	?

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA-EPIDOTA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Tardihercinica

10- CLASIFICACION

MILONITA, NEIS MILONITICO

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGBD 24 T 15 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Secuencia de micarquistos con grandes porfiroblastos de moscovita. Dominio de Valencia de las Torres - Ceno Manano. Grupo de Sierra Albarrana

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca cuarsa-feldespática, esquistosada, con diferenciación según la esquistosidad, y grandes placas desorientadas de moscovita.

4- EDAD

PRECAMBRIICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

PORFIROBLASTICA, GRANOLEPIDOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA BIOTITA MOSCOVITA GRANATE CLORITA O

XIDOS CIRCON APATITO RUTILO ESFENA SERICITA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca cuarsa-feldespática de naturaleza original no precisable. Probablemente corresponde a una roca tobasca de composición dacítica.

La roca ha sufrido dos fases tectonometamórficas:

- La primera se traduce en blastesis orientada de biotita, de granate, y de grandes placas tardías de moscovita, que incluyen al menos a la biotita.

- La segunda es una deformación de carácter dinámico, al menos en parte, que origina una gresca esquistosidad, con granulación del cuarsa, y reorientación mecánica y deformación de las grandes placas de moscovita. La orientación de biotita reconocible puede ser también en su mayor parte mecánica.

Micropleques posteriores de la esquistosidad.

Continuación de biotita y granate, que pueden estar en relación con la segunda fase.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

GRANATE

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico-Motercínico.

10- CLASIFICACION

NEIS RABIOCLASTICO, NEIS BIOTITICO - GRANATIFERO

NEIS BIOTITICO CON GRANATE

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	BD	25	T		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Intercalación varcítica en la sucesión de masas y micarquistos con grandes porfiroblastos de moscovita. Dominio de Valencia de las Torres - Cera Munera. Grupo de Sierra Albarrana.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca varcítica esquistosa, microplegada y brechificada.

4- EDAD

PRECAMBRIICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B - VALORACION-PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANO(LEPIDO)BLASTICA BRECHIFICACION IMPORTANTE

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO FELDSPATO-POTASICO PLAGIOCLASA CLORITA BIOTITA

MOSCOVITA OPACOS CIRCON SERICITA OXIDOS

Roca procedente de sedimentos lutitico-arenosa, constituido en su mayor parte por fracción arena, con cuarsos y feldspatos en proporciones variables como principales constituyentes. La fracción lutita es bastante escasa.

Afectada por tres fases de deformación reconocibles en la muestra:

Una primera sinmetamórfica, que origina recristalización lepidoblástica de la componente lutítica de la roca en biotita muscovita-ventosa, clorita y moscovita.

- Una segunda que origina microplegues, que se reconocen mal en la lámina.

- Una tercera con brechificación, en relación con la cual se produce entrada de óxidos.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

BD

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

B

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambrio y Hercínico

10- CLASIFICACION

METARCOSA BRECHIFICA DA

META-ARCOSA BRECHIFICA DA

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NGBD		27	T		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Rocas interestratificadas entre materiales del Carbonífero, en proximidad del contacto del complejo de Los Ojuelos - La Coronada.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca porfídica básica indeformada apreciablemente.

4- EDAD

CARBONIFERO INFERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOBLASTICA A BLASTOPORFIDICA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

OLIGOCLASA HORNBLENDA EPIDOTA CUARZO BIOTITA CLORITA O

100 153

PACOS APATITO SERICITA

154 207

208 261

OBSERVACIONES

Roca original básica porfídica, con fenocristales de plagioclasa de hasta 1-1'5 mm, en matriz de grano fino. Su posición en el campo es contrahistórica con su cristalinidad. Se trata de una parte central de colada, con enfriamiento lento, o un dique - capa.

Afectada por un proceso de metamorfismo térmico, que produce blastesis desorientada de hornblenda, epidota, y biotita roja, que posteriormente ~~se~~ pseudomorfiza ~~por~~ ~~biotita~~ clorita. Este metamorfismo térmico estaría relacionado con la intrusión del complejo de Los Ojuelos - La Coronada.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

A 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

C 266

8- ZONA METAMORFICA

HORNBLENDA MARRON

268 308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

10- CLASIFICACION

CORNEANA

309 362

ANÁLISIS QUÍMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	BD	34	7		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Muestra de la Formación Malacónada. Dominio de
 Esfira-Alanis-Córdoba. Uña de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca silicea fina esquistosada y micro-
 plegada.

4- EDAD

PRECAMBRIKO SUPERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA CUARZO MUY ELONGADO

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO SERICITA-MOSCOVITA OPACOS CIRCON ESFENA OXIDOS

TURMALINA

OBSERVACIONES

Roca de posible derivación ígnea, tobacea, constituida
 en origen por clastos de cuarcos en matriz lutítica

Afectada por un proceso de deformación semmeta-
 morfica, con una cierta componente dúctil, que
 crea una esquistosidad de flejes con blastesis de mos-
 covita y sericita-moscovita epidoblásticas, y elongación
 debida a granulación de los clastos de cuarcos.

Segunda fase que origina una crenulación ligera-
 mente oblicua a la esquistosidad de flejes, y una esquis-
 tosidad espaciada en relación con la cual se depositan
 óxidos.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

DB

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO
 C - MEDIO
 D - ALTO

AB

8- ZONA METAMORFICA

MOSCOVITA AC MENOS POCO INDICATIVO

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambrico? Hercínico

10- CLASIFICACION

CUARZO ESQUISTO SERICITICO

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGBD 35 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Rocas básicas en Formación Malacínado. Domi-
nio de Zafra-Alarcos - Córdoba. Cuna de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca básica ^{porfídica} con superficies irregulares
de flujo.

4- EDAD

PRECAMBRIICO SUPERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B - VALORACION-PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOPORFIDICA

COMPOSICION MINERALOGICA

PLAGIOCLASA ANFIBOL CUARZO FELDESPATO-POTASICO EPIDOTA

CLORITA y BIOTITA OPACOS APATITO CIRCON RUTILO SERICITA

OXIDOS VIDRIO

OBSERVACIONES

Roca básica-intermedia, lavica, metamorfizada.
Constituida por fenocristales de plagioclasa de hasta 5-15 mm,
de cuarsos (menores), anfíbol (escazos) y feldespato potá-
sico (también escasos), embebidos en una matriz vítrea
en parte y con evidencias de flujo.

La roca ha sufrido ~~proceso~~ una serie de cambios
mineralógicos, que se traducen en epidotización y
cloritización fundamentalmente, que pueden atribuirse
tanto a un metamorfismo regional como a una
propilitización sinéctica.

Removilización de feldespato potásico a fracturillas.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

AB 266

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA-EPIDOTA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico

10- CLASIFICACION

META VOLCANITA-INTERMEDIA

META-LAVA CUARZOANDESITICO-~~METAVOLCANITA~~

Possible lava propilitizada.

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 5 7 9 13 15 19

1536 NGBD 40 T CO P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

Muestra de rocas ácidas de la Formación Malcoivado.
Dominio de Zafra-Almaris-Córdoba. Cuenca de Fuentebzuma.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca porfídica esquistosada.

4.- EDAD

PRECAMBRIICO SUPERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOPORFIDICA ESQUISTOSA

COMPOSICION MINERALOGICA

OLIGOCLASA CUARZO FELDSPATO-POTASICO SERICITA MOSCOVITA

TA BIOTITA OPACOS CIRCON APATITO

OBSERVACIONES

Roca ácida, volcanoclástica, con fenoclastos de hasta 1 mm de plagioclasa y litoclastos policristalinos de menor tamaño, y muchos mas escasos. La matriz está constituida por cuarzo, feldspatos y minerales arcillosos recrystalizados.

Afectada por un proceso de deformación, sin metamorfismo, que crea una esquistosidad de flujo, con blastesis sinuematita de sericita-moscovita lepidoblástica y biotita probablemente mas tardía en sombras de presión de los fenoclastos, fundamentalmente.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

8.- ZONA METAMORFICA

MOSCOWITA-BIOTITA? INCIPIENTE

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico?, Hercínico

10.- CLASIFICACION

METATOLITA METARIODACITA

META-TOLITA RIODACITICA A DACITICA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	BD	45	T		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Graveros carboníferos en proximidad de un
indicio minero (filón de la mina San Onofre) Alineación
magmática de Villavieja. La Coronada.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca detritica fina, fracturada, y con
relleno hidrotermal de las masas.

4- EDAD

CARBONIFERO INFERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C
VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOSAMITICA A GRANOLEPIDOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, PLAGIOCLASA, FELDSPATO - POTASICO, SERICITA, MOSCOV

ITA, CLORITA, OPACOS, CIRCON, APATITO

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento gravos cuarsos-fel-
espáticos, bastante gruesos, y con matiz de composición
sericitica.

Afectada por una deformación sinmetamórfica, que
origina la esquistosidad de folio patente en la muestra,
con blastesis de sericita - moscovita epidoblastica, sin-
metamática, y clonita algo mas tardia.

Abundantes fracturillas con relleno de cuarsos y/o fel-
espato potásico

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

A

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Hercinico

10- CLASIFICACION

METAGRAUVAICA FELDSPATICA

META - GRAUVAICA FELDSPATICA

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 5 3 6 N 6 B D 4 7 T 4 13 15 19 CO P. Higuera.

2.- DATOS DE CAMPO

2.- DATOS DE CAMPO Sucesión cuarcítica a techo de los musquitos con grandes porfiroblastos de moscovita. Dominio de Valencia de las Torres. Cero Menano. Grupo de Sierra Albanana

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO Roca cuarcítica, algo feldespática, con orientación muy patente.

4- EDAD

PRECAMBRIKO-ORDOVICICO

	-POSICION ESTRATIGRAFICA.....A		-BUENA.....B
PROCEDIMIENTO	-DATACION ABSOLUTA.....B	A	VALORACION-PROBABLE...P
	-DATACION PALEONTOLOGICA...C	44	-DUDOSA...D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOBLASTICA ELONGADA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA SERICITA MOSCOVITA CLORITA BIOTITA

OPACOS CIRCONESEFENA APATITO OXIDOS

208
OBSERVACIONES

Rosa cuarcítica de grano fino, procedente de un sedimento cuarcarenítico con escasas plagioclasa y matrix lútica.

Afectada por un proceso de deformación acompañado de metamorfismo regional, que suelda y produce elongación de los granos de cuarsa, y recristalización de moscovita epidoblástica de grano muy fino, y biotita monón mas tardía, y que aparece posteriormente cloritizada.

Posteriormente la roca está fracturada, y se produce entrada de oxidos a favor de estas fracturas.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO

B	
---	--

B - BAJO D - ALTO 266

8.- ZONA METAMORFICA

B I O T I T A

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambrian to Hercynian

10 - CLASIFICACION

CUARCITA

ANALISIS QUIMICO ☐ 363

MIGMATITA ☐ 364

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 5 3 6 N G B D 50 T 15 19 CO P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

Anfibolitas intercaladas en sucesión de neises y muscovitas con grandes porfiroblastos de moscovita. Dominio de Valencia de las Tones - Ceno Murano Grupo de Sierra Albanana.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Anfibolita con orientación muy potente.

4.- EDAD

PRECAMBRIICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - VALORACION - PROBABLE... P - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NEMATOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

HORNBLENDA PLAGIOCLASA FELDSPATO-POTASICO BIOTITA CLD

RITA MOSCOVITA SERICITA OPACOS ESFENA CIRCON OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca anfibólica, procedente del metamorfismo regional de roca ígnea básica de composición monso-diorítica o -gabúica.

El proceso metamórfico que afecta a la roca produce la estabilización de la paragénesis plagioclasa (composición indeterminada) - hornblenda monón-cristalina.

Remobilización de feldespato potásico a fracturas.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO C - DE SOTERRAMIENTO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

8.- ZONA METAMORFICA

HORNBLENDA MARRON-PLAGIOCLASA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambrio y Hercínico

10.- CLASIFICACION

ANFIBOLITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 536 N 6 B D 53 T 15 19 Co P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Rocas ácidas en Formación Malacínado. Dominio de Zafra-Alanis - Córdoba. Cúña de Villaviciosa.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca porfídica orientada. Venillas con cuaso.

4- EDAD

PRECAMBRIICO SUPERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A A - BUENA B B
- DATACION ABSOLUTA B VALORACION - PROBABLE P B
- DATACION PALEONTOLOGICA C 44 - DUDOSA D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOPORFIDICA, GRANOLEPIDOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

OLIGOCLASA CUARZO FELDSPATO-POTASICO SERICITA, MOSCOVI

TA BIOTITA OPACOS CIRCON APATITO OXIDOS CARBONATOS

OBSERVACIONES

Roca original volcanoclástica ácida, constituida por fenoclastos de plagioclasa de hasta 1 mm embebidos en una matriz fina, con cuaso, plagioclasa, feldespato potásico y minerales acuosos recristalizados. Se reconocen también litoclastos, mas escasos.

Afectada por al menos una fase de deformación, sin metamorfica, que origina una esquistosidad de fleije con blastesis de sericita-moscovita de grano muy fino, lepidoblástica, y biotita muy escasa. En relación con este proceso se producen segregaciones de cuaso que adquieren, al menos en parte, la deformación.

Sobre la plagioclasa se produce una incipiente carbonatación.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

B 266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambrio? Hercínico

10- CLASIFICACION

METATOLITA, METARIODACITA

META-TOLITA RIODACITICA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 5 7 9 13 15 19

1536 NGBD 54 T CO P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

Muestra de la Formación Maleocinado. Dominio de rafa-
- Alarcos - Córdoba. Cima de Villavieja.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Brecha magmática, con clastos de hasta
varios centímetros, indeformada apreciablemente.

4.- EDAD

PRECAMBRIICO SUPERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOSEFITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO OLIGOCLASA FELDSPATO-POTASICO SERICITA MOSCOVI

TA BIOTITA CLORITA OPACOS CIRCON SERICITA OXIDOS

OBSERVACIONES

Brecha volcánica ácida, constituida por grandes can-
tos de ~~porfido~~ porfidos de composición dacítica a ri-
odacítica embebidos en una mesostasis de composición
semejante, con mayor proporción de fenomagnesianos.

Se aprecia recristalización metamórfica de la
roca, que se traduce en blastesis de clonita-biotita
verdosa a partir de los fenomagnesianos de la ma-
triz embolante de los cantos.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D 262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

BA 266

8.- ZONA METAMORFICA

BIOTITA VERDOSA INCIPIENTE

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico Hercínico

10.- CLASIFICACION

METABRECHA TUFACEA METAVOLCANOCLASTITA-ACIDA
META-BRECHA VOLCANICA ACIDA

ANÁLISIS QUÍMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	BD	59	T		CO	P. Higuera.
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Tramo de esquistos en sucesión cuarcítica a techo de micarquistos con grandes porfiroblastos de moscovita. Inmedidaciones del contacto del granito del Alamo.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca moscovítica con orientación poco patente. Moscovita de grano muy fino desorientada.

4- EDAD

PRECAMBRIICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOBLASTICA DECUSADA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA FELDSPATO-POTASICO MOSCOVITA BIOTI

TA OPACOS CIRCON ESFENA TURMALINA SERICITA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca original lutitico-arenosa. La fracción arena constituye aproximadamente un 25% del total de la roca, y tiene cuarcos como principal componente, al que acompaña plagioclasa y escaso feldespato potásico. La fracción lutita aparece recristalizada.

Afectada por al menos un proceso de carácter térmico, que produce blastesis de moscovita y biotita manón-roja.

Este proceso es verosímil que se superponga a deformación y metamorfismo de carácter regional, y que estarían obliterados por el proceso térmico ulterior.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico y hercínico.

10- CLASIFICACION

CORNEANA FELDSPATICO

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NGBD		61	7		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Muestra de los neises de Azuaga. Dominio de Valencia de los Tones. Ceno Manano. Grupo de Córdoba. Fuenteobertura.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca cuarsa - feldespática muy orientada

4- EDAD

PROTEROZOICO MEDIO-SUP.

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - VALORACION - PROBABLE... P - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NEISICA, MILONITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, PLAGIOCLASA, FELDSPATO - POTASICO, MOSCOVITA, OPACO

S, ESFENA, CIRCON, SERICITA, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca constituida por cuarsa, feldespato potasico, y plagioclasa. de textura neisica, con grandes augen de feldspatos y de cuarsa (que presenta posibles formas de conosion y está parcialmente granulada), en una matriz - mesostasis de cuarsa granulada y moscovita lepidoblástica, originada en relación con un proceso de deformación dinámica acompañado de una cierta recristalización metamórfica.

Probablemente proceda de una roca de textura original porfidica, volcánica o subvolcánica.

Posteriormente la roca está hidrotermalizada: con silificación asociada a fracturas, y sericitización de plagioclasa.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

MOSCOVITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico, Hercínico.

10- CLASIFICACION

NEIS LEUCOCRATO MILONITICO

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA

EMP

REC

Nº MUESTRA

TA

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGBD 62 T

15

20

A Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

Según ácido deformado, que encaja en los neises leucocratos de Aruaga.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca silicea, de aspecto porfidico, deformada e indiotermalizada.

4.- EDAD

TARDIHERCINICO

21

43

PROCEDIMIENTO

-POSICION ESTRATIGRAFICA... A

-DATACION ABSOLUTA... B

-DATACION PALEONTOLOGICA... C

A

VALORACION-PROBABLE... P

-BUENA... B

-DUDOSA... D

P

45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

PORFIDICA ENMASCARADA POR ALTERACION Y DEFORMACION

46

99

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO SERICITA MOSCOVITA CLORITA BIOTITA OPACOS ESFEN

100

153

A CIRCON OXIDOS

154

207

208

261

OBSERVACIONES

Roca porfidica, constituida por fenocristales de cuarzo conoides y estallados, y posibles de plagioclasa y biotita, pseudomorfizados por sericita-moscovita y clorita-biotita verdosa respectivamente. Embala a estos fenocristales una matriz mpta. a microcristalina, silicea.

La deformación de la roca parece ser posterior o coetánea a la alteración, puesto que los posibles fenocristales de plagioclasa se deforman ya como agregados sericiticos.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO

B - DINAMICO

C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL

E - PLURIFACIAL

D

262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO

B - BAJO

C - MEDIO

D - ALTO

A ?

266

8.- ZONA METAMORFICA

BERRI

268

308

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Tardihercinico

10.- CLASIFICACION

META PORFIDO

PORFIDO ACIDO DEFORMADO Y ALTERADO

309

362

ANÁLISIS QUÍMICO

363

MIGMATITA

364

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NG BD 65 T 15 CO P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

Intercalación de cuarcitas feldespáticas en sucesión de neises y micarquistos con grandes porfiroblastos de moscovita. Dominio de V. de las Torres - C. Manana. Grupo de Sierra Albanana.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca cuarcítica bandada y brechificada.

4.- EDAD

PRECAMBRIICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - D
- DATACION ABSOLUTA... B - VALORACION-PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

MEDIO - PROTECTOGENICA SUPERIOR

TEXTURA

GRANOLITICA BLASTICA BRECHOIDE

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO FELDSPATO-POTASICO PLAGIOCLASA MOSCOVITA BIOTITA

TA OPACOS CIRCON TURMALINA ESFENA APATITO CLORITA SERI

CITA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca cuarcítica procedente de cuarcosarenita impura, con una cierta proporción de feldspatos y de matriz lútica.

Afectada por al menos un proceso de deformación sinmetamórfica, que origina una esquistosidad que viene definida por elongación de los granos de cuarzo y recristalización lepidoblástica de la componente lútica en biotita median. moscovita.

Hay blastos tardía de clorita, acompañada de destrucción de la biotita previa.

Fase tardía que produce una brechificación en fino, con oxidación asociada.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

8.- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambriico y Hercínico

10.- CLASIFICACION

CUARCITA FELDSPATICA

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NGBD		72	T		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

sucesión cuarcítica a techo de reises y micasquistos con grandes porfiroblastos de moscovita. Dominio de Valencina de las Torres - Caba Menara. Grupo de Sierra Albanara.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca cuarcítica, feldespática, sin orientación aparente.

4- EDAD

PRECAMBRIKO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A VALORACION - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C VALORACION - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRAMOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO FELDSPATO-POTASICO PLAGIOCLASA MOSCOVITA OPACO

S CIRCON ESFENA SERICITA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca detritica arenosa, constituida por cuarcos, feldespato potasico y plagioclasas, que en conjunto constituyen mas del 98% de la roca.

Afectada por metamorfismo que produce recristalización / cementación de los granos detriticos, y recristalización de la escasa roca componente lutitica en moscovita de grano muy fino. La roca no evidencia deformación sinmetamórfica.

Con posterioridad la roca ha sufrido una fracturación en relación con la cual se producen silicificación y oxidación.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D

7- GRADO DE METAMORFISMO

No precisable

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

PARAGENESIS poco INDICATIVA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambrieco-Hercinico

10- CLASIFICACION

META-ARCOSA METARCA

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGBD 78 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Superficie de cuarcitas feldespáticas a techo de neises y micasquistos con grandes porfiroblastos de moscovita. Dominio de ^{Valencia} de las Tonas; ^{C. Muriano} Grupo de S. Albarrana.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca cuarsa-filitica, feldespática, esquistosa.

4- EDAD

PRECAMBRIICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - VALORACION - PROBABLE... P - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PAAGIOCLASA FELDESPATO-POTASICO MOSCOVITA BIOTI

TA OPACOS CIRCON APATITO TURMALINA CLORITA SERICITA RU

TILLO 0x1005

OBSERVACIONES

Roca detritica en origen, con fracción arena predominante, cuarsa-feldespática, y fracción lutita del orden o inferior al 15%.

Afectada por al menos una fase de deformación, que origina recristalización / cementación / elongación de los granos detriticos, y blastesis lepidoblástica de moscovita y biotita marrón-rojiza, paragenesis que en este tipo de roca puede persistir en condiciones mas estuertas que las que usualmente indica.

La biotita esta posteriormente decolorada y cloritizada.

Fracturillas con relleno de feldespato potasico

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO C - DE SOTERRAMIENTO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA AL MENOS (PARAGENESIS POCO INDICADA)

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambriico / Hercinico

10- CLASIFICACION

PARANEIS, PARA-NEIS BIOTITICO

(Metaarcosa)

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1 5 7 9 13 15 19 P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Amfibolitas en sucesión cuarcítica a techo de neises y metarquistos con grandes porfiroblastos de moscovita. Dominio de ^{V. de las} Tonas - C. Humano. Grupo de Sierra Albarrana.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca anfibolítica de grano fino. orientada.

4- EDAD

PRECAMBRICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A -BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION-PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 -DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NEMATOBLASTICA; GRANOBLASTICA EN ESTA SECCION

COMPOSICION MINERALOGICA

HORNBLENDA PLAGIOCLASA CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, ESFE

NA OPAKOS APATITO SERICITA CARBONATO CLORITA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca anfibolitica procedente de roca basica de grano fino, constituida actualmente por relictos de plagioclasa pseudomorfizados por sericita, y hornblenda verde nematoblastica.

Esta paragenesis se habria producido en relacion con un proceso regional, que se habria producido en condiciones del orden del grado bajo-medio?

Se reconoce en la muestra un juego de superficies de fractura paralelas, que constituirian a grandes rasgos una esquistosidad espaciada. Se reconocen tambien fracturas practicamente normales, en las que se producen depositos de cuarzo, carbonatos y óxidos.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

BC?

8- ZONA METAMORFICA

PLAGIOCLASA-HORNBLENDA VERDE

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambrio-Ordoviciano

10- CLASIFICACION

ANFIBOLITA

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 536 NG 80 T

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

sucesión de micasquistos y neises con grandes porfiroblastos de moscovita. Dominio de Valencia de las Torres - Cera Munera. Grupo de Sierra Albarrana.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca neísea, cuarsa-feldespática, con granates y grandes placas de moscovita.

4- EDAD

PRECAMBRIICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

PORFIROBLASTICA, GRANOLEPIDOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA MOSCOVITA BIOTITA GRANATE SILLIMANITA

TA FIBROLITA OPACOS CIRCON ESFENA SERICITA CLORITA OXI

DOS TURMALINA

OBSERVACIONES

Roca cuarsa-feldespática de origen incierto, probablemente tobácea.

Afectada por dos eventos tectonometamórficos reconocibles:

- El primero se produce en condiciones de grado medio-alto, con neoformación de sillimanita-granate-biotita, paragénesis propia de estas condiciones a presiones elevadas. La sucesión de moscovita paragenética (la moscovita presente en las muestras, como grandes plastos desorientados, es más tardía) nos induce a pensar que estemos en grado alto. De sillimanita se reconocen punzinas, incluida en la moscovita tardía, y fibrolita.

La segunda deformación presenta caracteres dinámicos. Deforma los blastos de moscovita y granula en parte al cuarsa y a las micas. Se acompaña de posible blastesis de cuarsa, moscovita y biotita, de grano muy fino.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

D, B

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO

C - MEDIO
 D - ALTO

D, D

266

8- ZONA METAMORFICA

SILLIMANITA, BIOTITA? EN LA 2ª FASE

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambrio-Hercinico

10- CLASIFICACION

NEIS SILLIMANITICO

NEIS CON SILLIMANITA

309

362

ANÁLISIS QUIMICO

363

MIGMATITA

364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 5 7 9 13 15 19 P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Muestra de la Formación Halescinado. Dominio de Zafia-Alanis-Córdoba. Cúeno de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca cinerítica esquistosada.

4- EDAD

PRECAMBRIICO SUPERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A - BUENA B - VALORACION-PROBABLE P - DUDOSA D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

LEPIDOBLASTICA ESQUISTOSA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO SERICITA MOSCOVITA BIOTITA OPACOS GRAFITO CIRCO

OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento cinerítico, con abundante materia orgánica intergranular.

Afectada por una fase de deformación sinmetamórfica, ~~que crea una~~ con una cierta componente dinámica, que crea una esquistosidad de flujo con blastesis lepidoblástica de sericita-moscovita y escasa biotita. El cuarzo sufre una granulación parcial en relación con esta fase.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambrio?, Hercínico

10- CLASIFICACION

META-CINERITA METACINERITA

(Esquisto grafitoso)

ANALISIS QUIMICO

MIGMATITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	BD	87	T		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Tramo esquistoso en sucesión cuarcítica a techo de neises y micaesquistos con grandes porfiroblastos de moscovita. Dominio de ^{de} las Tonas. C. Murano. Grupo de Sierra Albanana.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO Roca cuarcítica esquistosada. Se reconocen una esquistosidad de flujo y otra de fractura, con oxidos.

4- EDAD

PRECAMBRIKO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO FELDSPATO-POTASICO PLAGIOCLASA MOSCOVITA BIOTI

100 153

TA OPACOS CIRCON ESFENA OXIDOS

154 207

TURNAL

208 261

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutitico-arenoso, con fracción arena grueso-feldespática.

En la muestra se reconocen los siguientes procesos dinámicos:

- Deformación sinmetamórfica, que crea una esquistosidad de flujo con blastesis lepidoblástica de moscovita y biotita sin a tardicinemáticas
- Una o dos fases que crean esquistosidad(es) de fractura, espaciadas, y que forman un ángulo bajo.
- Pliegues de tardío, suaves, de todo el conjunto.

oxidación ligada a la o las esquistosidades de fractura, y otras fracturillas menores

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

B 266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

268 308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambriko y Hercinico

10- CLASIFICACION

FELDSPATICO

CUARCITA ESQUISTOSA

309 362

ANÁLISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536 NGBD 94 T 15 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Calizas intercaladas en sucesión cuarcítica a techo de neises y micarquistos con grandes porfiroblastos de moscovita. Dominio de V. de las Tonas - C. Mariano. Grupo de S. Albanana.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca carbonatada bandeada, de grano grueso.

4- EDAD

PRECAMBRIICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA. A
- DATACION ABSOLUTA. B
- DATACION PALEONTOLOGICA. C

VALORACION - BUENA. B
- PROBABLE. P
- DUDOSA. D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CALCITA TREMOLITA TALCO CLORITA CUARZO OPACOS DOLOMITA

CIRCON OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento calcáreos impuros.
Afectada por al menos una fase de metamorfismo, que produce recrystalización de la calcita y blastesis de tremolita - talco.
La tremolita está posteriormente cloritizada.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

TREMOLITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambriico y Hercinico

10- CLASIFICACION

MARMOL TREMOLITICO

ANALISIS QUIMICO

MIGMATITA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1 5 7 9 13 15 19 P Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

Rocas básicas en Formación Malacónada. Dominio de Zofra-Alarín-Córdoba. Cuenca de Villavieja.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca básica aparentemente indeformada.

4.- EDAD

PRECAMBRIICO SUPERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

OLIGOCLASA-ANDESINA, CLORITA, SERICITA, MOSCOVITA, CALCITA
DOLOMITA, OPACOS, APATITO, RUTILO, SERICITA, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca básica probablemente de origen tobáceo, constituida por fenoclastos de plagioclasa de tamaño medio-fino, embalsados en productos aciliosos y que aparecen recrystalizados.

La mineralogía actual de la roca se explica por un proceso mixto de propilitización sinéctica, que introduce los carbonatos fundamentalmente, y recrystalización metamórfica, que origina la blastesis de la clorita y de la sericita-moscovita.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D 262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO

C - MEDIO
D - ALTO

A 266

8.- ZONA METAMORFICA

CLORITA

268

308

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico?, Hercínico

10.- CLASIFICACION METATOLITA CRISTALINA, METAANDESITA

META-TOLITA CRISTALINA ANDESITICA

309

362

ANÁLISIS QUÍMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 5 7 9 13 15 19

1536 NG 802000 T CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Roca metamorfitica fina en Formación Malesuada
dominio de Zafra-Alarcos-Córdoba. Cuenca de Villaviciosa.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca silicea fina esquistosa.

4- EDAD

RIFEENSE SUPERIOR - VENEDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A
- DATACION ABSOLUTA B
- DATACION PALEONTOLOGICA C

VALORACION - BUENA B
- PROBABLE P
- DUDOSA D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA ESQUISTOSA

46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO SERICITA MOSCOVITA CLORITA OPACOS CIRCON OXIDOS

100 153

154 207

208 261

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutitico-arenoso, probablemente cineritico.

Afectada por un proceso de deformación sinmetamorfica, que crea una esquistosidad de flujo con recristalización lepidoblastica de la componente lutitica de la roca en sericita-moscovita.

Se crean diferenciados de cuarsos con escasa clorita subparalelos a la esquistosidad.

Plegues menores tardios

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

A 266

8- ZONA METAMORFICA

SERICITA-MOSCOVITA

268 308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Preámbrico? Hercínico

10- CLASIFICACION

METACINERITA, ESQUISTO

META-CINERITA O ESQUISTO SERICITICO

309 362

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGBD 2001 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Volcanitas básicas e intermedias de la Formación Malcocinado. Dominio de Zafra-Alarcón - Córdoba. Cima de Villaviciosa.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca básica con evidencias de epidotización, sin deformación aparente.

4- EDAD

RIFEENSE SUP + VENDEIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - VALORACION - PROBABLE... P - DATACION ABSOLUTA... B - DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOPORFIDICA ??

COMPOSICION MINERALOGICA

ALBITA - OLIGOCLASA CUARZO EPIDOTA CLORITA FELDSPATO - PO

TASICO OPACOS VIDRIO

OBSERVACIONES

Roca básica porfídica, lávica de acuerdo con los datos de campo.

constituida en origen por fenocristales de plagioclasa de hasta 1 mm, en matriz al menos en parte vítrea.

Afectada por cambios mineralógicos que se traducen en epidotización, cloritización, y silicificación?, que cabe atribuir tanto a un metamorfismo regional como a una alteración propilitica generalizada, sinéctica.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO C - DE SOTERRAMIENTO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

D ?

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

AB

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA - EPIDOTA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico - Hercínico

10- CLASIFICACION

METANDESITA

META - ANDESITA PORFIDICA

ANALISIS QUIMICO

MIGMATITA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	BD	2002	T		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

2.- DATOS DE CAMPO Roca andesítica de la Formación Mollesurado. Dominio de
raza - planis - cordoba. Una de Villaviciosa.

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO *Roca básica morada, con orientación*

4.- EDAD

4.- EDAD R I F E E N S E S U P E R I O R V E N D I E N S E 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA . A
- DATACION ABSOLUTA . B
- DATACION PALEONTOLOGICA . C

VALORACION - BUENA . B
- PROBABLE . P
- DUDOSA . D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ENMASCARADA POR ALTERACION INTENSA "GRANOBLASTICA" 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

PLAGIOCLASA FELDSPATO-POTASICO EPIDOTA CLORITA CUARZO

CARBONATO ~~S~~ SERICITA

208
OBSERVACIONES

Roca afectada por importantes cambios mineralógicos, que dificultan el reconocimiento de los caracteres texturales originales.

Se reconocen posibles pseudomorfos de antiguos fenocristales de plagioclasa, totalmente sericitizados. En este caso, la roca se trataría de una lava porfídica de composición latítica, con matriz fina, posiblemente vitrea al menos en parte, afectada por metamorfismo regional y/o alteración propilitica sin genética.

El aspecto clástico de la muestra sugiere, por su parte, un origen tobáceo.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO

A	
---	--

B - BAJO D - ALTO 266

8.- ZONA METAMORFICA

CLORITA-EPIDOTA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS *Precámbrico, Hercínico.*

10.-CLASIFICACION

10.- CLASIFICACION METASTORBA, METALATITA

META-LAVA o TOBA MATITICA

309

Possible lava or tephra propylitized.

ANALISIS QUIMICO ☐

MIGMATITA ☐

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536NGBD20037 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO Roca tobáceas intermedia de la Formación Malocinado. Dominio de Zafra - Alamo - Córdoba. Cuna de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Esquistosidad bien patente.

4- EDAD

RIFEENSE SUPERIOR VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A - DATACION ABSOLUTA B - DATACION PALEONTOLOGICA C

VALORACION - BUENA B - PROBABLE P - DUDOSA D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA. PIROCLASTICA EN ORIGEN

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLASIOCLASA FELDESPATO - POTASICO SERICITA - MOSCOV

ITA BIOTITA EPIDOTA OPACOS OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca tobácea en origen, constituida por litoclastos finos, muy aplastados, y fenoclastos de cuarzo y feldespatos tamaño arena media a limo, embebidos en una matriz arcillosa procedente de desvitrificación de la original, volcánica.

Afectada por un proceso de deformación semimetamórfica, que origina una esquistosidad de fleije con blastesis de sericita-moscovita y biotita procedentes de la desvitrificación de la matriz.

Se reconoce una segunda fase con pliegues angulares en relación con los cuales hay reorientación de feldespato potásico y depósito de epidota.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO C - DE SOTERRAMIENTO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA INCIPIENTE

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico

10- CLASIFICACION

META-TOBA, METAVOLCANOCLASTITA-INTERMEDIA

META-TOBA DACITAZA-RIODACITICA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 5 3 6 N 5 B D 2 0 0 4 T

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CO 19

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Roca volcánica ácida de la Formación Malocunado.
 Dominio de Zafia-Alapig-Córdoba. Cuna de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca oscura de aspecto porfídico.

4- EDAD

RIFEENSE SUP. + VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOPORFIDICA

COMPOSICION MINERALOGICA

OLIGOCLASA-ANDESINA, CUARZO, SERICITA, MOSCOVITA, BIOTITA

CLORITA, OPACOS, CIRCON, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca tobaica ácida, constituida por fenoclastos de plagioclasa y cuarsos inferiores al milímetro, y clastos volcánicos de cuarsos, en una matriz de plagioclasa-productos aciliosos.

Afectada por una deformación semi-metamórfica, que crea una gruesa esquistosidad de flujo, con blastos de sericita-moscovita.

Los productos aciliosos de la matriz provienen, probablemente, de la desvitificación de la matriz volcánica original de la roca.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO

C - MEDIO
 D - ALTO

A 266

8- ZONA METAMORFICA

SERICITA-MOSCOVITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

METATOBA, METADACITA, META-TOBA DACITICA, A CUARZOANDESITICA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1536 NGBD 2005 T

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CO

CLASIFICACION EFECTUADA POR:
 P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

Roca tobácea de la Formación Malecinado. Dominio de Zofa.
 - Alamo - Córdoba. Cuna de Villavieja.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca piroclástica esquistosa.

4.- EDAD

RIFEENSE SUP^{ERIOR} VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTO-PIROCLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

ALBITA-OLIGOCLASA, CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, SERICITA

MOSCOVITA, PISTACITA, OPACOS, APATITO, ESFENA, CIRCON, OXIDO

S

OBSERVACIONES

Roca original tobácea, constituida por litoclastos volcánicos, bastante silíceos, de hasta 2.5-3 mm, y fenoclastos de hasta 1 mm de plagioclasa y cuarzo (esca-sos), embebidos en una matriz arcillosa con abundan-tes componentes opacos.

Afectada por una deformación sinmetamórfica que origina recristalización groseramente epidoblástica de sericita-moscovita a partir de la matriz lutítica de la roca, y blastesis de pistacita sobre plagioclasa fun-damentalmente.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

D

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO

C - MEDIO
 D - ALTO

A

8.- ZONA METAMORFICA

SERICITA-MOSCOVITA, EPIDOTA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10.- CLASIFICACION

METARPA CRISTALINA-LITICA, METAVOLCANOCLASTITA-ACIDA
 META-TOBA CRISTALINO-LITICA, ALIDA

309

362

Composición dacítica (ACITA)

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 5 3 6 N G B D 2 0 0 7 T

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

P. Higuera.

2- DATOS DE CAMPO

Conglomerado de la Formación Tofreñales. Dominio de Zofa-Alanis - Córdoba. Cuna de Villaviciosa.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca clástica, gruesa, con cantos de hasta 1 cm. Se aprecia una débil elongación de los cantos mayores.

4- EDAD

VENDIENSE-OVETIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A
 - DATACION ABSOLUTA B
 - DATACION PALEONTOLOGICA C

A

VALORACION - BUENA B
 - PROBABLE P
 - DUDOSA D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTO-SAMITICA A SEFITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO FELDSPATO-POTASICO PLAGIOCLASA FRAGMENTOS-DE-R

CLAS SERICITA MOSCOVITA BIOTITA OPACOS CIRCON APATITO

ARBONATOS OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca detritica muy gruesa, recristalizada.

Constituida por clastos que corresponden tanto a fragmentos de rocas, volcánicas y subvolcánicas en su totalidad, de hasta 1 cm de diámetro, y clastos monocristalinos de cuarzo y feldspatos, de tamaño arena media-gruesa.

Los fragmentos son bastante variados, textural y composicionalmente.

Afectada por un proceso de deformación sinmetamórfica, que origina recristalización groseramente lepidoblástica de sericita-moscovita de grano muy fino.

Carbonatación que se relaciona con el clasto mayor reconocible en la muestra.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO

C - MEDIO
 D - ALTO

A 266

8- ZONA METAMORFICA

SERICITA-MOSCOVITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Hercinico.

10- CLASIFICACION

METAMICROCONGLOMERADO

META-MICROCONGLOMERADO ARCOSICO

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	N6	B0	2040	7		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

Nivel carbonatado en Formación Pedroche. Dominio de Zafra. Alarcos - Córdoba. Cuenca de Villavieja.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca b carbonatada bandeada.

4.- EDAD

CAMBRICO INFERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA. A ☒ VALORACION - BUENA. B ☒
 - DATACION ABSOLUTA. B ☐ VALORACION - PROBABLE. P ☐
 - DATACION PALEONTOLOGICA. C ☐ VALORACION - DUDOSA. D ☐

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

DOLOMITA CUARZO FELDSPATO - POTASICO PLAGIOCLASA MOSCOV

ITA OPACOS CIRCON CLORITA TURMALINA

OBSERVACIONES

Roca dolomítica muy impura recristalizada.
 Aparte de la dolomita, constituyente principal de la roca, ésta contiene una notable proporción de cuarzo, feldspatos y mica, probablemente asociados junto a la dolomita.

Afectada por un metamorfismo que produce recristalización granoblástica de los componentes.

No se aprecia orientación tectónica de la roca que pueda estar relacionada con la recristalización metamórfica.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO
 D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO
 C - MEDIO
 D - ALTO

A

8.- ZONA METAMORFICA

Poco indicativa

RECRISTALIZACION DE DOLOMITA. MOSCOVITA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Hercinico

10.- CLASIFICACION

MARMOLO DOLOMITICO IMPURO

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA

EMP

REC

Nº MUESTRA

TA

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGBD2011 T

CO

P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

Nivel carbonatado en sucesión detritico-carbonatada
(Formación Pedroche). Dominio de Zafra-Alarcón. Córdoba. Cuenca
de Villavieja.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca carbonatada recrystalizada
y brechificada.

4.- EDAD

CAMBRICO INFERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... CVALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOBLASTICA. BRECHIFICACION.

COMPOSICION MINERALOGICA

DOLOMITA CUARZO FELDSPATO-POTASICO CALCITA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca dolomítica fuertemente recrystalizada, con algo
de cuarzo y escaso feldespato potásico.

Calita en fracturas. Su tinción es muy deficiente.
La recrystalización es de origen metamórfico, y no
se aprecia orientación ni elongación asociada alguna.
Fracturación posterior, bastante desarrollada.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO

B - DINAMICO

C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL

E - PLURIFACIAL

262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO

B - BAJO

C - MEDIO

D - ALTO

A

266

8.- ZONA METAMORFICA

Poco indicativa

268

308

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Hercinico.

10.- CLASIFICACION

MARMOLO DOLOMITICO

309

362

ANÁLISIS QUÍMICO

363

MIGMATITA

364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 536 NG BD 2012 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Muestra de la Formación Tonedarboles. Dominio de Esfuerzo - Alarcón - Córdoba. Cúica de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca detritica. arenosa, esquistada y microplegada.

4- EDAD

VENOISENSE-OVETIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A - BUENA B
- DATACION ABSOLUTA B VALORACION - PROBABLE P
- DATACION PALEONTOLOGICA C 44 - DUDOSA D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOSAMITICA A GRANOLEPIDOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA SERICITA MOSCOVITA CLORITA BIOTITA

OPACOS CIRCON TURMALINA OXIDOS FRAGMENTOS-DE-ROCA

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento arenoso. ~~pl~~ cuarsa. plagioclásico, con matas relativamente abundante.
Se reconocen algunos fragmentos líticos, volcánicos.
Afectada por deformación sinmetamórfica, que produce blastesis lepidoblástica de sericita-moscovita, clorita, y biotita sinmetamórficas.
Plegues tardíos suaves, reconocibles mejor en la muestra de mano.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - FLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

B 266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Hercinico.

10- CLASIFICACION

METAGRAUVACA FELDESPATICA

ANÁLISIS QUÍMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA

1536

EMP

NGBD

REC

2013

TA

T

PROFUNDIDAD

15

PROVINCIA

CO

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Volcanita de la Formación Malacónado. Dominio de Zafra-Alanis. Córdoba. Cima de Villaviciosa.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca de aspecto porfidico o tobáceo esquistoada y brechificada.

4- EDAD

RIFEENSE SUP. - UENOENSE

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A

B

- DATACION ABSOLUTA B

A

- DATACION PALEONTOLOGICA C

44

VALORACION - BUENA B

- PROBABLE P

- DUDOSA D

B

P

D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTO PORFIDICA

46

99

COMPOSICION MINERALOGICA

OLIGOCLASA CUARZO FELDSPATO-POTASICO SERICITA MOSCOVI

100

153

TA CLORITA Biotita OPACOS OXIDOS

154

207

208

261

OBSERVACIONES

Roca lávica o tobácea de composición dacítica, deformada y recrystalizada.

Constituida por feno-cristales o clastos de plagioclasa, de hasta 1 mm, y cuarzo, de menor tamaño, embebidos en una matriz de caracteres originales inconocibles. Se reconocen también posibles fragmentos de roca.

Afectada por deformación sinmetamorfica, que crea una esquistoidad de flujo con blastesis de sericita-moscovita y clorita-biotita verdosa sin a tándicinemáticas, de grano fino.

Fracturas irregulares con remobilización del cuarzo

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO

B - DINAMICO

C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL

E - PLURIFACIAL

D

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO

B - BAJO

C - MEDIO

D - ALTO

BA

266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA INCIPIENTE

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico ? Hercínico.

10- CLASIFICACION

METADBS, METAVOLCANOCLASTITA - INTERMEDIA, METADACITA

META-LAVA O TOBA DACITICA

309

362

ANÁLISIS QUÍMICO

363

MIGMATITA

364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NG 8 D 2014 T 15 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Muestra de rocas básicas de la Formación Malconado. Dominio de Zafra. Alarcón - Córdoba. Cuenca de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca porfídica básica, aparentemente indeformada. Fracturillas con relieve hiedotermal.

4- EDAD

RIFEENSE SUP^{epi} + VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A VALORACION - BUENA... B

- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P

- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 VALORACION - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOPORFIDICA

COMPOSICION MINERALOGICA

ANFIBOL PLAGIOCLASA FELDSPATO-POTASICO EPIDOTA CLORITA

ALPACOS APATITO ESFENA SERICITA-MOSCOVITA CUARZO

OBSERVACIONES

Roca básica porfídica, constituida por fenocristales de un anfíbol monoclinico ~~enclavo~~ (cumingtonita??, tremolita??) del orden del milímetro, en una matriz cuyos cambios mineralógicos ulteriores impiden reconocer sus mineralogía y textura originales.

Afectada por metamorfismo regional, que produce blastesis de epidota, clorita, y sericita-moscovita, que no acusar orientación preferente alguna.

Fracturas irregulares con curso.

Igual que en muestras precedentes, cabría implicar una alteración propilitica en los cambios mineralógicos producidos en esta roca.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL

C - DE SOTERRAMIENTO E - PLURIFACIAL 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO A

B - BAJO D - ALTO 266

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA-EPIDOTA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

METANDESITA

META-ANDESITA PORFIDICA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1 5 7 9 13 15 19 P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Metapelita fina, oscura (arenítica) en Formación Malesonado
dominio de Zafra - Alarcos - Córdoba. Cuenca de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca filitica gris oscura, con fracturación
con relleno de óxido

4- EDAD

RIFEENSE SUP + VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA GRAFITO SERICITA MOSCOVITA OXIDOS

IRCON

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico - arenoso muy
rico en materia orgánica. La fracción arena, muy
fina, es escasa, y algo feldespática.

Afectada por una deformación semi-metamórfica, que
produce una gruesa esquistosidad de flexo, con orienta-
ción de los granos y de la materia carbonosa/grafito,
y una ligera orientación lepidoblastica de sericita - mos-
covita.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL
C - DE SOTERRAMIENTO E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO A
B - BAJO D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

SERICITA - MOSCOVITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Preámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

FILITA GRAFITOSA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA		EMP	REC	Nº MUESTRA		TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1	536	NG	BD	20	16	T		CO	P. Higueiras.
1	5	7	9	13	15	19			

2.- DATOS DE CAMPO

2.- DATOS DE CAMPO Roca metapelítica (cineítica ?) en Formación Malcoi-
nada. Comuna de Zafra-Alanis - Córdoba. Cuna de Villavi-
cosa.

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO *Pituitaria lenticular - arenosa, con esquis-
tosidad de fractura perpendicular a So. Nucleos arenoso granoclas-
ificados.*

4.- EDAD

21 RIFEENSE SUPERVENDIENSE 43

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOSAMITICA CON NIVELES BLASTOPELICICOS

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, PLAGIOCLASA, SERICITA, MOSCOVITA, CLORITA, OPACOS
IRCON

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico-arenoso, de tipo intrínseco. Los muellos arenosos presentan micro neta y techo gradual, y son algo feldespáticos, y ^{presentan} una gruesa granoselección.

Afectada por una deformación semi metamorfa,
que origina blastesis groseramente orientada de semi-
moscovita y clorita algo mas tardia. Se reconoce
tambien una esquistosidad de fractura paralela o subpa-
ralela a la de flexo, con cuarcos remobilizados.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO A
B - BAJO D - ALTO 266

8.- ZONA METAMORFICA

CLORITA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Hercinico.

10.- CLASIFICACION

10.- CLASIFICACION FILITA, METAGRAUWACA

FILITAS Y METAGRAUVACAS

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA

EMP

REC

Nº MUESTRA

TA

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536

NGBD

2017

T

CO

P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

volcanitas ácidas de la Formación Molucanada. Co-
minio de Zafra-Alarcón-Córdoba. Cúña de Villaviciosa.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca verdosa, oscura, grano medio-
fino, sin deformación aparente.

4.- EDAD

RIFEENSE SUP. + VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A

- DATACION ABSOLUTA... B

- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B

- PROBABLE... P

- DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOPORFIDICA. VOLCANOCLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO OLIGOCLASA CLORITA-BIOTITA SERICITA-MOSCOVITA F

ELDESPATO-POTASICO OPACOS CIRCON APATITO OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca volcanoclastica acida, constituida por abundantes
fenoclastos de plagioclasa y cuarcos del orden de 500-800
micras, escasos litoclastos, volcanicos acidos, y escasos
granudos, embebidos en matrix micra a cryptocrista-
lina muy silicea.

Afectada por metamorfismo regional, que produce
recristalización en clorita de la componente feromagne-
siana de la roca, y blastesis de ~~clorita~~ sericita-mos-
covita de grano muy fino, sobre plagioclasa fundamen-
talmente.

oxidación asociada a superficies menores de fractura.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO

B - DINAMICO

C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL

E - PLURIFACIAL

D

262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO

B - BAJO

C - MEDIO

D - ALTO

A

266

8.- ZONA METAMORFICA

CLORITA

268

308

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico

10.- CLASIFICACION

METATOBA CRISTALINA-LITICA METADACITA

META-TOBA CRISTALINO-LITICA DACITICA

309

362

ANÁLISIS QUÍMICO

363

MIGMATITA

364

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1 5 7 9 13 15 19 P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

sucesión detritico carbonatada (f. ^{FORMACION} Pedraza). Dominio de Zafra-Alarín - Córdoba. Cuenca de Villaviciosa.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca detritica compacta sin deformación aparente alguna.

4.- EDAD

CAMBRICO INFERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOPELITICA CON NIVELES BLASTOSAMITICOS

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA FELDSPATO-POTASICO SERICITA-MOSCOV

ITA BIOTITA CLORITA OPACOS CIRCON TURMALINA APATITO OX

IDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutitico-arenoso, de facies arena cuarcosa-feldespática en proporción variable de unos niveles a otros.

La roca evidencia de reinstalación metamórfica de la componente lutitica, en sericita-moscovita, biotita, y clorita, gruesamente orientadas

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

B

8.- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Hercinica

10.- CLASIFICACION

FILITA ARENOSA

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 5 7 9 13 15 19 P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

Muestra pesada en Formación Torrealbala Dominio de Zafia-Alanis-Córdoba. Cima de Villavieja.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca lutítica - arenosa orientada, esquistada, con transposición de niveles arenosos.

4.- EDAD

VENDIENSE - OVIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A VALORACION - BUENA B
- DATACION ABSOLUTA B VALORACION - PROBABLE P
- DATACION PALEONTOLOGICA C 44 VALORACION - DUDOSA D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NIVELES BLASTOSAMITICOS Y BLASTOPELITICOS

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA SERICITA MOSCOVITA CLORITA OPACOS

IRCON TURMALINA ESFENA OXIDOS BIOTITA

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico - arenoso, laminada. La fracción arena es muy heterométrica, de tamaño medio a muy fino, y es algo feldespática.

Afectada por una deformación sinmetamórfica, que crea una esquistosidad de fleije ligeramente oblicua a 50°, con blastesis de sericita - moscovita y escasa clorita.

Se reconocen nodulillos de biotita, posiblemente detriticos, y en relación con fracturillas.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D 262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

A 266

8.- ZONA METAMORFICA

CLORITA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

10.- CLASIFICACION

FILITA ARENOSA

(Pizarra arenosa?)

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	BD	2021	7		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

Matenales carboníferos de la alineación magnética de Villavieja-La Coronada, afectados por metamorfismo de contacto

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca detritica arenosa fina, sin orientación apreciable.

4.- EDAD

CARBONIFERO INFERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A 76 - BUENA... B 45
- DATACION ABSOLUTA... B 44 VALORACION - PROBABLE... P 45
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOBLASTICA, DECUSSADA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO SERICITA-MOSCOVITA CLORITA BIOTITA FELDSPATO-P

OTASICO OPACOS ESFENA CIRCON OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutitico-arenoso, gruesamente laminado. Fracción arena cuarcítica, tamaño fino-muy fino.

Afectada por un proceso de metamorfismo de contacto, que produce blastesis granoblástica, decusada, de sericita-moscovita, clorita y biotita (posteriormente retrogradada y oxidada)

Abundantes venillas con cuarzo (cuarzo) y feldespato potásico.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

A 262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

B 266

8.- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Tardi a posthercinica

10.- CLASIFICACION

CORNEANA

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGBD 2022 T 15 19 C0 P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

Roca de silicatos cálcicos. Materiales carboníferos de la alineación magnética de Villavieja - La Coronada, afectados por metamorfismo de contacto.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca vendosa, fina, con gruesa orientación (laminaación?) posiblemente primaria.

4.- EDAD

CARBONIFERO INFERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - DATACION ABSOLUTA... B - VALORACION - PROBABLE... P - DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

EPIDOTA AMFIBOL CUARZO OPACOS OXIDOS

154 207

OBSERVACIONES

Roca constituida fundamentalmente por anfíbol verde-azul y epidota, con cuarcos minoritarios; originada por metamorfismo de contacto inducido por el granito de Peña Parda sobre rocas carbonatadas del Carbonífero de la alineación magnética.

Oxidación ulterior. Bastante importante

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

8.- ZONA METAMORFICA

EPIDOTA-AMFIBOL

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Tardi- a posthercínica. Postcarbonífero inferior

10.- CLASIFICACION

CORNEANA

Roca de silicatos cálcicos (Skarn)

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGBD 2023 T 15 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Conglomerado del Carbonífero. Aluvión magmático de Villavieja - La Coronada. Proximidad del granito de Peñas Pardas.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Conglomerado fino. de aspecto in-deformado.

4- EDAD

CARBONIFERO INFERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOSEFITICA MATRIZ BLASTOSAMITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, PLAGIOCLASA, FRAGMENTOS-DE-ROCA, SERICITA, MOSCOVITA, CLORITA, Biotita, OPACOS, CIRCON, ESFENA, TURMALINA, OXI

DOS

OBSERVACIONES

Roca conglomerática fina, constituida en su mayor parte por clastos de Formación de Azuaga: filitas, filitas arenosas, metagranulitas. También se reconocen clastos de cuarcitas, y de cuarcos volcánicos, con golfos de corrosión y muy desarrollados.

La matriz es arenosa, ferruginosa, y compuesta, a su vez, una matriz lutítica que aparece recubierta en sericita - moscovita de grano muy fino, en condiciones ^{propias} de la parte inferior del grado muy bajo.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

SERICITA-MOSCOVITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Tardío a posthercínico

10- CLASIFICACION

METACONGLOMERADO

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	N6	B	D2027	T		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Conglomerado de base del Carbonífero de la alineación magmática de Villavieja - de Coronado, próximo a zona de fractura.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Conglomerado brechificado. Cantos estructurados tipo Formación Azuaga.

4- EDAD

CARBONIFERO INFERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BRECHOIDE

COMPOSICION MINERALOGICA

FRAGMENTOS-DE-ROCA, CUARZO, PLAGIOCLASA, SERICITA, MOSCOVITA

OPACOS, CIRCON, APATITO, FELDSPATO-POTASICO

CARBONATOS

OBSERVACIONES

Roca conglomerática, constituida casi exclusivamente por cantos estructurados y metamorfoseados de Formación de Azuaga, y algún canto cuarcítico anguloso. Matriz prácticamente inexistente.

Afectada por brechificación intensa, que produce abundantes fracturas en relación con las cuales se produce depósito de óxido, feldespato potásico, y carbonatos.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

1

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

2

8- ZONA METAMORFICA

268

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

10- CLASIFICACION

METAMORFICA, BRECHICA
CONGLOMERADO BRECHIFICADO

309

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536 NGBD 2029 T 15 19 CO P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

Roca detritica gruesa de la Formación Malacón
Dominio de Zafra-Alarcón-Córdoba. Cuna de Villaviciosa.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca detritica gruesa, feldespática,
aparentemente indeformada.

4.- EDAD

RIFEENSE SUPERIOR - VENOLICENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A VALORACION - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOSAMITICA, GROSERA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, PLAGIOCLASA, FRAGMENTOS-DE-ROCAZ, BIOTITA, CLORITA

ANFIBOL, FELDESPATO-POTASICO, OPACOS, CIRCON, APATITO, SER

ICITA, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca arcósica con abundantes fragmentos volcánicos.
típica de la Formación Tenebróles.

Afectada por deformación y metamorfismo, que
produce una gruesa orientación de la roca, y
blastesis fundamentalmente granoblástica de clinto-
-biotita verdosa y anfíbol verde, probablemente
relacionada con metamorfismo térmico inducido por
la intrusión de gabbros en proximidad

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL
C - DE SOTERRAMIENTO E - PLURIFACIAL 262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO B
B - BAJO D - ALTO 266

8.- ZONA METAMORFICA

ANFIBOL

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10.- CLASIFICACION METAROSA

META-ARCOSA CON METAMORFISMO DE CONTACTO

ANÁLISIS QUÍMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA

EMP

REC

Nº MUESTRA

TA

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGBD 2030 T

CO

P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Rocas básicas de la Formación Malesonado. Dominio de Zafra-Alarcón - Córdoba. Cuenca de Villaviciosa.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca clara, fina, no deformada apreciablemente.

4- EDAD

RIFEENSE SUP + VENDIENSE

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A

- DATACION ABSOLUTA... B

- DATACION PALEONTOLOGICA... C

A

VALORACION - BUENA... B

- PROBABLE... P

- DUDOSA... D

44

B

45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOPORADICA

46

99

COMPOSICION MINERALOGICA

ALBITA - OLIGOCLASA CLORITA - BIOTITA OPACOS APATITO CUARZO

100

153

0 FELDSPATO - POTASICO

154

207

208

261

OBSERVACIONES

Roca porfídica, constituida por fenocristales de plagioclasa de hasta 1 mm en matriz de grano fino, groseramente orientada, y constituida por plagioclasa y clorita-biotita verdosa metamórfica.

Cuarzo-feldespato potásico - opacos (pinta) en relación con una fractura discontinua, en la que el cuarzo muestra una apreciable deformación.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO

B - DINAMICO

C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL

E - PLURIFACIAL

D

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO

B - BAJO

C - MEDIO

D - ALTO

BA?

266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA VERDOSA INCIPIENTE

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico

10- CLASIFICACION METAANDESITA

META-ANDESITA

309

362

ANÁLISIS QUÍMICO

363

MIGMATITA

364

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536N6BD2039 T 15 19 CO P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

Secuencia de micasquistos y cuarsosquistos. Dominio de Valencia de las Torres - Cova Muro. Grupo de Sierra Albarrana.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca de tipo micasquisto, con abundantes granates, esquistosada.

4.- EDAD

PRECAMBRIICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANO (LEPIDO) BLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO MOSCOVITA BIOTITA GRANATE PLAGIOCLASA OPACOS CL

CON ESFENA CLORITA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutitico-arenoso, grueso, algo feldespático.

Se ve en la muestra una deformación sinmetamórfica con blastos de moscovita, biotita y granate, que son en gran parte tardicinemáticos: la moscovita aparece en parte orientada, lepidoblástica, y en parte totalmente desorientada, aunque afectada por pulsaciones póstumas.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO C - DE SOTERRAMIENTO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

8.- ZONA METAMORFICA

GRANATE

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambrio? Hercínico?

10.- CLASIFICACION

MICASQUISTO CON GRANATE

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1536 NG BD 2035 T

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CO

CLASIFICACION EFECTUADA POR:
 P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

Amfibolitas en sucesión de muscovitos y cuar-
 zoquistos. Dominio de Valencia de las Torres. Ceno Manzano.
 Grupo de Sierra Albanana.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca oscura de aspecto indeforma-
 do, brevemente orientada.

4.- EDAD

PRECAMBRIKO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

PLAGIOCLASA HORNBLENDA CUARZO BIOTITA CLORITA EPIDOTA

SERICITA OPACOS CIRCON APATITO ESFENA

OBSERVACIONES

Roca ^{intermedia} básica granuda en origen, metamorfoseada, y
 con deformación muy poco patente.
 El proceso mas evidente es la recristalización me-
 tamórfica, que produce una primera paragénesis
 de plagioclasa - hornblenda - biotita?, posteriormente
 retrogradada a clorita - epidota - sericita?

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

D

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO

C - MEDIO
 D - ALTO

BA

8.- ZONA METAMORFICA

HORNBLENDA RETROGR. A CLORITA - EPIDOTA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precambrico? Hercínico?

10.- CLASIFICACION

ANFIBOLITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NG 602036 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Rocas básicas en Formación Malacín. Dominio de Zafra-Hanis - Córdoba. y Cuna de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca oscura, tipo volcánica, orientada.

4- EDAD

RIFEENSE SUP. - VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOPORFIDICA, ORIENTADA

COMPOSICION MINERALOGICA

OLIGOCLASA, FELDSPATO-POTASICO BIOTITA CLORITA CALCITA

OPACOS VIDRIO APATITO CUARZO

OBSERVACIONES

Roca producto del metamorfismo y deformación de una volcánica andesítica, porfídica, con matiz parcialmente vitrea, y fenocristales y matiz constituido fundamentalmente por plagioclasa sodica (mas caliza en origen).

Afectada por deformación semi-metamórfica, que produce blastesis epidoblastica de clorita, con biotita algo mas tardia, y decalcificación de la plagioclasa, que produce calcita, la cual se segrega a fracturillas irregulares que en conjunto definen una alineación oblicua a la esquistosidad de la roca.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

0 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

B 266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico, Hercínico.

10- CLASIFICACION

META-ANDESITA METAANDESITA

309

362

ANÁLISIS QUÍMICO

363

MIGMATITA

364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA

EMP

REC

Nº MUESTRA

TA

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536NG8D2042T

CO

P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Muestra de la Formación de Azuaga. Dominio de Sierra Albarrana.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca filítica, en parte arenosa, 50 muy transpuesta.

4- EDAD

PRECAMBRIICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A

- DATACION ABSOLUTA... B

- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B

- PROBABLE... P

- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO SERICITA MOSCOVITA BIOTITA CLORITA OPACOS CIRCO

NEFENA RUTICO OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico - arenoso, se reconocen dos zonas bien diferentes: una muy arenosa, bastante homogénea, y otra con predominio de lutita, con charrelas y fragmentos de flancos transpuestos. Entre ambas existe una segregación de cuarsos, reconocible de vista en la lámina.

Se reconoce en la muestra al menos una deformación sinmetamórfica, que origina ~~en~~ una esquistosidad de fleije, con especial desarrollo en los tramos pelíticos. Esta esquistosidad sería ligeramente oblicua a 50°, y por tanto, originaría las transposiciones reconocibles en la muestra. Blastesis de sericita-moscovita, biotita y clorita, de grano muy fino.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO

B - DINAMICO

C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL

E - PLURIFACIAL

D

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO

B - BAJO

C - MEDIO

D - ALTO

B

266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico y/ Hercínico.

10- CLASIFICACION

FILITA ARENOSA

FILITA CON NIVELES CUARCITICOS

309

362

ANALISIS QUIMICO

363

MIGMATITA

364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 536 NG BD 2043 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Muestra de la Formación de Azuaga. Dominio de Sierra Albarrana.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca laminada, moteada.
de la Formación de Azuaga. ¿Carbonífera??

4- EDAD

PRECAMBRIICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOBLASTICA MACULOSA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA CLORITA BIOTITA OPACOS TURMALINA CI

RECON ESTENA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento laminado fino a muy fino, de composición granobásico-feldespática, con inclusiones especialmente ricas en plagioclasa.

Afectado por metamorfismo de contacto, que produce recristalización granoblástica de la matriz en clorita biotita verdosa, y textura tipo maculosa, con concentración de éstas.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

A 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO

C - MEDIO
D - ALTO

AB 266

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA-BIOTITA VERDOSA INCIPIENTE

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

TARDI A POST HERCINICO

10- CLASIFICACION

METAGRAUVACA FELDSPATICA CORNEANA

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NGB	02049	T			CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Granito tipo El Alamo en proximidad de zona de fractura.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca granítica cosada de aspecto deformado. Encajante alugranito del Ucaer.

4- EDAD

TARD. HERCINICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

MILONITICA (CATACLASTICA)

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO OLIGOCLASA FELDSPATO - POTASICO SERICITA - MOSCOVI

TA OPACOS CIRCON APATITO OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca granítica de grano medio milonitisada.
granulación generalizada del cuarzo, y parcial de feldspato.
Fracturación y deformación cristalina de feldspatos.
Acumulos de sericita que parecen proceder de
granulación - recristalización de moscovita primaria.
oxidación importante, en parte asociada a fracturillas.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

B

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO

C - MEDIO
D - ALTO

A

8- ZONA METAMORFICA

SERICITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Tard. hercínico.

10- CLASIFICACION

GRANITO MILONITICO, BLASTOMILONITO, METAGRANITO

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGRG 314 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Lutita arenosa de la unidad detritico-carbonatada.
 Lutita arenosa perteneciente a la Unidad detritico-carbonatada del Carbonífero de la Cuenca del Guadiato.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca detritica, arenosa, laminada

4- EDAD

CARBONIFERO INFERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOSAMITICA, ESQUISTOSA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, PLAGIOCLASA, SERICITA, MOSCOVITA, OPACOS, TURMALINA

CIRCON, ESFENA

OBSERVACIONES

Roca detritica, lutitica - arenosa, algo feldespática, afectada por deformación y metamorfismo, que se traduce en la creación de una esquistosidad de flujo, marcada por orientación de opacos, y blastesis sin a tardicinemática de sercita - moscovita, de recristalización de la fracción lutitica de la roca. Fracturillas tardías, discontinuas, con relleno de cuarzo.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO

C - MEDIO
 D - ALTO

A 266

8- ZONA METAMORFICA

SERICITA-MOSCOVITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Hercinico (tardi-)

10- CLASIFICACION

METAGRAUVAICA FELDESPATICA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	5C	713	T		CO	
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

Material carbonífero en proximidad del contacto con pórfidos de Nava-Senano. Alinación magmática de Villavieja-La Coronada.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca vendosa de grano fino, con textura maculosa incipiente. Fracturas con relleno secundario.

4.- EDAD

CARBONIFERO INFERIOR

PROCEDIMIENTO: -POSICION ESTRATIGRAFICA... A ☒ -BUENA... B ☐
 -DATACION ABSOLUTA... B ☐ VALORACION-PROBABLE... P ☒
 -DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 -DUDOSA... D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOSAMITICA, GRANOBLASTICA-MACULOSA INCIPIENTE

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA SERICITA MOSCOVITA CLORITA BIOTITA
 FELDSPATO-POTASICO OPACOS CIRCON TURMACINA APATITO
 IDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico-arenoso fino, granuáquico, algo feldespático.

Afectada por metamorfismo de contacto, que origina una textura "maculosa", con manchas irregulares donde se desarrolla preferentemente biotita.

Fracturillas irregulares con relleno fundamentalmente de cuarsos.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO ☒
 B - DINAMICO ☐
 C - DE SOTERRAMIENTO ☐ D - REGIONAL ☐
 E - PLURIFACIAL ☐

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO ☐
 B - BAJO ☒ C - MEDIO ☐
 D - ALTO ☐

8.- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

TARDI A POST-HERCINICO

10.- CLASIFICACION

METAGRAUVA (CORNEANA)

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	SC	719	T		C6	
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

Material carbonífero parcialmente cubiertos por lavas de La Cienega. Aluvión magnético de Villavieja-La Coronada.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca lutítica fracturada y oxidada.

4.- EDAD

CARBONIFERO INFERIOR

PROCEDIMIENTO: -POSICION ESTRATIGRAFICA... A ☒ -BUENA... B ☐
 -DATACION ABSOLUTA... B ☐ VALORACION-PROBABLE... P ☒
 -DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 -DUDOSA... D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOISAMITICA Y BLASTOPELITICA BRECHIFICADA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO SERICITA MOSCOVITA CLORITA-BIOTITA OPACOS CIRCO

NOXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento laminado lutítico-arenoso con predominio de la fracción lutita.

La roca aparece recristalizada, con formación incipiente de texturas maculosas en los niveles lutíticos.

La roca aparece brechificada, con aporte de opacos, posteriormente oxidados.

Algunas fisuras rellenas por cuarzo y clorita.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

A ☒

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

AB ☒

8.- ZONA METAMORFICA

CLORITA-BIOTITA?

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

TARDI A POST HERCINICO

10.- CLASIFICACION

CORNEANA BRECHIFICADA Y OXIDADA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	SC	744	T		CO	
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Material carbonífero en proximidad de pizcos de Nava-Semano. Alineación magmática de Villaviciosa-la Coronada.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca de color verde claro, grano fino, oxidado en formas dendríticas, y epidota.

4- EDAD

CARBONIFERO INFERIOR

PROCEDIMIENTO: -POSICION ESTRATIGRAFICA... A ☒ -BUENA... B ☐
 -DATACION ABSOLUTA... B ☐ VALORACION-PROBABLE... P ☒
 -DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 -DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

EPIDOTA GRANATE ACTINOLITA-TREMOLITA CALCITA OPACOS ES

FENA APATITO OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente, probablemente, de sedimento carbonatado impuro, de tipo calizo-dolomíticos.

Afectado por metamorfismo de contacto, con neoformación de epidota-granate-anfibol, propios de facies de corneanas hornblenditas?

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO ☒
 B - DINAMICO ☐
 C - DE SOTERRAMIENTO ☐ D - REGIONAL ☐
 E - PLURIFACIAL ☐

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO ☐ C - MEDIO ☐
 B - BAJO ☒ D - ALTO ☐

8- ZONA METAMORFICA

GRANATE-EPIDOTA-AMFIBOL ACTINOLITICO

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

TARDI A POST HERCINICO

10- CLASIFICACION

ROCA DE SILICATOS CALCICOS

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 5 7 9 13 15 19

1536 NG SC 846 T CO

2- DATOS DE CAMPO

Muestra de la Formación de Azuaga. Dominio de Sierra Albarrana.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosada, y con fracturas con óxidos y/o cuarzo

4- EDAD

PRECAMBRIICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A VALORACION - BUENA B

- DATACION ABSOLUTA B VALORACION - PROBABLE P

- DATACION PALEONTOLOGICA C 44 VALORACION - DUDOSA D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA; ALTERNANTE EN ORIGEN

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA MOSCOVITA SERICITA CLORITA, BIOTITA

OPACOS CIRCON ESFENA OXIDOS TURMALINA

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento laminado lutítico-arenoso, tipo ritmita. Fracción arena constituida casi exclusivamente por cuarzo, tamaño arena muy fina a fina.

Afectado por una deformación semi-metamórfica que origina una esquistosidad de folio con blastos de sericita-moscovita y clorita-biotita verdosa de grano muy fino.

Fracturación ulterior, con entrada de cuarzo, ~~óxidos~~ clorita, y óxidos. En conjunto, con fracturas y fracturillas subparalelas.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO D - REGIONAL

B - DINAMICO E - PLURIFACIAL

C - DE SOTERRAMIENTO

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO

B - BAJO D - ALTO

266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA INCIPIENTE

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico y/o hercínico.

10- CLASIFICACION

FILITAS y METAGRAUWICAS ALTERNANTES

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGSC 849 T 15 19 CO

2- DATOS DE CAMPO

Rocas carboníferas, detriticas, en proximidad de granito de tipo Peñas Pardas. Alineación magmática de Villavieja - La Coronada.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca bandeada (laminación pumaria) sin evidencias claras de metamorfismo de contacto

4- EDAD

CARBONIFERO INFERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B - VALORACION - PROBABLE... P - VALORACION - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ALTERNANCIA DE NIVELES BLASTOSAMITICOS Y BLASTOPELITICOS

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA SERICITA MOSCOVITA CLORITA BIOTITA

ANDALUCITA; OPACOS CIRCON ESPENA TURMALINA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutitico-arenoso, laminado, con fracción arena tamaño fino, algo feldspática. Separación en niveles poco neta.

Afectado por metamorfismo de contacto, que produce blastesis granoblástica, densada, de sericitita-moscovita, biotita, y clorita, y andalucita (escasa y dispersa formada preferentemente en algunos niveles lutíticos)

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO D - REGIONAL A
B - DINAMICO E - PLURIFACIAL 262
C - DE SOTERRAMIENTO

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO B
B - BAJO D - ALTO 266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA-ANDALUCITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

TARDI A POST- HERCINICO

10- CLASIFICACION

CORNEANA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536NGSC 910 T 15 19 40

2- DATOS DE CAMPO

Tramos delimitados - pizanosos en el Complejo Volcánico de Erillas - El Paredón. Aluvión magnética de Villaviciosa - La Coronada.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Laminación bien patente. Evidencias de metamorfismo de contacto (notado en algunos niveles)

4- EDAD

CARBONIFERO INFERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A VALORACION - BUENA... B

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ALTERNANCIA DE NIV. BLASTO - SAMITICOS Y - PELITICOS

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, SERICITA, MOSCOVITA, BIOTITA, CLORITA, KAGIOKLASA

FELDSPATO - POTASICO, OPACOS, CIRCON, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico - arenoso, fel. despatético, laminado, fino.

Afectado por metamorfismo de contacto, que origina recristalización / neoformación de sericita - moscovita y clorita - biotita verdosa granoblástica.

Pequeñas fisuras con óxido

Pequeños microfleques que afectan solo en parte a los niveles lutíticos y gravagueros.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO D - REGIONAL A

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO B

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA (INICIO)

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

TARDI A POST HERCINICO

10- CLASIFICACION

FILITA, METAGRAUWACA

ALTERNANCIA DE PIZARRAS / FILITAS Y METAGRAUWACAS

(Corneana)

ANALISIS QUIMICO

MIGMATITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1536 NG SK 912 T

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CO

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

2- DATOS DE CAMPO

Formación Malacónado al NE del Eje Magmático.
 Dominio de Zafra-Alarcos - Córdoba. Cuenca de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa. porfídica en origen.

4- EDAD

RIFEENSE SUP. - VENDEIENSE E

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOPORFIDICA. LEPIDOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

PLAGIOCLASA CLORITA OPACOS ESFENA CUARZO FELDSPATO-PO

TASICO SERICITA CARBONATOS, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca original tobácea, deformada y metamorfizada.
 constituida fundamentalmente por plagioclasa y
 fragmentos cuarcíticos (muchos mas escasos), emba-
 lados en matriz de clorita de origen metamórfico.

Afectada por una deformación sinmetamórfica,
 con blastos lepidoblásticos de clorita que
 define una esquistosidad de flexo.

Esta esquistosidad está posteriormente microplegada,
 cremlada, con desarrollo incipiente de una es-
 quistosidad espaciada.

Opacos diseminados, oxidados, bastante abundantes.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

D

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO

C - MEDIO
 D - ALTO

A

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

METATOLITA, METAANDESITO

META-TOLITA ANDESITICA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	SC	918	T		CO	
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Tramo detritico grueso en Formación Malacón. Dominio de Zafra-Alarcos - Córdoba. Cuna de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca detritica con orientación poco patente

4- EDAD

RIFEENSE SUP^{ER} - VENECIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A VALORACION - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 VALORACION - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOSAMITICA. ESQUISTOSIDAD IRREGULAR

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, PLAGIOCLASA, SERICITA, MOSCOVITA, CLORITA, BIOTITA

FRAGMENTOS DE ROCAS, CIRCON, OPACOS, TURMALINA, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca detritica gruesa, constituida por una fracción arena tamaño medio-gruesa, muy feldespática, embebida en una matriz lutítica que supera el 15% del total de la roca. Se reconocen algunos fragmentos volcánicos finos.

Afectada por deformación y metamorfismo, que produce una esquistosidad irregular, y blastos de sericita-moscovita y clorita-biotita??.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

AB?

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA-BIOTITA??

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrica? Hercínico.

10- CLASIFICACION

METAGRAUVACA FELDSPÁTICA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	SC	960	T		CO	
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Tramo arcóseo en Formación Malacunado. O. de Zafra - Alarcos - Córdoba. Cuna de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca detritica gruesa. Se reconoce. Sin orientación tectónica apreciable.

4- EDAD

RIFEENSE SUP. - VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOSAMITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

FELDSPATO - POTASICO, CUARZO, PLAGIOCLASA, SERICITA, MOSCOVITA, CLORITA, BIOTITA, FRAGMENTOS DE ROCA, OPACOS, CIRCON, ESFENA, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca detritica, arenosa, tamaño medio, muy feldspática, poco redondeada, bastante heterométrica, y con fragmentos de roca, fundamentalmente de origen volcánico. Igualmente el cuarzo evidencia texturalmente un origen similar.

Deformación y metamorfismo, que origina una muy gruesa esquistosidad, y blastesis de sericita - moscovita y clorita - biotita verdosa incipiente.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

AB

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA - BIOTITA?

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

METAAARCOSA

ANALISIS QUIMICO

MIGMATITA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 5 7 9 13 15 19

1536 NGSC 962 T CO

2.- DATOS DE CAMPO

Muestra de materiales carboníferos, de la alineación magmática de Villavieja - La Coronada.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca con un ligero moteado, verdosa, de grano fino.

4.- EDAD

CARBONIFERO INFERIOR

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - DATACION ABSOLUTA... B - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B - PROBABLE... P - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOSAMITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, PLAGIOCLASA, SERICITA, CLORITA, OPACOS, CIRCON, APA

TITO, ESFENA, FELDSPATO-POTASICO, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca clástica arenosa, fina, cuarítica con una cierta proporción de plagioclasa, con escasa matriz sericitica desigualmente repartida.

La matriz aparece ligeramente recristalizada, y los granos detriticos cementados, lo cual es indicativo de un cierto metamorfismo de contacto.

Feldspato potásico epigenético, correspondiente a un aporte tardío.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO C - DE SOTERRAMIENTO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

A 262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

A 266

8.- ZONA METAMORFICA

SERICITA CLORITA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

TARDI - A POST - HERCINICO

10.- CLASIFICACION

METACUARZOARENITA

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NG 5C 981 T 15 19

2- DATOS DE CAMPO

Muestra de la Formación Halcónado. Dominio de Zafra-Alanis - Córdoba. Cúca de Villaviciosa.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca verdosa porfídica sin orientación apreciable.

4- EDAD

RIFEENSE SUP. - VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A - BUENA B - VALORACION-PROBABLE P - DUDOSA D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTO. PORFIDICA

COMPOSICION MINERALOGICA

OLIGOCLASA CLORITA EPIDOTA OPACOS APATITO CALCITA CLOS

ITA EPIDOTA FELDSPATO-POTASICO OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca básica porfídica, constituida por fenocristales de plagioclasa en matrices vitrea, que ha recrystalizado, con neoformación de clorita-calcita-epidota-óxidos, indicativos de un metamorfismo de grado muy bajo, confirmado por el contexto en que aparece la muestra.

Fracturas irregulares con relleno por clorita o calcita, o epidota, o feldespato potásico.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO C - DE SOTERRAMIENTO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA-EPIDOTA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

META-ANDESITA METAANDESITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	N6	5C	983	T		CO	
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Muestra de la Formación Malacónado Dominio de Zafra-Alarcos - Córdoba. Cima de Villaviciosa.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa porfírica, de color verde. Suave microplegado de la esquistosidad.

4- EDAD

R. FEENSE SUP. - VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTO-PORFIDICA; DEFORMACION DINAMICA

COMPOSICION MINERALOGICA

PLAGIOCLASA CUARZO CLORITA OPACOS CALCITA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca porfírica en origen, de composición intermedia, constituida por fenocristales plagioclásicos que forma fenocristales y matrix. cuarzo escaso (matrix) y clorita epidoblástica, producto de recristalización metamórfica de los ferromagnesianos originales de la roca, inconfundibles. También la calcita sería de origen metamórfico, procedería de decarbonatación de la plagioclásica. Esta deformación presentaría una notable componente dinámica.

Microplegues tardíos de la esquistosidad

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

DB

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

A

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA-CALCITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrica, ? Hercínico.

10- CLASIFICACION

META-ANDESITA METAANDESITO

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	SC	1011	T			P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

Muestra de la Formación Malcocinado. Dominio de Zafra-Alarcos-Córdoba. Cuenca de Villavieja.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa de colores verdosos y morados, de aspecto tobáceo.

4.- EDAD

RIFEENSE SUPERIOR
VERDIEENSE

PROCEDIMIENTO: -POSICION ESTRATIGRAFICA... A -BUENA... B
-DATACION ABSOLUTA... B VALORACION-PROBABLE... P
-DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 -DUDOSA... D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUISTOSA; PORFIROCLASTICA EN ORIGEN

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, PLAGIOCLASA, EPIDOTA, ANFIBOL-FIBROSO, CLORITA, OPA

COS, APATITO, OXIDOS, SERICITA

OBSERVACIONES

Roca original de carácter tobáceo, ácida, con fenoclastos de cuarzo y plagioclasa en matriz muy fina con desortificación y recristalización metamórfica, que puede ser caracterizada por la asociación cuarzo-sericita-epidota-anfibol (actinolita-tremolita).

Esta recristalización es sin a tardicinemática respecto a una fase de deformación que originó una esquistosidad de fleije, materializada por elongación de cuarzo, orientación de sericita y anfibol, y bandeo litológico.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D 262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

B 266

8.- ZONA METAMORFICA

EPIDOTA-ANFIBOL

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10.- CLASIFICACION

METATOLITA-ACIDA

ANÁLISIS QUÍMICO 363

MIGMATITA 364

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536NGSC1014 T 15 19 CO

2.- DATOS DE CAMPO

Muestra de la Formación Malcozinado. Dominio de Zafra-Almaraz-Córdoba. Cuenca de Villavieja.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca pelítica verdosa brechificada.

4.- EDAD

RIFEENSE SUP. - VEDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BRECHOIDE, BASTO? - PELITICA Y SEMITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, SERICITA, MOSCOV

ITA, OPACOS, CIRCON, OXIDOS, BARITA

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico con niveles grauwáquicos, algo feldespáticos, de grano fino a muy fino.

Deformación y metamorfismo incipientes (grado muy bajo - anquimetamorfismo), con recristalización epidoblástica de sericita.

Brechificación importante, con relleno de fracturas por cuarzo, feldespato potásico, óxidos y barita.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D 262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

A 266

8.- ZONA METAMORFICA

SERICITA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

TARDI-HERCINICO

10.- CLASIFICACION PRARRA-METAGRAUWACA

PIZARRA CON NIVELES GRAUWAQUICOS BRECHIF. CADA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	SC	1092	T		Co	
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

Muestra de la Formación de Azuaga. Dominio de Sierra Albanana, al SW de la alineación magmática.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca bandada, con muscels cuarcíticos y esquistosos.

4.- EDAD

PRECAMBRICO-ORDOVICICO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA. A ☒ -BUENA.....B ☐
-DATACION ABSOLUTA.....B ☒ VALORACION-PROBABLE.....P ☐
-DATACION PALEONTOLOGICA. C 44 -DUDOSA.....D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOBLASTICA ELONGADA, ESQUISTOSA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, PLAGIOCLASA, BIOTITA, CLORITA, OPACOS, ESFENA, APATITO

ITO, CIRCON, SERICITA, EPIDOTA

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento laminado arenoso-lutítico, con muscels muy ricos en feldespatos, y contenida variable de matriz lutítica; los accesorios se concentran preferentemente en algunos muscels en que llegan a ser frecuentes.

Deformación y metamorfismo que origina un bandado tectónico, con orientación de biotita de neoformación metamórfica, y elongación de cuarcos y feldespatos.

Las plagioclasas aparecen en parte remobilizadas a venillas.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

☒ D ☐ E

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

☒ B ☐ C ☐ D

8.- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico y/o Hercínicos.

10.- CLASIFICACION

CUARCITA FELDSPÁTICA, CON BIOTITA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	5C	1300	T		CO	
1	5	7	9	13	15	18	

2.- DATOS DE CAMPO

2.- DATOS DE CAMPO Formación Malecoevado. Trama detritico grueso.
Dominio de Zafra. Alvaris - Córdoba. Cuenca de Villavieja

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO Roca maso-feldespática, esquistosa, con abundantes diferenciados de maso.

4.- EDAD

4- EDAD RIFEENSE SUP- VENDIENSE 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A A - BUENA B A
- DATACION ABSOLUTA B VALORACION - PROBABLE P P
- DATACION PALEONTOLOGICA C 44 - DUDOSA D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOSAMITICA, SEGREGACIONES GRANOBLASTICAS DE CUARZO

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, PLAGIOCLASA, SERICITA MOSCOV

100 153

154	TA	BIOTITA	OPACOS	CIRCON	FRAGMENTOS-DE-ROCHA	CAILLOS	207
-----	----	---------	--------	--------	---------------------	---------	-----

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento arenoso grueso (grano medio), cuarsos, feldespáticos, con abundantes fragmentos de roca (en parte volcánicos), y con moscovita detritica como componentes de la fracción arena, y con matiz lutitica que supera el 15% del total de la roca.

Deformación y metamorfismo que se materializa en una esquistosidad de flujo con blastosis orientada de senilita, y segregación de cuarcas paralela a la esquistosidad.

Otra fase de microplegado que afecta a las segregaciones.
Biotita verdosa en agregados, asociada a fracturas.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D- REGIONAL
E- PLURIFACIAL

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO A
B - BAJO D - ALTO

8.- ZONA METAMORFICA

S E R I C I T A

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10.- CLASIFICACION

METAGRAUVA CA ARCOSICA

309

ANALISIS QUIMICO ☐ 363

MIGMATITA ☐

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	N	S	1487	T		CO	
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Niveles psamíticos en Formación Molecinado. Dominio de Zafra-Alamo-Córdoba. Cuna de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca psamítica de color marón, laminada. Se reconocen S₀ y S₁.

4- EDAD

RIFEENSE SUP^{erior} - VENDIENSE

PROCEDIMIENTO: -POSICION ESTRATIGRAFICA... A ☒ -BUENA... B ☐
 -DATACION ABSOLUTA... B ☐ VALORACION-PROBABLE... P ☐
 -DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 -DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUISTOSA. ALTERNANCIA DE NIVELES BLASTO-PELITICOS > SAMITICOS 99

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO BIOTITA CLORITA SERICITA MOSCOVITA PLAGIOCLASA
 OPACOS CIRCON ESFENA TURMALINA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento laminado, con niveles lutíticos y arenoso-grauváquicos, algunos de los que muestran gonoselección.

Afectado por una fase de deformación sinmetamórfica, que origina una esquistosidad muy oblicua a S₀, más espaciada en los niveles areníticos, que viene definida por blastesis de sericita-moscovita y clorita-biotita biindoblásticas. Se reconoce una blastesis postuma de moscovita de mayor cristalinidad tardía a postmetamórfica, desorientada.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO
 D - REGIONAL ☒
 E - PLURIFACIAL 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO
 C - MEDIO
 D - ALTO ☒ AB? 266

8- ZONA METAMORFICA

INICIO DE BIOTITA 268 308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

PIZARRA CON NIVELES META-ARENITICOS 309 362

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536NGSC1495 T 15 19 CO

2- DATOS DE CAMPO

Rocas ácidas de la Formación Malocinado.
Dominio de Zafra Hérniz - Córdoba. Cima de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca volcanoclástica esquistosa.

4- EDAD

RIFEENSE SUP + VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUISTOSA, PORFIROCLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, SERICITA, MOSCOVITA, CLORITA, ALBITA, FELDSPATO - PO

TASICO, OPACOS, ESFENA, CIRCON, FRAGMENTOS - DE - ROCA, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca original tobiaca ácida, con fenoclastos de cuarzo plagioclasa, y feldespato potásico, y ~~litoclastos~~ litoclastos correspondientes a granito de grano fino, y rocas volcánicas ácidas desvitificadas, fundamentalmente.

Deformación y metamorfismo, con blastesis sincinemática de sericita - moscovita epidoblástica.

Clorita, cuarzo, feldespato potásico y opacos (oxidados) en relación con fracturas.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

SERICITA - MOSCOVITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico ? Hercínico.

10- CLASIFICACION

METATOBA - ACIDA

ANALISIS QUIMICO

MIGMATITA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	5	C1497	T		C0	
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO Niveles detriticos gruesos (arcillosos) en Formación Italcacinado. ^{Tongarembos} Dominio de Baños - Alanís - Córdoba. Cerro de Villavieja.

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO Roca detritico maso-feldespático,
esquistosa.

4-EDAD RIFEENSE SUP- VENDIENSE 21 43

PROCEDIMIENTO-DATACION ABSOLUTA: B A VALORACION-PROBABLE: P

-POSICION ESTRATIGRAFICA: A -BUENA: B

-DATACION PALEONTOLOGICA: C 44 -DUDOSA: D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOSAMITICA. ESQUISTOSA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, PLAGIOCLASA, FRAGMENTOS-DE-ROCAS, SERICITA, MOSCOV

100 153

ITA OPACOS CIRCON ESFENA CLORITA, BIOTITA OXIDOS TURMAL

114

208 26

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento arenoso grueso, rico en materia silicea.

Fracción arena constituida por cuarzo (con formas volcánicas frecuentes), plagioclasa, ^{moscovita detritica} V, y fragmentos de rocas ígneas ácidas, fundamentalmente volcánicas. La materia sericitica supera el 15% del total de la roca. Una fase de deformación sinerquistosa y semi-tamórfica, de grado muy bajo.

Fracturillas con cuarzo y clorita-biotita

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO A
B - BAJO D - ALTO 266

8.- ZONA METAMORFICA

S E R I C I T A - M O S C O V I T A

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS HERCINICO Precámbrico?

10.- CLASIFICACION METABOLITICA, VOLCANOCLASTITA

MEFA - GRAVACA ARCO SICA VOLCANOCLASTICA

309

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	N6	5C	1498	T		CO	
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Tramos detriticos gruesos en (arcosicos) en Formación Malacónado. Dominio de Zafra Alarín - Córdoba. Cuna de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Pa

Roca cuarsa-feldespática esquistosa.

4- EDAD

RIFEENSE SUP-^{ERIOR} VENDEENSE
 PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

 VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOSANITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, PLAGIOCLASA, FELDESPATO-POTASICO, SERICITA, MOSCOV

ITA, FRAGMENTOS-DE-ROCA, OPACOS, ESFENA, CIRCON, TURMALINA

OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento arenoso grueso, cuarsa-feldespática, con frecuentes fragmentos de rocas, de origen volcánico en su mayor parte, y con matiz sericitica que no llega a constituir el 15% del total de la roca. Clastos muy angulosos, con formas propias de corrosión volcánica en algunos casos.

Deformación semi-metamórfica que produce blastesis lepidoblastica de sericita-moscovita, que define una esquistosidad de flujo.

Microplegado suave ulterior

6- TIPOS DE METAMORFISMO

 A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO
 D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

D

7- GRADO DE METAMORFISMO

 A - MUY BAJO
 B - BAJO
 C - MEDIO
 D - ALTO

A

8- ZONA METAMORFICA

SERICITA-MOSCOVITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrica, Hercínica.

10- CLASIFICACION

METAARCOSA

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 536 NG 5 C 1500 7 15 19

2.- DATOS DE CAMPO

Rocas ácidas en Formación Malacónado. Dominio de Zafra-Alarcos - Córdoba. Cúca de Villaviciosa.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa tobacea, con porfiroclastos de hasta 4 mm.

4.- EDAD

RIFEENSE SUP - VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUISTOSA PORFIROCLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, ALBITA-OLIGOCLASA, SERICITA, MOSCOVITA, CLORITA, OP

ACOS, CIRCON, APATITO, CALCITA, OXIDOS, EPIDOTA, FRAGMENTOS-

DE-ROCAS

OBSERVACIONES

Roca volcanoclástica ácida, constituida por fenoclastos de plagioclasa y cuarzo, y litoclastos correspondientes a:

- Rocas microcristalinas con cuarzo, plagioclasa, y opacos abundantes.
- Vidrios volcánicos ácidos desvitrificados.
- Granitoides
- Rocas volcánicas o subvolcánicas porfídicas, ácidas.

La matriz sería vítrea a microcristalina en origen evidenciando desvitrificación.

Una fase de deformación sin metamórfica y sin esquistosa, con blastos de sericita-moscovita y clorita; Fractura irregular con relleno de calcita, clorita, y cuarzo.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D 262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

A 266

8.- ZONA METAMORFICA

SERICITA-MOSCOVITA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrica? Hercínico.

10.- CLASIFICACION

METATOLITA-ACIDA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 536 NG SC 1504 T 15 19

2- DATOS DE CAMPO

Conglomerados en Formación Malocinado. Dominio de Zafra-Alamús-Córdoba. Gu. Cuña de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa, sericitica, con lastos de hasta 1 cm. ^{EXIDE}

4- EDAD

RIFEENSE SUP + VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUISTOSA, BLASTOSEFITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, PLAGIOCLASA, FELDSPATO-POTASICO, MOSCOVITA, SERICITA, BIOTITA, CLORITA, OPACOS, ESFENA, CIRCON, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca detritica en origen, con aportes de diversa naturaleza pero con abundancia de material volcanoclastico. Lastos monocristalinos de cuarzo, plagioclasa, feldspato potasico y biotita.

Fragmentos correspondientes a agregados granoblasticos de cuarzo, rocas ígneas micogranudas o desvitrificadas, y rocas psamitas sericiticas o cuarzo-sericiticas.

Una fase de deformación sinmetamorfica, y sinesquistosa, con blastesis de moscovita-sercita y biotita-dolomita. Los porfiroblastos de biotita aparecen sustituidos por agregados granoblasticos de biotita verdosa.

Una fase posterior con microfleques.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

B 266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrica? Hercínico.

10- CLASIFICACION

METACONGLOMERADO TUFACEO, META-CONGLOMERADO VOLCANOCLASTICO

309

362

Posible toba muy grosera.

ANÁLISIS QUÍMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 N65C1506 T 15 19

2- DATOS DE CAMPO

Secuencia de esquistos y cuarcosquistos con cuarcitas negras. Dominio de Valencia de las Torres. Cerro Mampino. Grupo de Córdoba-Fuenteobertura.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa moscovítica microplegada con pequeños porfiroblastos de granate

4- EDAD

RIFEENSE MEDIO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA. PORFIROBLASTICA. MICROPLEGADA

COMPOSICION MINERALOGICA

MOSCOVITA, CUARZO, GRANATE, BIOTITA, SILICATOS-DE-ALUMINIO

OPACOS, CIRCON, TURMALINA, ESFENA, CLORITA, SERICITA, OXIDO

S

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico-arenoso aluminoso. Afectada por deformación y metamorfismo, con blastos de moscovita y biotita epidoblásticas que definen una esquistosidad de flujo, granate tardío a postmetamórfico, y silicatos de aluminio (andalucita?) que están en su mayor parte alterados a sericita y clorita.

Se aprecia una fase dinámica con pequeñas transposiciones, que sería anterior a la que genera los microplegues.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

DB?

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

B

8- ZONA METAMORFICA

GRANATE

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

MICASQUISTO CON GRANATE (CON MICRONITIZACION)

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGSC1509 T 15 19 CO

2- DATOS DE CAMPO

sucesión de esquistos cuarcosquistos con cuarcitas negras. Somio de Valencia de las Torres. Cera Murano. Grupo de Córdoba - Fuentebazana.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa de grano fino, aparentemente de baja cristalinidad.

4- EDAD

R, FEENSE MEDIO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - VALORACION - PROBABLE... P - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUISTOSA. GRANOLEPIDOBLASTICA. MILONITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO BIOTITA MOSCOVITA PLAGIOCLASA SILICATOS-DE-ALUM

INIO OPACOS CIRCON ESFENA FELDSPATO-POTASICO OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico arenoso, afectado por un proceso de metamorfismo regional en condiciones de grado bajo-medio, con blastos de cuarzo, moscovita, biotita, y posibles silicatos de aluminio.

Posteriormente estaría afectado por una fase milonítica, con trituración de todos los componentes y formación de abundante mica incolora, sericitica, a partir de la moscovita y de los silicatos de aluminio.

Diferenciados granoblasticos de cuarzo

Fracturas tardías con óxidos, feldespato potásico, biotita, de rita o cuarzo.

Micropleques tipo "kink bands".

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO C - DE SOTERRAMIENTO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

D-B

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

BC

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA AL MENOS

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico, Hercínico

10- CLASIFICACION

ESQUISTO MOSCOVITICO, MILONITIZADO

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1 5 7 9 13 15 19
1536NGSC1513 T CO

2- DATOS DE CAMPO

Rocas ácidas en Formación Malicónado. Dominio de Zafia-Alamo - Córdoba. Cuna de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca silicea esquistosa, con diferencia de cuaso.

4- EDAD

RIFEENSE SUP^{erior} + VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA, DIFERENCIADOS DE CUARZO DEFORMADOS

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, PLAGIOCLASA, FELDSPATO-POTASICO, SERICITA-MOSCOVITA

ITA, OPACOS, CIRCON, CLORITA, BIOTITA, EPIDOTA

OBSERVACIONES

Roca volcánica vítrea mayoritariamente en origen. Afectado por una fase de deformación sinmetamórfica, con desvitrificación, orientación, blastesis de sericita-moscovita lepidoblástica, y segregación de cuaso según la esquistosidad formada.

Micropleques tardíos, y un sistema de fracturas rellenas por minerales secundarios que pueden representar una esquistosidad de fractura.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

SERICITA-MOSCOVITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

META-RIOBITA META-RIOBITA

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA

EMP

REC

Nº MUESTRA

TA

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536NGSC1552T

CO

2- DATOS DE CAMPO

Material cimenítico en Formación Malacornado.
Grupo Dominio de Zafra-Alarcón-Córdoba. Cuna de Villa-
viciosa.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa fina, senectiva. do-
ritica, con pinta diseminada.

4- EDAD

RIFEENSE SUP. + VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUISTOSA, GRANOLEPIDOBLASTICA, MICROPLEGADA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, SERICITA-MOSCOVITA, CLORITA, BIOTITA, PLAGIOCLASA

OPACOS, ESFENA, APATITO, PIRITA, CLORITOIDE?, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de material detritico de grano fino, probablemente de cimenitico, con pequeños agregados granoblasticos de cuarzo procedentes de porfiroblastos. Diseminacion de cubos de pinta de hasta 2-3 mm.

Una fase de deformación semimetamórfica y sin-quistosa, con blastesis de sercita-moscovita sin-remática y clorita-biotita verdosa sin. a tardi-cinemática.

Granulación suave, poco manifestada, posterior.

Los cristales de pinta producen sombras de presión en que cristalizan cuarzo, biotita, y cloritoide.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - FLURIFACIAL

D

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO

C - MEDIO
D - ALTO

B

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA INCIPIENTE

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

META-CAÑERITA, METACINERITA

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

363

364

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGSC 1553 T 15 19 20

2.- DATOS DE CAMPO

Formación Malacourado. Dominio de Zofa. Alanís - Córdoba. Cuenca de Villavieja.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa sericitico-clorítica.

4.- EDAD

R1 FEENSE SUP-^{ERIOA} VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B - VALORACION - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUISTOSA. GRANOLEPIDOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, PLAGIOCLASA, SERICITA, MOSCOVITA, CLORITA, OPACOS, E
SIFENA, APATITO, FELDSPATO-POTASICO, CIRCON, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de material arenítico o tobáceo fino, con porfiroclastos de plagioclasa, cuarsos, y feldespato potásico. Los de cuarsos muestran formas de corrosión a menudo muy desarrolladas. Mineralización de pinta concentrada en algunos bellos.

Se reconocen dos fases de deformación:

- Una primera semimetamórfica y sin esquistosa, con blastesis de sericita-moscovita y clorita que alternan en cuanto a abundancia de unos bellos a otros.
- Una segunda con microplegues que localmente llevan asociada una esquistosidad espaciada, oblicua a la de flujo.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

8.- ZONA METAMORFICA

CLORITA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10.- CLASIFICACION

METACINERITA, METATOLITA
META-CINERITA O TOBA FINA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGSC 1554 T 15 19 CO

2- DATOS DE CAMPO

Rocas básicas en ^{FORMACION} Malacornado. Dominio de Zafra-Alanis - Córdoba. Cueva de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca volcánica porfídica y vacuolar. Abomas, de hasta 3-4 mm.

4- EDAD

RIFEMENSE SUP-^{ERIOR} VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BAASTOPORFIDICA. VACUOLAR

COMPOSICION MINERALOGICA

OLIGOCLASA ANFIBOL OPACOS ESFENA APATITO CLORITA EPIDOTA

TA CUARZO CALCITA ALBITA SERICITA

OBSERVACIONES

Roca volcánica porfídica-fluvidal en origen, con fenocristales idiomorfos de plagioclasa en matrix de grano muy fino con microcristales de plagioclasa y ferromagnesiano. Probablemente el anfíbol actual-mente primario (actinolítico) no sea primario.

Las plagioclasas están parcialmente alteradas a sericita, calcita y epidota.

El ferromagnesiano original está reemplazado por actinolita clorita-esfera, con epidota y calcita mas escasos.

Vacuolas rellenas de epidota, albita, clorita y calcita en diversas proporciones.

Fracturación acusada de la roca, con remobilizaciones

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

ACTINOLITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrica? Hercínico.

10- CLASIFICACION

META-ANDESITA META-ANDESITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 5 7 9 13 15 19

1536 NG5C155S T 40

2- DATOS DE CAMPO

Material detrítico grueso arenoso, en ^{colación} Malacón. Dominio de Zafra-Alarcos-Córdoba. Cuenca de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca masanosa con niveles mas arenosos o mas senicitos - arcillosos.

4- EDAD

RIFEENSE SUP - VENDIENSE E

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - PROBABLE... P - DUDOSA... D

VALORACION - BUENA... B - PROBABLE... P - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUISTOSA. BLASTOSAMITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, PLAGIOCLASA, FELDSPATO - POTASICO, SERICITA, MOSCOVITA, BIOTITA, OPACOS, TURMALINA, PARCON, APATITO, ESFENA, FRAGMENTOS DE ROCAS, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento arenoso fino, maso-feldespático, con matriz senicitica. La fracción arena comporta fragmentos de origen volcánico, relativamente escasos.

Se reconocen dos fases de deformación:

- Una primera sinmetamórfica y sinesquistosa, con blastesis epidoblástica de senicita-moscovita, y de biotita tardía a postunemática, desorientada. Se reconocen trasposiciones de niveles arenosos en relación con esta fase.

- Una segunda de microfleques.

Fracturas tardías con óxidos y feldespato potásico

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO C - DE SOTERRAMIENTO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO B - BAJO C - MEDIO D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrica? Hercínico.

10- CLASIFICACION

META- GRAUVACA ARCOSICA META GRAUVACA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	N6	SC	1572	T		Co	
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

Formación Malcoenado. Dominio de Zafra-Alarín.
Córdoba. Cima de Villavieja.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca granosa brechificada.

4.- EDAD

RIFEENSE SUP^{ERIOR} - VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C
VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUISTOSA LEPIDOBLASTICA BRECHIFICADA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO SERICITA PLAGIOCLASA OPACOS ESFENA APATITO FELD

ESPARTO - POTASICO OXIDOS BIOTITA CLORITA

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico - arenoso fino.
Afectada por tres fases de deformación:
- Una primera sinmetamórfica y sinesquistosa, con
blastesis de sericita - moscovita y clorita - biotita, ambas
de grano muy fino.
- Una segunda con suave microplegado
- Una tercera con brechificación importante
Fracturillas con cuarzo - feldespato potásico.
Oxidación importante en relación con la brechificación.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

8.- ZONA METAMORFICA

BIOTITA MUY INCIPIENTE

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico

10.- CLASIFICACION

PIZARRA g FILITA BRECHIFICADA

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGSC 1579 T 15 19

2.- DATOS DE CAMPO

Rocas básicas en F. Malacónado, Dominio de Zafra-Alarcos - Córdoba. Cuna de Villavieja.

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca porfídica esquistosa, de color verde osuro.

4.- EDAD

RIFEENSE SUP. + VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOPORFIDICA. ESQUISTOSIDAD INCIPIENTE

COMPOSICION MINERALOGICA

ALBITA - OLIGOCLASA, CLORITA, SERICITA, MOSCOVITA, CUARZO, OP

ACOS, CALCITA, ANKERITA, ESFENA, FELDSPATO - POTASICO, OXIDO

S

OBSERVACIONES

Roca porfídica fluidal en origen, con plagioclasa como fenocristales, y microcristales de la matriz como único mineral primario mayoritario heredado, y que está parcialmente reemplazada por calcita y sericita.

El fenomagnesiano está totalmente reemplazado por clorita fundamentalmente.

calcita y ankerita abundantes, de liberación de Ca de plagioclasa, y Fe de fenomagnesiano.

Una fase de deformación sinerquistosa y sinmetamórfica. Esta esquistosidad está posteriormente deformada.

Fracturas con remobilización, y depósito de minerales epigenéticos.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

8.- ZONA METAMORFICA

CLORITA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10.- CLASIFICACION

META-ANDESITA META-ANDESITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1582 NGSC 1582 T 15 19

2- DATOS DE CAMPO

Rocas ácidas en Formación Maleocinada. Dominio de Zafra. Alamo - Córdoba. Guina de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

roca cuarsa-feldespática esquistoso-fluidal, de color rosado.

4- EDAD

RIFEENSE SUAP^{erisa} - VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA. A A - BUENA B P
- DATACION ABSOLUTA. B A VALORACION - PROBABLE. P
- DATACION PALEONTOLOGICA. C 44 - DUDOSA. D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOPORFIDICA. RESTOS DE ORBICULAS ESFERULITICAS

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, FELDESPATO-POTASICO, ALBITA-OLIGOCLASA, SERICITA

MOSCOVITA, CLORITA, BIOTITA, OPACOS, CIRCON, ESFENA, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca original porfídica ácida, con fenocristales de plagioclasa en matriz vítrea en origen, y con relictos de texturas orbiculares esferulíticas.

Una fase de deformación sinesquistosa y semimetamórfica, con neoformación de cuarsa, sericita-moscovita y feldspatos, en un proceso esencialmente de desvitrificación, en condiciones metamórficas de grado muy bajo.

Fase con microfleques tardías suaves

Fracturas con cuarsa y óxidos.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO D - REGIONAL
B - DINAMICO E - PLURIFACIAL
C - DE SOTERRAMIENTO

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO
B - BAJO D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

SERICITA-MOSCOVITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico

10- CLASIFICACION

METARIOCLITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA

EMP

REC

Nº MUESTRA

TA

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGSC1584 T

CO

1

5

7

9

13

15

19

2- DATOS DE CAMPO

Rocas ácidas en la Formación Malacínado. Dominio de Zafra-Alanis - Córdoba. Cuna de Villaviciosa.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca porfiroclástica, tobácea, esquistosa.

4- EDAD

RIFEESE SUP - VENOCIENSE

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A

- DATACION ABSOLUTA... B

- DATACION PALEONTOLOGICA... C

A

VALORACION - BUENA... B

- PROBABLE... P

- DUDOSA... D

44

45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOSAMITICA. PORFIROCLASTICA

46

99

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, ALBITA-OLIGOCLASA, FRAGMENTOS-DE-ROCA, FELDSPAT

100

153

D-POTASICO, SERICITA, MOSCOVITA, CLORITA, OPACOS, ESFENA, CI

154

207

RCON, EPIDOTA, CALCITA, OXIDOS

208

261

OBSERVACIONES

Roca tobácea ácida en origen, con fenoclastos de cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico (micro), y litoclastos variados, que corresponden a:

- Rocas microcristalinas cuarzo-plagioclásicas
- Rocas graníticas, ocasionalmente con texturas gráficas.
- Rocas volcánicas fluidales
- Rocas volcánoclasticas de grano muy fino.

clastos de cuarzo con formas de conchión.

Una fase de deformación, sin esquistosa y sin metamorfismo, con sericita, moscovita y clorita lepidoblásticas, que definen la esquistosidad de flujo, y epidota y calcita que fundamentalmente reemplazan a plagioclasa.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO

B - DINAMICO

C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL

E - PLURIFACIAL

D

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO

B - BAJO

C - MEDIO

D - ALTO

A

266

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

META-TOBA ACIDA META-TOBA-ACIDA

309

362

ANÁLISIS QUÍMICO

363

MIGMATITA

364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	SC	1587	T		CO	
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Rocas básicas en Formación Malocinado. Dominio de Zafra.
- Alarcos - Córdoba. Cuenca de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa porfiroclástica, tobácea.

4- EDAD

RIFEENSE SUP - VENDIENSE E

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A VALORACION - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 VALORACION - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUISTOSA. PORFIROCLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

ALBITA - OLIGOCLASA, CLORITA, BIOTITA, SERICITA, MOSKOVITA, C

ALCITA, OPACOS, APATITO, ESFENA, FELDSPATO - POTASICO, OXIDO

S

OBSERVACIONES

Roca original tobácea de composición andesítica, con abundantes porfiroblastos de plagioclasa.

Una fase de deformación sinmetamórfica, con blastesis de sericita - moscovita y clorita lepidoblástica, sinclinal, de biotita tardía a postcineamática, desorientada sobre la clorita, y albita - cinemática.

Fase posterior que produce micropleques con esquistosidad espaciada.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA (TARDIA POST - CINEMATICA)

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrica ? Hercínico.

10- CLASIFICACION

METATOBA, METANDESITA

META - TOBA ANDESITICA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 5 3 6 N 6 5 C 1 5 8 8 7 15 19

2- DATOS DE CAMPO

Tramo silíceo carbonatado (C.F. Malacónada?)
 Dominio de Zafra - Alarcón - Córdoba. Cuenca de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca masanosa, fina, de color marón.

4- EDAD

RIFEENSE SUPERIOR - VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
 - DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUISTOSA. BLASTOPELITICA. MACULOSA INCIPIENTE

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, PLAGIOCLASA, SERICITA, MOSCOVITA, BIOTITA, FELDSPAR

TG-POTASICO, OPACOS, TURMALINA, CIRCON, ESFENA, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico - arenoso fino, algo feldespático.

Afectada por una fase de deformación semi-metamórfica, con blastesis epidoblastica de sericita - moscovita que define una esquistosidad de fleije.

Indicios de metamorfismo de contacto, con el que relacionaria la blastesis de biotita

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO D - REGIONAL
 B - DINAMICO E - PLURIFACIAL
 C - DE SOTERRAMIENTO

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO
 B - BAJO D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

SERICITA - MOSCOVITA (D) Y BIOTITA (A)

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

HERCINICO (D) y TARDI A POST HERCINICO (A)

10- CLASIFICACION

PIZARRA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	SC	1589	7		CO	
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Roca de silicatos cálcicos en sucesión detritica-
 - carbonatada (c. Formación Mallescinada?). Comunes de Zafra. Hams.
 - Córdoba. Zona de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca calcisilicea de grano muy fino, sin orientación apreciable.

4- EDAD

RIFEENSE SUP. - VENEDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

ESCAPOLITA CALCITA FELDSPATO OPACOS CIRCON ESFENA EP

IDOTA OXIDOS CUARZO

OBSERVACIONES

Roca carbonatada impura en origen, afectada por metamorfismo de contacto que transforma a la misma en una roca de silicatos cálcicos, de grano muy fino, lo que dificulta el reconocimiento correcto de las diversas especies minerales.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO
 D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO
 C - MEDIO
 D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

ESCAPOLITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

TARDI A POST HERCINICO

10- CLASIFICACION

ROCA DE SILICATOS CALCICOS

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 536 N 65 C 1590 T 15 19

2- DATOS DE CAMPO

Tramos detriticos gruesos, arenosos, en ^{Fortuna} Malacónado.
 Dominio de Zafra-Alarcón-Córdoba. Cuna de Villavieja

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca detritica, arenosa, cuaso-feldespática, esquistosa.

4- EDAD

RIFEENSE SUP - VENDEIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
 - DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOSAMITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, FELDESPATO - POTASICO, PLAGIOCLASA, SERICITA, MOSCOV

ITA, FRAGMENTOS - DE - ROCA, BIOTITA, OPACOS, ESFENA, CIRCONA

PATITO, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca detritica procedente de sedimento arenoso, cuaso-feldespático, con frecuentes fragmentos de roca en su matriz sericitica que mayor parte volcánicos. en matriz sericitica que no llega a constituir el 15% del total de la roca. Algunos clastos de cuaso tienen formas, e inclusiones de biotita que sugieren un origen volcánico.

Afectada por una fase de deformación sinmetamórfica, con clastos de sericita - moscovita lepidoblástica que define una esquistosidad de flujo. Otra fase posterior de micropleques suaves, con esquistosidad espaciada.

Fracturas tardías rellenas por cuaso

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO
 D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO
 C - MEDIO
 D - ALTO

A 266

8- ZONA METAMORFICA

SERICITA - MOSCOVITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

METARCOSA

ANÁLISIS QUÍMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 5 7 9 13 15 19

1536NGSC1591 T CO

2- DATOS DE CAMPO

Calizas en tramo bitútico carbonatado (F. Maluco, cinado). Dominio de Zafra-Almarín - Córdoba. Cerro de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca mármolea esquistosa, de color gris oscuro.

4- EDAD

RIFEENSE SUP + VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOBLASTICA ELONGADA. NIVELES GRANOBLASTICOS

COMPOSICION MINERALOGICA

CALCITA TREMOLITA CUARZO OPACOS OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca carbonatada con escasas impurezas. afectada por deformación y metamorfismo que produce reorientación elongada de la calcita, y blastesis de tremolita desorientada, que podría estar en relación con metamorfismo de contacto.

Remobilizaciones tardías de calcita.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

DA?

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

B

8- ZONA METAMORFICA

CALCITA-TREMOLITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

HERCINICO 4/0 TARDE A POST HERCINICO

10- CLASIFICACION

MARMOL TREMOLITICO

ANALISIS QUIMICO

MIGMATITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536NGSC1592 T 15 19

2- DATOS DE CAMPO

Conglomerado en Formación Malicunado. Dominio de Zafra - Alarcos - Córdoba. Cuna de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Ronglomerado de cantos elongados, de diversos tipos de rocas volcánicas en matriz tobácea.

4- EDAD

RIFEENSE SUP + VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PAL EONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTO SERITICA. MATRIZ BLASTO SAMITICA, TOBAKEA

COMPOSICION MINERALOGICA

ALBITA - OLIGOCLASA, CUARZO, SERICITA, MOSCOVITA, CLORITA, B

OTITA, OPACOS, CIRCON, ESFENA, FRAGMENTOS DE ROCA, OXIDOS

OBSERVACIONES

Conglomerado constituido por aportes esencialmente volcánicos. Fenoclastos de cuarzo y plagioclasa. Fragmentos de rocas correspondientes a:

- Rocas microcristalinas plagioclásicas y cuarsoplagioclásicas.
- Rocas volcánicas de grano muy fino con microcristales de plagioclasa y cuarzo.
- Rocas porfídicas con plagioclasa, cuarzo y biotita.
- Agregados granoblásticos de cuarzo.
- Material vitro desortificado.

Deformación y metamorfismo, con blastos biotoblásticos de sericita - moscovita de la matriz tobácea. Elongación de los cantos.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

SERICITA - MOSCOVITA / CLORITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

METACONGLOMERADO TOBAKEO

309

362

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 536 N65C 1595 T 15 19 CO

2- DATOS DE CAMPO

Rocas ácidas en Formación Malvarado. Dominio de Zafra-Hanis - Córdoba. Cuenca de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca tobácea expuntosa.

4- EDAD

RIFEENSE SUP - KENDIENSE 21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A VALORACION - BUENA... B

- DATACION ABSOLUTA... B - DUDOSA... D

- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUISTOSA. PORF. ROCCLASTICA 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, ALBITA-OLIGOCLASA, FELDSPATO-POTASICO, FRAGMENTO 100 153

S-DE-ROCAS SERICITA, MOSCOVITA, CIRCON, ESFENA, OPACOS, OXI 154 207

DOS 208 261

OBSERVACIONES

Roca tobácea ácida, con fenoclastos de cuarzo y feldspatos, y abundantes litoclastos de hasta 8mm, correspondientes a diversos tipos de rocas ígneas:

- Rocas porfídicas - fluidales con fenocristales de plagioclasa y matrix microcristalina cuarzo-feldespática.
- Rocas porfídicas con fenocristales de plagioclasa y cuarzo
- Rocas microcristalinas cuarzo-feldespáticas
- Vidrios volcánicos ácidos desvitificados.
- Granitoides.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL

C - DE SOTERRAMIENTO E - PLURIFACIAL 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO

B - BAJO D - ALTO 266

8- ZONA METAMORFICA

SERICITA-MOSCOVITA 268 308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

10- CLASIFICACION METATOA-ACIDA

META-TOBA ACIDA 309 362

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	W	5	C1601	T		CO	
1	5	7	9	13	15	19	

2- DATOS DE CAMPO

Tramo arenítico intercalado en rocas ácidas de la Formación Mallocinado. Dominio de zona Alami. Córdoba. Cima de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa de grano muy fino, sericitica, arenítica.

4- EDAD

RIFEENSE SUP. - VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - VALORACION - PROBABLE... P - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANOLEPIDOBLASTICA. GRANO MUY FINO

COMPOSICION MINERALOGICA

SERICITA, MOSCOVITA, CUARZO, PLAGIOCLASA, OPACOS, ESFENA, CL

RCON OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento volcanoclastico fino, arenítico, ~~fino~~ ácido, con pequeños porfiroclastos de plagioclasa y cuarzo en matriz sericitica.

Afectada por una fase de deformación sinmetamórfica y sinesquistosa, con blastosis de sericita-moscovita lepidoblástica.

Otra fase de microfleques suaves con esquistosidad espaciada desarrollada solo en ciertos niveles casi exclusivamente areníticos.

Fracturas tardías abiertas, con relleno de cuarzo. Otras fisuras con óxidos.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO
D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO
C - MEDIO
D - ALTO

A

8- ZONA METAMORFICA

SERICITA - MOSCOVITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Pre cámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

METACINERITA

FELDSPATICO

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA

EMP

REC

Nº MUESTRA

TA

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536NGSC1602 T

CO

2- DATOS DE CAMPO

Rocas ácidas en Formación Makocinado. Dominio de
Zafra. Alarcón - Córdoba. Cuenca de Villavieja.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca volcánica de color oscuro, aspec-
to vítreo, con microfeno cristales de feldespato.

4- EDAD

RIFEENSE SUP - VENDIENSE

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... CVALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTOPORFIDICA. BRECHIFICADA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, FELDESPATO - POTASICO, ALBITA, CLORITA, SERICITA, CAL

CITA OPACOS ESFENA, CIRCON, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca original porfídica de matriz probablemente
vítreo, desvitrificada, recristalizada y orientada
en relación con una fase de deformación sinisquis-
tosa y sinmetamórfica, en condiciones de grado
muy bajo. Los minerales neoformados s/o recis-
talizados son cuarzo, feldespato, clorita, y sericita,
de grano muy fino. La calcita se encuentra dispersa
en pequeños agregados.

Posteriormente se produce brechificación, con reno-
vilización de clorita y calcita.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTOD - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJOC - MEDIO
D - ALTO

A

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico? Hercínico.

10- CLASIFICACION

META-RIOLITA BRECHIFICADA

ANALISIS QUIMICO

MIGMATITA

363

364

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 5 3 6 N 6 S C 1 6 1 8 T

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CO

CLASIFICACION EFECTUADA POR:
 P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca cuarsa-feldespática, muy leucocrata,
 fuertemente orientada

4.- EDAD

21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NEISICA, MILONITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, FELDSPATO-POTASICO, ALBITA-OLIGOCLASA, OPACOS, CI

RCON, APATITO, SERICITA

OBSERVACIONES

Roca cuarsa-feldespática probablemente porfírica en
 origen, y muy leucocrata.
 Constituida por fenoclastos o cristales de feldespato
 de hasta 2-3 mm., en matriz - mesostasis cuarsa-fel-
 despática originada, al menos en parte, por granulización
 en relación con un proceso dinámico, y posterior recrista-
 lización

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

B 262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

Sin datos

A - MUY BAJO
 B - BAJO

C - MEDIO
 D - ALTO

266

8.- ZONA METAMORFICA

Sin datos

268

308

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

10.- CLASIFICACION

WEIS MILONITICO LEUCOCRATO

309

362

ANÁLISIS QUÍMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1 5 3 6 N 6 S C 1 6 2 0 T

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

P. Higueros

2- DATOS DE CAMPO

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca verdosa, de aspecto porfídica, sin orientación aparente alguna.

4- EDAD

21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
 - DATACION ABSOLUTA... B
 - DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
 - PROBABLE... P
 - DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NEISICA

COMPOSICION MINERALOGICA

OLIGOCLASA CUARZO FELDSPATO-POTASICO BIOTITA CLORITA

EPIDOTA ESFENA OPACOS APATITO TURMALINA SERICITA OXIDO

5

OBSERVACIONES

Roca procedente de una posible volcanta and. dacítica, de acuerdo con los caracteres texturales que actualmente se observan. 15-36

Afectada por un proceso de deformación simétrica, con blastesis de biotita sincinemática y epidota.

La biotita aparece posteriormente reemplazada por clorita + esfena.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO
 C - MEDIO
 D - ALTO

B 266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

10- CLASIFICACION

NEIS BIOTITICO ORTONEIS METAVOLCANITA-INTERMEDIO

ANALISIS QUIMICO

MIGMATITA

363

364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA
 1536 NG5C1621 T

PROFUNDIDAD
 15

PROVINCIA
 CO

CLASIFICACION EFECTUADA POR:
 P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa cuaso-feldespática y
 monovítica.

4- EDAD

21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A
 - DATACION ABSOLUTA B
 - DATACION PALEONTOLOGICA C

VALORACION - BUENA B
 - PROBABLE P
 - DUDOSA D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

ESQUISTOSA A NEISICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA FELDESPATO-POTASICO MOSCOVITA BIOTITA

TA OPACOS CIRCON ESFENA APATITO SERICITA OXIDOS CLORIT

A

OBSERVACIONES

Roca neisica, probablemente derivada de material
 tobáceo de composición riolítica.

Afectada por una deformación semi-metamórfica, que
 crea una esquistosidad de flujo con blastesis de mosco-
 vita y biotita mas escasa, sin a tardicnemáticas
 (en parte están desorientadas, pero afectadas por el
 flattening).

Esquistosidad espaciada posterior, oblicua a la de flujo.

Acurada sencitización de plagioclasa.

Núcleos secundarios de clorita - biotita verdosa.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
 B - DINAMICO
 C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
 E - PLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
 B - BAJO

C - MEDIO
 D - ALTO

B 266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

10- CLASIFICACION

NEIS MOSCOVITICO CON BIOTITA

ANÁLISIS QUÍMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA

EMP

REC

Nº MUESTRA

TA

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536NG5C1622T

CO

P. Higuera 3

2- DATOS DE CAMPO

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa, tipo neis pelítico, con grandes placas de moscovita

4- EDAD

21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... CVALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BLASTO PORFIROBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA FELDSPATO - POTASICO MOSCOVITA BIOTI

TA FIBROLITA ANDALUCITA OPACOS CIRCON APATITO ESFENA S

ERICITA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca procedente de material indentificable, lado lo evolucionado tectónica y mineralógicamente de la muestra.

Afectada por un primer proceso de deformación, con blastos de biotita - andalucita - plagioclasa? - feldespato potásico - fibrolita (que crece tardía, a partir de biotita), y moscovita (aún más tardía, como grandes blastos pelíticos respecto a biotita - andalucita, plagioclasa...). No se reconoce deformación coetánea a este metamorfismo. Deformación ulterior con una cierta componente dúctil, y recristalización subsecuente de sericita - moscovita y cuarzo. Produce reorientación mecánica fundamentalmente.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTOD - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D - B

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJOC - MEDIO
D - ALTO

D

8- ZONA METAMORFICA

SILLIMANITA - FELDSPATO - POTASICO

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

10- CLASIFICACION

NEIS SILLIMANITA

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

363

364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NG SC 1623 7 15 19 CO P. Higuera S

2- DATOS DE CAMPO

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca silicea, groseramente esquistosa, con porfiroblastos de granate de hasta 1 cm.

4- EDAD

21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B - VALORACION - PROBABLE... P - DUDOSA... D

- DATACION ABSOLUTA... B - 44 - 45

- DATACION PALEONTOLOGICA... C

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NEISICA, PORFIROBLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA BIOTITA MOSCOVITA GRANATE OLORITA S

ERICITA EPIDOTA OPACOS APATITO CIRCON ESFENA OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca neisica procedente de material cuarsos-feldespático probablemente de origen tobáceo.

Afectada por una deformación sinmetamórfica, que crea una gruesa esquistosidad, con blastesis de epidoblastica de biotita y en masa moscovita, que aulan porfiroblastos de plagioclasa, y de grandes porfiroblastos tardíos post-cinemáticos de granate.

Retrogradación ulterior, con sericita, clorita y epidota que reemplazan a los minerales de la paragénesis previa.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL E - PLURIFACIAL

C - DE SOTERRAMIENTO

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO B - BAJO D - ALTO

266

8- ZONA METAMORFICA

GRANATE

268 308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

10- CLASIFICACION

ORDONEIS NEISLAGIOCLASTIC

NEIS CON GRANATE

309 363

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 5 7 9 13 15 19

1536NG5C1624 T CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO Roca cuarsa feldespática, neísiica, de grano fino, fuertemente orientada.

4- EDAD

21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NEÍSIICA 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO FELDSPATO - POTASICO PLAGIOCLASA MOSKOVITA BIOTITA 100 153

TA OPACOS CIRCON ESFENA SERICITA CLORITA OXIDOS 154 207

208 261

OBSERVACIONES

Roca cuarsa - feldespática de origen indeterminado, probablemente volcanoclástica.

Afectada por un proceso de deformación sinmetamórfica, con foliación de moscovita y biotita (mas escasa) sin a tándemáticas.

Alteración, retrogradación ulterior poco importante.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL
C - DE SOTERRAMIENTO E - PLURIFACIAL 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO B
B - BAJO D - ALTO 266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA 268 308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

10- CLASIFICACION ORTONEIS
NEIS DE GRANO FINO 309 362

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA

EMP

REC

Nº MUESTRA

TA

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536NGSC1626T

CO

P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca cuarsa-feldespática, muy leucocrata, fuertemente estirada.

4- EDAD

21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... CVALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NEISICA, MILONITICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO FELDESPATO-POTASICO ALBITA SERICITA MOSCOVITA O

PACOS ESFENA CIRCON OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca cuarsa-feldespática, probablemente derivada de material volcánico ácido muy leucocrato. Afectada por un proceso dinámico, con granulación de cuarsa y feldespatos, con posterior recristalización.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTOD - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

B

7- GRADO DE METAMORFISMO

sin datos

A - MUY BAJO
B - BAJOC - MEDIO
D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

sin datos

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

10- CLASIFICACION

LEUCANEIS NEIS MILONITICO
NEIS LEUCOCRATO MILONITICO

ANALISIS QUIMICO

MIGMATITA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 536 NGSC 1627 T 15 19 CO P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

3.- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca de aspecto porfídico. onen.
tada.

4.- EDAD

21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A ☐ - BUENA... B ☐
- DATACION ABSOLUTA... B ☐ VALORACION - PROBABLE... P ☐
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

MEISICA 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO, ALBITA-OLIGOCLASA, BIOTITA GRANATE SERICITA, MOSC 100 153

OVITA, CLORITA, EPIDOTA, OPACOS, CIRCON, APATITO, OXIDOS 154 207

OBSERVACIONES

Roca cuarsa-feldespática, procedente de material
volcánico o volcanoclastico ácido (dacítico)

Afectado por un proceso de deformación, sin meta-
morfismo, con una cierta componente dinámica,
que se traduce en la creación de una esquistosidad
de flujo, en parte microlítica, y clastos de biotita,
escasa moscovita (sericitica, de grano muy fino), y
granate, así como, en parte, del cuarsa granulado.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL DB ☐
C - DE SOTERRAMIENTO E - PLURIFACIAL 262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO B ☐
B - BAJO D - ALTO 266

8.- ZONA METAMORFICA

GRANATE 268 308

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

10.- CLASIFICACION BRTONAIS, NEIS PLAGIOCLASICO, NEIS BIOTITICO GRANATIFERO
NEIS BIOTITICO CON GRANATE 309 362

ANÁLISIS QUÍMICO ☐ 363

MIGMATITA ☐ 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGS 41628 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

cuarcitas feldespáticas tabreadas. Dominio de Valencia de los Torres. Ceno Murano. Grupo de Sierra Albarrana.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca cuarcítica fina, fageada. se reconocen feldespato y moscovita abundantes.

4- EDAD

PRECAMBRIKO-OROVICIKO

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A VALORACION - BUENA... B D
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANO (LEPIDO) BLASTICA, ESQUISTOSA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA MOSCOVITA BIOTITA OPACOS CIRCON ESF

ENA APATITO OXIDOS FELDESPATO-POTASICO

OBSERVACIONES

Roca cuarcio-feldespática de grano muy fino, probablemente derivada de sedimento arenoso con finas pasadas lutíticas.

Afectada por una deformación sinmetamórfica, con blastemas de sericita-moscovita y biotita sinmetamórfica, y elongación de los granos detriticos de cuarcio y feldespato, que definen una esquistosidad de flujo.

Fracturillas tardías subparalelas con feldespato potásico.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL
C - DE SOTERRAMIENTO E - PLURIFACIAL

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO B
B - BAJO D - ALTO

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

Precámbrico y/o hercínico.

10- CLASIFICACION

CUARCITA MICACEA-FELDESPATICA
CUARCITA FELDESPATICA MOSCOVITICA

ANÁLISIS QUÍMICO

MIGMATITA

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA	EMP	REC	Nº MUESTRA	TA	PROFUNDIDAD	PROVINCIA	CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536	NG	SC	1629	T		CO	P. Higuera
1	5	7	9	13	15	19	

2.- DATOS DE CAMPO

Ojo: zona de fractura?

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO *roca micácea esquistosa, y micro-
plegada.*

4.- EDAD

-POSICION ESTRATIGRAFICA.....A	☐	-BUENA.....B	☐
PROCEDIMIENTO-DATACION ABSOLUTA.....B		VALORACION-PROBABLE.....P	
-DATACION PALEONTOLOGICA.....C	44	-DUDOSA.....D	45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

45 GRANO) LEPI DOBLASTICA, ESQUISTOSA 99

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO PLAGIOCLASA MOSCOVITA BIOTITA GRANATE CLORITA S

ERICITA OPACOS CIRCON ESFENA GRAFITO OXIDOS

208
OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutítico - arenoso, algo feldespático, y posiblemente con una cierta influencia volcanoclástica.

La roca aparece intensamente deformada. Se reconocen al menos dos fases:

- Una primera metamorfica, con blastesis lepidoblastica de moscovita y escasa biotita, y de granate, y con segregaciones cuarsa-feldespáticas.

- La segunda origina una grosera esquistosidad espaciada, que desorganiza notablemente a la primera, y produce reinitalización de sericita, y reorientación de moscovita. La clorita que reemplaza a biotita y granate se relacionaría con esta fase.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO B
B - BAJO D - ALTO

8.- ZONA METAMORFICA

GRANATE

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENÉTICAS - *FEDEL PATICA*

10 - CLASIFICACION

NICASQUISTO CON GRANATE

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA ☐

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1 536 NG SC 1633 T 15 19 Co P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO Roca esquistosa bandada, con niveles cuar-
zo-feldespáticos finos, y pelíticos con grandes placas desorientadas
de moscovita

4- EDAD

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NIVELES NEISICOS Y PORF, ROBLASTICOS

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO ALBITA-OLIGOCLASA MOSCOVITA BIOTITA SILLIMANITA

OPACOS CIRCON ESFENA OXIDOS

A horizontal timeline with a green line and vertical tick marks. The number 208 is at the left end and 261 is at the right end. There are 11 tick marks between 208 and 261, representing intervals of 5 years.

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES

Roca procedente de material desconocible, probablemente
volcanoclástico.

Afectada por un primer proceso de metamorfismo, posiblemente sin- a tardicinemático, con blastesis de biotita, sillimanita, y plagioclasa? o moscovita tardía, en grandes placas desorientadas.

Se reconoce una segunda fase, con una cierta componente dinámica, que produce reorientación mecánica de los minerales micáceos, y granulación del cuarzo, los feldspatos, y, en parte, de las micas, y que es responsable de la orientación mas patente visible en la muestra. Se acompaña de recristalización de sericita y clorita

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO OC
B - BAJO D - ALTO

8.- ZONA METAMORFICA

SILICIMANITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

10-CLASIFICACION ORTONEIS
NEIS CON SILLIMANITA

ANALISIS QUIMICO ☐ 363

MIGMATITA ☐

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1 5 7 9 13 15 19 P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca granítica y rosada, neisificada.

4- EDAD

21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A - BUENA... B
- DATACION ABSOLUTA... B VALORACION - PROBABLE... P
- DATACION PALEONTOLOGICA... C 44 - DUDOSA... D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

NEISICA, MILONITICA 46 99

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO ALBITA-OLIGOCLASA FELDSPATO-POTASICO MOSCOVITA 100 153
BIOTITA SERICITA CLORITA PIRITA APATITO OXIDOS CIRCON 154 207
208 261

OBSERVACIONES

Roca granítica, de grano medio, neisificada se reconocen los efectos de una deformación milonítica, que produce granulación del cuarsos, y en menor escala, de los feldspatos y las micas. Posteriormente se produce recristalización de cuarsos, de sericita-moscovita, y sustitución de la biotita por clorita. Este proceso produce una gruesa esquistosidad espaciada.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL E - FLURIFACIAL 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO B - BAJO D - ALTO 266

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA-BIOTITA 268 308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

10- CLASIFICACION

ORTONEIS, PROTOMILONITA 309 362

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1536 NGSC 1636 7 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

Ojo: remenda a F. Azuaga.

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca esquistosa de grano fino (filita o esquistos). Laminación primaria.

4- EDAD

21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA... A
- DATACION ABSOLUTA... B
- DATACION PALEONTOLOGICA... C

VALORACION - BUENA... B
- PROBABLE... P
- DUDOSA... D

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

LEPIDOBLASTICA ESQUISTOSA CRENUCLADA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO MOSCOVITA BIOTITA OPACOS CIRCON TURMALINA ESFEN

A OXIDOS

208 261

OBSERVACIONES

Roca procedente de sedimento lutitico con escasa fracción arena-limo, cuarcítica.

Afectada por una primera deformación sinmetamórfica, con blastos de moscovita y biotita de grano fino lepidoblásticas, que definen una esquistosidad de flujo.

Se reconoce una segunda fase que origina una crenulación oblicua a la esquistosidad previa.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D - REGIONAL
E - PLURIFACIAL

D 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO
B - BAJO

C - MEDIO
D - ALTO

B 266

8- ZONA METAMORFICA

BIOTITA

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

10- CLASIFICACION

ESQUISTO, FILITA

309

362

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA 364

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:

1536 NGS 1640 T 15 19 CO P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca cuarsa- pelítica fuertemente brechificada.

4- EDAD

21

43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A VALORACION - BUENA B

- DATACION ABSOLUTA B VALORACION - PROBABLE P

- DATACION PALEONTOLOGICA C 44 VALORACION - DUDOSA D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

BRECHA DE CLASTOS: GRANO LEPI DOBLASTICA

46

99

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO SERICITA MOSCOVITA CLORITA OPACOS CIRCON ESFENA

100

153

OXIDOS

154

207

208

261

OBSERVACIONES

Roca brechoide, constituida por clastos correspondientes a filitas arenosas y cuarcitas esquistosas, de grano fino, y esquistosadas con anterioridad a la brechificación.

La brecha es claramente de origen tectónico, con mezcla de materiales procedentes de distintos niveles de una alternancia relativamente homogénea.

oxidación, asociada a las superficies de fractura.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO B - DINAMICO D - REGIONAL B

C - DE SOTERRAMIENTO E - PLURIFACIAL 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

Sin datos

A - MUY BAJO C - MEDIO A

B - BAJO D - ALTO 266 (Regional)

8- ZONA METAMORFICA

(Regional)

SERICITA-MOSCOVITA

268

308

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENETICAS

10- CLASIFICACION

BRECHA TECTONICA

309

362

ANALISIS QUIMICO

363

MIGMATITA

364

1.- IDENTIFICACION

Nº HOJA				EMP	REC	Nº MUESTRA				TA		
1	5	3	6	N	G	S	C	1	6	4	5	T
1				5		7		9				13

PROFUNDIDAD

PROVINCIA

CLASIFICACION EFECTUADA POR:

P. Higuera

2.- DATOS DE CAMPO

2.- DATOS DE CAMPO Roca cuarzo-feldespática intercalada en rocas
micáceas y micáceas

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

3-DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO Roca silicea, feldespática, fina, oventada y brechificada.

4- EDAD

	-POSICION ESTRATIGRAFICA...A	☐
PROCEDIMIENTO	-DATACION ABSOLUTA.....B	
	-DATACION PALEONTOLOGICA...C	44

	-BUENA.....	B	☐
VALORACION	-PROBABLE...	P	☐
	-DUDOSA.....	D	☒ 45

5.- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

GRANULOPROLIFERATIVA A NEISSICA

COMPOSICION MINERALOGICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO	FELDSPATO-POTASICO	ALBITA	MOSCOVITA	OPACOS	CIR
--------	--------------------	--------	-----------	--------	-----

153

CON APATITO, ESFENA, OXIDOS

208
OBSERVACIONES

208
OBSERVACIONES

ROCA procedente de sedimento volcanoclástico, con abundantes porfiroclastos de cuarcos y feldespatos, de hasta 500-800 μ . en matrix lutítico-arenosa, igualmente feldespática. Se reconocen algunos litoclastos. Afectada por un primer proceso de deformación sin metamórfico, que crea una esquistosidad de fleije marcada por blastesis de moscovita, fundamentalmente. Una segunda fase crea una esquistosidad espaciada oblicua a la anterior. Superficies de fractura longitudinales a la lámina con relleno de cuarzo de grano muy fino.

6.- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO

D- REGIONAL
E- PLURIFACIAL

0			
---	--	--	--

262

7.- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO	C - MEDIO
B - BAJO	D - ALTO

A

8.- ZONA METAMORFICA

MOSCOVITA

9.- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENÉTICAS

10-CLASIFICACION ~~METARCOSEANALCANOCLASTICA~~ METAVOLCANICISTIMA
META-ARCOSEA VOLCANOCLASTICA (NEIS)

309

ANALISIS QUIMICO 363

MIGMATITA ☐

1- IDENTIFICACION

Nº HOJA EMP REC Nº MUESTRA TA PROFUNDIDAD PROVINCIA CLASIFICACION EFECTUADA POR:
1 5 7 9 13 15 19 P. Higuera

2- DATOS DE CAMPO

710: Póble toba de Malocén

3- DATOS ESTRUCTURALES EN LA MUESTRA DE MANO

Roca cataclástica esquastosa.

4- EDAD

21 43

PROCEDIMIENTO - POSICION ESTRATIGRAFICA A ☐ - BUENA B ☐
- DATACION ABSOLUTA B ☐ VALORACION-PROBABLE P ☐
- DATACION PALEONTOLOGICA C 44 - DUDOSA D 45

5- ESTUDIO MICROSCOPICO

TEXTURA

CATACLASTICA

COMPOSICION MINERALOGICA

CUARZO / PLAGIOCLASA, FELDSPATO-POTASICO, CLORITA, BIOTITA

SERICITA, OPACOS, CIRCON, ESFENA, OXIDOS

OBSERVACIONES

Roca cataclástica, procedente de material cuaso-feldespático de origen incierto.

Afectada por una deformación cataclástica que produce total desorganización textural de la roca original, con reducción importante del tamaño de grano. Asociada a este fenómeno, que origina una gruesa orientación de la roca, se produce blastesis lepidoblástica de clorita-biotita de grano muy fino.

6- TIPOS DE METAMORFISMO

A - DE CONTACTO D ☐
B - DINAMICO
C - DE SOTERRAMIENTO E - PLURIFACIAL 262

7- GRADO DE METAMORFISMO

A - MUY BAJO C - MEDIO AB ☐
B - BAJO D - ALTO 266

8- ZONA METAMORFICA

CLORITA-BIOTITA

9- EDAD DE LAS FASES PETROTECTOGENÉTICAS

10- CLASIFICACION

CATACLASTICA

ANÁLISIS QUÍMICO ☐ 363

MIGMATITA ☐ 364