

2B

1.

E. N. «ADARO»  
 LABORATORIO DE MICROPALACONTOLÓGIA  
 ESTRATIGRAFICA

X 22-36-AD-CD-125.-

LEV. Residuo formado por granos de cuarzo, - fragmentos calizos, de arenisca y de óxidos de hierro y muy escasos restos de tubos calizos y Globigerinoides?.

Indeterminada. ¿Mioceno?.

X 22-36-AD-CD-145.-

LEV: Residuo formado por granos de cuarzo y escaso óxido de hierro.

Indeterminada.

X 22-36-AD-CD-260.-

~~LEV. Residuo formado por granos de cuarzo, - Radiolarios, espículas y una fauna pobre de Foraminíferos (entre ellos formas resedimentadas del Cretácico). - Se determinan Cibicides ungerianus, C. lobatulus, Fulmenia bulloides, Cassidulina laevigata, Uvigerina, Bolivina, Globigerinas aplastadas, Orbulinas rotas, Globigerina bulloides, Globigerinoides bisphaericus, Globorotalia obesa, G. dutertrei, G. gavaldae, algo de yeso y glauconita.~~

~~Mioceno superior.~~

X 22-36-AD-CD-557.-

LEV. Residuo formado por granos de cuarzo, - fragmentos calizos, algo de óxido de hierro y frecuentes restos de espículas, Nummulites (*N. perforatus*), Truncorotaloides rohri, Globigerina boweri, Globorotalia bull-

brookii, G. bolivariana, Anomalina, Ostrácodos, Tritaxia,  
G. aragonensis.

Eoceno medio (Zona de *G. bullbrooki*)

X 21-36-AD-OD-561.-

LEV. Residuo formado por granos de cuarzo, -  
fragmentos de arenisca, frecuentes restos de Globorotalia spinulosa, G. lehneri, G. bullbrooki, Globigerina semis, Cibicides, Spiroplectammina, Sagena, Seracina, Bolivina, Radiolarios, espiculas.

Eoceno medio (Zona de *T. rohri*)

X 22-36-AD-CD-567.-

LEV. Residuo formado por granos de cuarzo, -  
junto con fragmentos calizos, óxidos de hierro, restos -  
de Globorotalia af. spinulosa, G. bullbrooki, G. lehneri,  
Globigerina sp., Heterolepa, Stilostomella, Bolivina, Bi-  
generina, Tritaxia.

Eoceno medio (Zona de *T. rohri*)

X 22-36-AD-CD-569.-

LEV. Residuo formado casi exclusivamente por  
granos de cuarzo, algunos fragmentos calizos, tubos piri-  
tizados y muy escasos restos de Anomalina, Clavulina, -  
Rotalia?, Globigerinidos.

Terciario. Parece Eoceno.

X 22-36-AD-CD-579.-

LEV. Residuo formado por fragmentos calizos,  
algo de cuarzo y gran cantidad de Nummulites (*N. perfora-*  
*tus* entre ellos), junto con restos de Gasterópodos, Rota-  
lia, Elphidium, Globorotalia bullbrooki, G. af. spinulo-  
sa, Globigerapsis, Cibicides.

Eoceno medio. (Zona de *T. rohri*)

X 22-36-AD-CD-586.-

LEV. Residuo formado por fragmentos calizos, (cristales alargados de calcita), cuarzo, algo de pirita oxidada. No se observan fósiles.

Indeterminada. Parece Eoceno.

X 22-36-AD-CD-1023.-

LEV. Residuo formado por fragmentos de margas sin deshacer, granos de cuarzo, algo de óxido de hierro y escasos restos de Globotruncanas (*G. contusa*, *G. linneiana*, *G. rosetta*), *Rugoglobigerina*, *Lagenaria*, *Gumbelia*, *Spiroplectammina*,

Maestrichtiense medio-superior.

X 22-36-AD-CD-1025.-

LEV. Residuo formado por fragmentos de arenisca sin deshacer, frecuente cuarzo y fragmentos calizos y restos mal conservados de Eponides, Textularia, Spiroplectammina, Foraminíferos arenáceos, Gumbelina, Tritaxia, Globotruncana, Clavulina, *Rugoglobigerina*,

Cretácico superior. Probable Maestrichtiense.

X 22-36-AD-CD-1101.-

LEV. Residuo formado por fragmentos de margas arenosas sin deshacer, granos de cuarzo, algo de óxido de hierro, tubos calizos, fragmentos calizos. No se observan fósiles.

Indeterminada.