

MUESTRAS SUELTAS

Repetido - Biu
287

L.T. Biomicrita algo arcillosa y arenosa llena de Globigerinidos junto con Radiolarios y espículas. Se observan Globigerina, Globorotalia, Globoquadrina, Praeorbulina, junto con escasos restos de Miliolídos, Bolivina, algo de glauconita y óxidos de hierro.

Mioceno inferior. Burdigaliense?

Repetido - Biu
309

X L.T. Arenisca margosa, con algo de esparita, óxidos de hierro y glauconita y escasos restos de Textuláridos, Miliolídos, Valvulínidos, Lituolídos.

Indeterminada. Facies del Cretácico inf

Repetido - Biu
379

L.T. Doloesparita algo arcillosa con muy escaso óxido de hierro. No se observan fósiles.

Indeterminada. Probable Dogger.

Repetido - Bior

~~x~~ 549

L.T. Biomicrita arenosa llena de restos de Operculina, Amphistegina, Algas junto con fragmentos de Gypsínidos, Briozos, Lepidocyclina, Elphidium, Rotálidos, Globigerínidos, Tetraláridos.

Mioceno

Repetido - Bior

~~x~~ 551

L.T. Biomicrita arenosa con abundantes restos de Amphistegina, Lamelibranquios, Operculina, Gypsina, Rotálidos, Briozos, Globigerínidos, Elphidium, Valvulínidos.

Mioceno

~~x~~ 639

L.T. Biomicrita recristalizada con frecuentes restos de Lamelibranquios y Equinodermos y escasos restos semiborrados - por la recristalización de Algas, Nummofallotia, Stomiosphaeras?

Senonense

Repetido - Bior

747

L.T. Biomicrita arenosa con algo de glauconita y abundantes restos de Equinodermos, Lamelibranquios, Algas, Amphistegina, Operculina, junto con Globigerina, Globorotalia, Globigerinoides?, Miliolídos, Rotálidos, Radiolarios, Ostrácodos, Elphidium, Valvulínidos, Lagénidos, Briozos.

Mioceno