ESTUDIO MICROPALEONTOLOGICO DE 26 MUESTRAS DE LA HOJA 24-36 (CARAVACA) CORTE 12 : LOS CALARES

Anteponer a la notación de muestra el código 24-36/AD/BA

240.- Caliza intraclástica: intramicrita con partes de intraesparita. Los intraclastos son de talla muy variable, desde pisolitos a muy finos. Acompañan escasos restos de Gaudryina, Glomospira, Ostrácodos, Algas (entre ellos Thaumatoporella)
Edad indeterminada. Microfacies del Sinemuriense.

241.- Caliza intraclástica: intramicrita con esparita. Los intraclastos son de talla muy variada, desde pisolitos a muy finos. Acompañan restos escasos de Briozoos, Favreina, Gasterópodos, Equinodermos y Algas (que forman los nodulos pisolíticos).

242.- Caliza intraclástica: intramicrita con esparita y restos poco frecuentes de Lamelibranquios, Gasterópodos, Equinodermos, Ostrácodos, Nodosaria, Reophax, Gaudryina y nodulos de Algas (como pisolitos pequeños).

243.- Caliza intraclástica: partes de intramicrita y partes de intraesparita con micrita. Restos poco frecuentes de Lamelibranquios, espículas, Equinodermos, Hemigordius, Ostrácodos, Gaudryina y gruesos nódulos de Algas (como pisolitos pequeños).
Edad indeterminada. Microfacies del Sinemuriense.

244.- Caliza intraclástica: intramicrita con esparita y restos poco frecuentes de Equinodermos, espículas, Ostrácodos, Nodosaria, Gaudryina, Gasterópodos y Lamelibranquios.
Edad indeterminada. Microfacies del Sinemuriense.

245.- Caliza intraclástica: intraesparita con micrita y escasos restos de Gasterópodos, Equinodermos, Gaudryina, Ostrácodos y Glomospira.
Edad indeterminada. Microfacies del Sinemuriense.

246.- Caliza oolítica: intraesparita con micrita. Los intraclastos son pseudo oolíticos. Acompañan escasos restos de Gasterópodos, Gaudryina y Equinodermos.
Edad indeterminada. Microfacies del Sinemuriense.

247.- Caliza intraclástica pisolítica: intraesparrudita con micrita. Los intraclastos son de talla muy variable, desde muy finos a pisolitos pequeños y en algunas partes la roca es micrítica. Restos escasos de Gasterópodos, Gaudryina y Algas.
Edad indeterminada. Microfacies del Sinemuriense.

248.- Caliza intraclástica: intramicrita con esparita y frecuentes restos de Equinodermos, Lamelibranquios, Lenticulina, Ostrácodos, Lingulina, Gaudryina, Nodosaria y Hemigordius.
Lias. Microfacies de Transición entre la sinemuriense y Charmutiense.

249.- Caliza margosa: intramicrita e intraesparita con abundantes restos menudos de Equinodermos y algunos de Gaudryina, Nodosaria, Lingulina y Ostrácodos.
Lias. Microfacies de transición entre Sinemuriense y Charmutiense.
Probable Charmutiense inferior.

250.- Caliza margosa: intraesparita e intramicrita con abundantes restos menudos de Equinodermos y algunos de Gaudryina, Ostrácodos, Lingulina, Lenticulina y Nodosaria.
Lias. Microfacies del Charmutiense inferior.

251.- Caliza cristalina: bioesparita con intraclastos y algo de glauconita. Abundantes restos de Equinodermos; frecuentes Lamelibranquios y algunos Ostrácodos, Gasterópodos, Lenticulina, Lingulina, Saracenaria y Hemogordius.
Lias. Microfacies del Charmutiense.

252.- Caliza margosa: biomicrirrudita con abundantes restos de Braquiopodos, Crinoides Ammonites, Ostrácodos y Lagénidos (Marginulina, Nodosaria, Lingulina, Lenticulina, Saracenaria y algunos Hemigordius, Ammodiscus, Ophthalmidium. L
Lias medio. Charmutiense. - Domeriense.

253.- Caliza margosa: micrita arcillosa, llena de particulas de carbonato hialinas y con limo de cuarzo (5-10%). Escasos restos menudos. Ostrácodos, Lagénidos muy pequeños fragmentos cortos de protoconchas y fibrosferas.
Edad indeterminada. Microfacies del Lias superior.

254.- Caliza margosa: micrita arcillosa llena de particulas de carbonato hialinas con 5% de limo y restos menudos poco frecuentes de Radiolarios, Ostrácodos y espículas.
Edad indeterminada. Microfacies del Lias Superior.

255.- Caliza margosa: micrita arcillosa, llena de particulas de carbonato hialinas, algo de limo (1%), abundantes calcisferas y escasos Ostrácodos, pequeños Lagénidos y Radiolarios.
Edad indeterminada. Microfacies del Lias superior.

256.- Marga: micrita arcillosa, llena de particulas de carbonato hialinas, algo de cuarzo (2-5%) abundantes calcisferas y restos muy escasos de Ostrácodos y Lagénidos muy pequeños. Indeterminada. Microfacies típica del Lias Superior.

257.- Marga: micrita arcillosa, llena de partículas de carbonato hialinas, algo de cuarzo (2%), abundantes calcisferas, frecuentes particulas de pirita y escasos Ostrácodos y Lagénidos muy pequeños.
Indeterminada. Microfacies típica del Lias superior.

258.- Caliza margosa: micrita arcillosa con algo de limo (1%) - frecuentes Ostrácodos calcisferas, Ammonites y fragmentos de Equinodermos y algunos Lagénidos y Globochaete.
Edad Indeterminda. Microfacies del Bajociense. _ Lias Sup

259.- Caliza margosa: micrita arcillosa con escasísimo limo (menos del 1%), frecuentes calcisferas, Ammonites y fragmentos de Equinodermos y algunos Ostrácodos, Lenticulina, Globochaete y Radiolarios.
Indeterminada. Microfacies del Bajociense.

260.- Caliza margosa microcristalina: micrita con escasísimo limo, frecuentes Ammonites, Ostrácodos, fragmentos de Equinodermos, Globochaete alpina, protoconchas y calcisferas.
Dogger

261.- Caliza intraclástica muy fina: intraesparita fosilífera - con micrita y algo de limo (1%); abundantes fragmentos de Equinodermos, frecuentes Ammodiscidos y algunos Lagénidos, Ostrácodos y protoconchas. Dogger

262.- Caliza margosa: micrita arcillosa con 3% de limo, abundantes protoconchas y fragmentos menudos de Equinodermos, y algunos Globochaete y lenticulina.
Dogger
Jurasico indeterminado

263.- Caliza margosa: biomicrita de Pithorella sphaerica, con algunos Globochaete (Hedbergella), Ostrácodos y Nodosaria.
Cretacico. Probable Aptiense-Albense

264.- Caliza margosa: micrita con limo (3%) abundantes peletes - apenas diferenciados y restos menudos poco frecuentes: Nodosaria, Ostrácodos y espículas.
Edad indeterminada.

265.- Marga calcarea: micrita arcillosa con escasisimo limo de - cuarzo y sin fósiles identificables.
Edad indeterminada.

Madrid, 7 de febrero de 1972

José Luis Saavedra