

25-36 AD-VE 103.-

El residuo de levigación está formado por trozos de margas.

Se determinan:

Globigerina venezolana

Globigerapsis sp.

Truncorotaloides topilensis

Globorotalia bullbrooki

Globorotalia spinulosa

Luteciense

25-36 AD-VE 108.-

El residuo de levigación está formado por trozos de margas.

Se determinan:

Radiolarios

Globoquadrina dehiscens

Globigerinita dissimilis

Globoquadrina conglomerata

Vulvulina spinosa

Globigerinoides trilobus

Globorotalia acrostoma

Mioceno inferior

25-36 AD-VE 163.-

El residuo de levigación está formado por trozos de caliza algo arcillosa.

Se determinan:

Globotruncana arca

Globotruncana fornicata

Globotruncana stuartiformis

Globotruncana elevata

Campaniense

25-36 AD-VE 176.-

El residuo de levigación está formado por trozos de margas, algo arenosa.

Se determinan:

Globigerinita dissimilis

Globigerina venezuelana

Globoquadrina dehiscens

Siphonina reticulata

Mioceno inferior

25-36 AD-VE 180.-

El residuo de levigación está formado por trozos de caliza arcillosa.

-20911

Se determinan:

Vaginulina bradyi

Bolivina arta

Spiroplectamina wrighti

Cassidulina subglobosa

Trifarina bradyi

Globigerinita dissimilis

Mioceno

(probable inferior-medio)