

20932

Albino Informe 988



73.

25-37 AD-BA 30 T

Biomicrota con filamentos.

Equinodermos

Toarciense-Oxfordiense

25-37 AD-BA 33 T

Biomicrota con filamentos.

Toarciense-Oxfordiense

25-37 AD-BA 154 L

El residuo de levigación está formado por trozos de caliza arcillosa. Fósiles mal conservados. Hay resedimentación del Cretácico.

Se determinan:

Globorotalia centralis

Globigerina venezuelana

Globorotalia bullbrooki

¿Globigerapsis?

Luteciense

20932

25-37 AD-BA 155 T

Pelmicrita arenosa.

Globigerinas

Anomalínidos

Discocyclina

Operculina

Gypsinidos

Solenomeris

Eoceno

25-37 AD-BA 156 L

El residuo de levigación está formado por trozos de caliza arcillosa.

Se determinan:

Globotruncana cónica

Globotruncana lineiana

Globotruncana fornicata

Globotruncana contusa

Globotruncana stuarti

Maastrichtiense

20932

25-37 AD-BA 157L

El residuo de levigación está formado por trozos de margas.

Se determinan:

Radiolarios

Moluscos

Ostrácodos

Ammodiscus tenuissimus

Lenticulina sp.

posible Cretácico-inferior

25-37 AD-BA 158 L

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Moluscos

Ostrácodos

Radiolarios

Lenticulina sp.

posible Cretáceo inferior

20932

25-37 AD-BA 159T

Biomicrota con Radiolarios.

Lagénidos

Ammonites

Epistomina

Esquistos de Moluscos

Malm (Kimmeridgiense probable)

25-37 AD-BA 160T

Micrita llena de filamentos

Ostrácodos

Dogger-Malm

25-37 AD-BA 161T

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

Radiolarios (esféricos y discoidales)

¿Dyctiomitra?

Dentalina sp.

Ammodiscus aff. siliceus

Lenticulina

20932

Dorothia sp.

probable Cretácico inferior

25-37 AD-BA 162 L

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

Globotruncana ex. gr. linneiana

Globotruncana fornicata

Globotruncana concavata

Globotruncana coronata

Santoniense

25-37 AD-BA 163 L

El residuo de levigación está formado por trozos de marga. Fósiles escasos y mal conservados.

Se determinan:

tubos calizos de Algas

Radiolarios

Ticinella roberti

20932

Hedbergella trocoidea

Albiense-Cenomanense inferior

(probable Albiense) pudiera ser más mo
derno con resedimentación.

25-37 AD-BA 164 T

Biomicrota.

Radiolarios

Esquirlas finas

Jurásico superior

25-37 AD-BA 165 L

El residuo de levigación está formado por trozos
de marga. Fósiles escasísimos.

Se determinan:

Lenticulina sp.

Ostrácodos

Edad indeterminada

20932

25-37 AD-BA 166 L

-8-

El residuo de levigación está formado por trozos de marga. Fósiles escasísimos.

Se determinan:
Se determinan:

tubos calizos de Algas
Radiolarios
Equinodermos
Ammodiscus sp.
Ammodiscus sp.

Edad indeterminada
Edad indeterminada

25-37 AD-BA 169 L

25-37 AD-BA 167 L

El residuo de levigación está formado por trozos de marga. Fósiles escasísimos.
El residuo de levigación está formado por trozos de marga y de calizas margosas. Fósiles escasísimos.

No se aprecian restos fósiles.

Se determinan:

Edad indeterminada
Lenticulina sp.

25-37 AD-BA 170 T Edad indeterminada

Biomierita llena de prismas de *Il. ceramus*.

25-37 AD-BA 168 L

Ostrácodos

El residuo de levigación está formado por trozos de marga. Fósiles escasísimos.

Equinodermos

Lagénidos

Lituolidae?

Thaumatoporella parvovesiculífera

Lias medio-superior-Jurásico

20932

25-37 AD-BA 171 L

El residuo de levigación está formado por trozos de marga. Fósiles escasísimos.

Se determinan:

Radiolarios

Ostrácodos

Lenticulina sp.

Edad indeterminada

25-37 AD-BA 172 L

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

tubos calizos de Algas

Ostrácodos (muy raros)

Edad indeterminada

25-37 AD-BA 173 L

El residuo de levigación está formado por trozos de marga. Fósiles muy escasos.

20932

Se determinan:

Lenticulina sp.

Moluscos

Equinodermos

Edad indeterminada

25-37 AD-BA 174 L

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

Globotruncana elevata

Globotruncana linneiana

Globotruncana conica

Globotruncana fornicata

Campaniense

25-37 AD-BA 175 L

El residuo de levigación está formado por trozos de marga y de caliza.

Se determinan:

tubos calizos de Algas

Edad indeterminada

20932

25-37 AD-BA 176 L

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

tubos calizos de Algas
Ticinella roberti
Hedbergella trocoidea
Gyroidinoides gracillima
Gaudryina aff. dividens
Glomospira sp.

Albiense

25-37 AD-BA 177 T

Micrita de aspecto lacustre.

Ostrácodos
Gasterópodos

Edad indeterminada

25-37 AD-BA 178 L

El residuo de levigación está formado por trozos de marga:

20932

20932

Se determinan:

25-37 AD-BA 181 L

tubos calizos de Algas

El residuo de ~~Radiolaria~~ *Radiolaria* está formado por trozos
de marga. Edad indeterminada

Se determinan:

25-37 AD-BA 179 L

Pseudotextularia elegans fructicosa
El residuo de levigación está formado por trozos
de marga arenosa. *Globotruncana stuarti*
Globotruncana formicata

Se determinan: *Globotruncana conica*

tubos calizos de Algas

Edad indeterminada25-37 AD-BA 182 T25-37 AD-BA 180 L

El residuo de levigación está formado por trozos
de marga. *Globigerinas*

Globorotalias (Truncorotalias)

Se determinan:

Paleoceno Eoceno inferior*Globorotalia formosa gracilis*25-37 AD-BA 183 T *Globigerina soldadoensis angulosas**Globorotalia formosa**Biomicrota* de *Globotruncanas*.Cuisiense

20932

Heterohelícidos

Globigerina (G. cf. rugosa)

Globotruncana cf. stuarti

Cretácico superior (Maestrichtiense)

25-37 AD-BA 184 L

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

Globotruncana linneiana

Globotruncana ventricosa

Globotruncana calciformis

Globotruncana fornicata

Campaniense superior-Maestrichtiense inferior

25-37 AD-BA 186 L

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

La microfauna es una mezcla de formas del Lutecien se (Truncorotaloides topilensis, Globorotalia bullbrooki, Globorotalia bolivariana,), del Priaboniense superior-Oligoceno (Globigerina rohri, Bulimina palmerae,...) y del Mioceno (Virgulina schreibersiana, Bolivina arta ,

Mina Japona 990

20932

D

25-37-AD-BA-185.-Clasificación: Cuarzo-diabasa albitizadaTextura: Subofítica de grano fino a medioComposición mineral:

m. principales: plagioclasa (albita-oligoclasa), anfíbol (actinolita-hornblenda).

m. accesorios: prehnita, cuarzo, m. metálico (magnetita-ilmenita), clorita, apatito, carbonato, sericita, feldespato potásico.

Observaciones: Plagioclasa (albita-oligoclasa) en cristales tabulares alterados a sericita. El componente máfico está transformado por completo en anfíbol verde (actinolita-hornblenda) y en clorita, desprendiéndose magnetita pulverulenta. Intercrecimientos micrográficos entre cuarzo y feldespato potásico-Prehnita muy abundante sustituyendo a las plagioclases y rellenando cavidades. Cuarzo intersticial. Mineral metálico (ilmenita o magnetita) en largos cristales. Apatito, frecuente, en secciones aciculares y exagonales. Carbonato escaso.

La plagioclasa originalmente más cálcica ha sufrido un incremento de sodio pasando a oligoclasa sódica o albita.

20932

Globoquadrina dehiscens,).

25-37 AD-BA 187 L

El residuo de levigación está formado por trozos de caliza arcillosa arenosa. Fósiles mal conservados.

Se determinan:

Globotruncana fornicata

Globotruncana linneiana

Senonense

25-37 AD-BA 188 T

Micrita algo arenosa.

Globigerinas

Anomalínidos

Heterohelícidos

Globorotalidos

Paleoceno (probable Danense)

25-37 AD-BA 189 T

Biopelmicricrita con filamentos.

20932

Lagénidos

Moluscos

Equinodermos

Dogger

25-37 AD-BA 190 L

El residuo de levigación contiene abundante yeso.

Se determinan:

tubos calizos de Algas

Gasterópodos

Ammonia beccari

Helvetiense-Plioceno

25-37 AD-BA 191 L

El residuo de levigación está formado por trozos de calizas margosas algo arenosas. Los restos fósiles son escasísimos y se encuentran en pésimo estado de conservación.

20932

Se determinan:

Globigerina sp.

Edad indeterminada

25-37 AD-BA- 192 T

Biomierita.

Radiolarios

Saccocoma

Lagénidos

Ostrácodos

Globochaete alpina

Eothrix alpina

Stomiosphaera

Moluscos

Equinodermos

Titónico

25-37 AD-BA 193 L

El residuo de levigación está formado por trozos de marga. Los fósiles son escasos.

20932

Se determinan:

tubos calizos de Algas

Hedbergella amabilis

Biticinella breggiensis

Albiense superior

(puede ser más moderno con resedimentación).

25-37 AD-BA 194 T

Biomicrota.

Radiolarios

Globochaete alpina

Ostrácodos

Lagénidos

Ammonites

Stomiosphaera minutissima

Eothrix alpina

Saccocoma

Moluscos

Equinodermos

Titónico

20932

25-37 AD-BA 195 L

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

tubos calizos de Algas

Rotalipora apenninica

Planomalina buxtorfi

Praeglobotruncana stephani

Hedbergella planispira

Cenomanense inferior

25-37 AD-BA 196 L

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

La microfauna es una mezcla del Luteciense (Globo rothalia bullbrooki, Globorotalia centralis, Globigerina sp., Nummulites sp.,) y del Albense-Cenomanense (Hedbergella planispira, Globigerinelloides bentonensis, Hedbergella trochoidea,).

20932

25-37 AD-BA 197 T

Biomicrota.

Naunoconus steinmanini

Radiolarios

Ostrácodos

Espículas

Radiolas de Equinodermos

Naunoconus cf. colomi

Neocomiense

25-37 AD-BA 198 L

El residuo de levigación está formado por trozos de marga.

Se determinan:

Globotruncana fornicata

Globotruncana elevata

Globotruncana stuartiformis

Campaniense



20932

25-37 AD-BA 199.L

El residuo de levigación está formado por trozos de arenisca.

Se determinan:

Uvigerina mexicana
Globigerina tripartita
Bulimina palmerae
Globigerinita dissimilis
Globigerina venezuelana
Cassidulina subglobosa horizontalis
Clavulinoides szaboi
Plectofrondicularia inaequalis.

Oligoceno-Aquitaniense

20932

25-37 AD-BA 299T-

Pelmicrita

Se observan:

Characeas

Edad indeterminada

(posible Mioceno terminal-
-Plioceno)