

26-37
AD KA

Tbeder 'L'

20933

26-37-AD-KA-201.-

LEV. Formado por granos de pizarra y arenisca de color rojizo con esquistosidad limonitizada. No se observan restos fósiles.

Triásico

26-37-AD-KA-206.-

LEV. Formado por granos de caliza y pizarra de color verde oscuro con esquistosidad limonitizada. No se observan restos fósiles.

Triásico

26-37-AD-KA-210.-

LEV. Formado por granos de caliza y pizarra de color verde oscuro con esquistosidad limonitizada. No se observan restos fósiles.

Triásico

26-37-AD-KA-221.-

LEV. Formado por granos de pizarra, limonita de color rojizo oscuro con esquistosidad. No se observan restos fósiles.

Triásico

26-37-AD-KA-228.-

LEV. Formado por granos de arenisca, limonita de color rojizo y amarillo. No se observan restos fósiles.

Triásico

20933

26-37-AD-KA-229.-

LEV. Formado por granos margosos de color amarillento, de aspecto brechoide. No se observan restos fósiles.

Triásico

26-37-AD-KA-233.-

LEV. Formado por granos de arenisca, limonita de color rojo. No se observan restos fósiles.

Triásico

26-37-AD-KA-235.-

LEV. Formado por granos de pizarra y cuarzo de colores rojizo, violado, con limonita. No se observan restos fósiles.

Triásico

26-37-AD-KA-247.-

LEV. Formado por granos de pizarra y arenisca de color amarillento y poca esquistosidad. No se observan restos fósiles.

Triásico

26-37-AD-KA-248.-

LEV. Formado por grano de arenisca de color verdoso-amarillento con esquistosidad. No se observan restos fósiles.

Triásico

26-37-AD-KA-253.-

LEV. Formado por granos de arenisca y pizarras de color amarillo oscuro con limonita. No se observan restos fósiles.

Triásico

26-37-AD-KA-260.-

LEV. Formado por granos de pizarra y arenisca de

20933

color violado y esquistosidad limonitizada. No se observan res--
tos fósiles.

Triásico