



Fot.nº1.- Panorámica de los materiales del tramo inferior del edificio mioceno en la Cañada de la Barranca. En primer término depósitos caóticos del deslizamiento de Casas del Palmer.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno



Fot.nº10.- Detalle del apilamiento de las coladas "aa" de la fotografía anterior.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno



Fot.nº11.- Panorámica del apilamiento de coladas basálticas del tramo superior del edificio mioceno en Punta de Avalos. En la derecha de la fot. se observan niveles de almagre y sedimentos en la pista a Punta Llana.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno



Fot.nº12.- Detalle de los depósitos sedimentarios intercalados entre el apilamiento de coladas de la fotografía anterior.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno



Fot.nº13.- Contacto entre las coladas basálticas del tramo superior del edificio mioceno y las coladas pliocenas (P), en las proximidades de S.S. de La Gomera.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno y Plioceno



Fot.nº14.- Detalle de coladas basálticas "aa" atravesadas por diques del tramo superior del edificio mioceno en la carretera de S.S. a Hermigua.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno



Fot.nº15.- Panorámica de la ladera norte del barranco de La Sabina. Coladas basálticas (C) del tramo superior del edificio mioceno con niveles piroclásticos intercalados (i). Al techo planchón discordante (P) del edificio plioceno.

Fotografía: J.A. Gómez


Edad: Mioceno y Plioceno



Fot.n216.- Panorámica de la ladera sur del barranco de la Villa. Se observa la disposición periclinal de las coladas que constituyen el tramo superior del edificio mioceno. En la parte inferior se observan numerosos diques subparalelos a la dirección del barranco.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno



Fot.nº17.- Panorámica de la ladera norte del barranco de Avalos. Apilamiento de coladas basálticas del tramo superior del edificio mioceno. Al techo se observa el planchón discordante (P) de las fonolitas del Roque de Aluce (A).

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno



Fot.nº18.- Detalle de la intrusión fonolítica de Aluce. El roque está intruyendo en un cono de piroclastos basálticos atravesado por diques (d).

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno



Fot.nº19.- Panorámica, aguas abajo, del barranco de Avalos. Coladas basálticas del tramo superior del edificio mioceno.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno




Fot.n92.- Panorámica del apilamiento de coladas basálticas con intercalaciones de brechas (tramos medio y superior del edificio mioceno), en la cabecera del barranco de Aguajilva.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno

Fot. nº20.- Panorámica de la intrusión fonolítica de El Herrero.
Fotografía: J.A. Gómez





Fot.nº21.- Contacto entre las coladas basálticas alteradas del tramo superior del edificio mioceno (C) y las coladas pliocenas (P), al techo. A la izquierda de la fotografía se observa el cono piroclástico que hay junto al muelle de S.S.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno y Plioceno



Fot.nº222.- Detalle de las coladas basálticas pliocenas discordantes sobre el cono piroclástico de la fotografía anterior, junto al muelle de S.S.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno y Plioceno



Fot. nº23. - Detalle de niveles piroclásticos salícos debajo de un almagra intercalados entre el apilamiento de coladas basálticas del tramo superior del edificio mioceno. Carretera S. S-Hermigua, (Km 4,4).

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno



Fot.nº24.- Detalle de niveles piroclásticos sálicos entre las coladas pliocenas en la zona de Cuevas Blancas.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Plioceno



Fot.nº25.- Detalle de niveles piroclásticos mixtos (hidromagmáticos en la base y estrombolianos encima) en la Degollada de La Gerode.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Plioceno



Fot.n926.- Detalle del contacto entre los depósitos estrombolianos (e) e hidromagmáticos (h) en la pista de S.S. a Playa de Avalos.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Plioceno



Fot.nº27.- Depósitos piroclásticos mixtos (estrombolianos-hidromagnéticos) con desarrollo de estructuras de tipo "sandwaves" y en la base cineritas grises. Pista de S.S. a Playa de Avalos, zona de La Cabezada.

Fotografía: J.A. Gómez


Edad: Plioceno



Fot.nº28.- Panorámica de la discordancia entre las coladas pliocenas y miocenas en las proximidades de la cantera activa de FOCSA (Barranco Hondo).-

Fotografía: J.A. Gómez


Edad: Mioceno-Plioceno



Fot.nº29.- Detalle de un nivel de fanglomerados en el afloramiento de la fotografía anterior.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno



Fot.nº3.- Panorámica de la ladera norte del barranco del Águila. Apilamiento de coladas basálticas atravesadas por diques del edificio mioceno. A la izquierda de la fot. se observan conos enterrados.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno



Fot.nº930.- Panorámica de las coladas pliocenas en la zona de Ayamosna.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Plioceno



Fot.nº31.- Contacto entre las coladas pliocenas (P), masivas y potentes, y el apilamiento de coladas basálticas del tramo superior del edificio mioceno.

Fotografía: J.A. Gómez.

Edad: Mioceno y Plioceno



Fot.nº32.- Detalle de diques básicos alabeados encajando en piroclastos y escorias rojizas, en la divisoria entre los barrancos de La Sabina y del Aguila.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Plioceno



Fot.nº33.- Panorámica de los depósitos de deslizamientos gravitacionales con intercalaciones de arenas eólicas en Punta Llana. Se observan retazos de la rasa erbanense, en la zona costera.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Cuaternario



Fot.nº34.- Detalle de los depósitos de arenas eólicas bajo los coluviones en la costa próxima a Punta Llana.

Fotografía: J.A. Gómez


Edad: Cuaternario



Fot.n935.- Detalle de coluviones adosados al relieve de coladas miocenas en la crtra.
S.S.- Hermigua.

Fotografía: MA T.Ruiz

Edad: Cuaternario



Fot.nº36.- Detalle de niveles de escorias basálticas de tonos grises y marrones debajo de una capa blanca de material pumítico. Al techo se observa un paleosuelo de color marrón-rojizo. Crtra. de San Sebastián al Páramo Nacional.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno

• SIN UBICACIÓN EN EL PLANO DE SITUACIÓN DE MUESTRAS.
NI EN FICHAS MCC1.



Fot.nº37.- Detalle de un nivel de sedimentos al techo de las coladas basálticas
miocenas en la crtra. de San Sebastián al Parador Nacional.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno

• Sin UBICACIÓN EN EL PLANO DE SITUACIÓN DE MUESTRAS.
NI EN FICHAS MCC1



Fot.nº4.- Panorámica del apilamiento de coladas basálticas con niveles piroclásticos intercalados del tramo superior del edificio mioceno. Laderas del barranco de la Villa.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno



Fot.nº5.- Detalle de un cono enterrado atravesado por numerosos diques del edificio mioceno, en las proximidades del Embalse de Chejelipes.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno



Fot.nº26.- Detalle de un cono enterrado atravesado por diques del edificio mioceno en la zona de divisoria entre barranco Seco y barranco de la Villa. Alguno de los diques se abre y da lugar a "sills" e intrusivos.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno



Fot.nº27.- Detalle del apilamiento de coladas basálticas del tramo superior del edificio mioceno, en las proximidades de Playa Zamora.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno



Fot.n28.- Apilamiento de coladas basálticas del tramo superior del edificio con niveles de almagre y diques subverticales. En primer término se observan los depósitos del deslizamiento de Puntallana.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno



Fot.nº9.- Apilamiento de coladas basálticas del tramo superior del edificio mioceno con intercalaciones piroclásticas y diques subverticales. Acantilado al norte de Playa Zamora.

Fotografía: J.A. Gómez

Edad: Mioceno