

Pizarras grises arcillosas, a veces silíceas. Frecuentes niveles muy finos (desde milimétricos a centimétricos) de lechos detríticos con granoselección, laminación cruzada y estructuras de carga. Niveles de grauvacas de grano fino.

Pizarras grises y grises oscuras arcillosas, con nódulos y finos niveles carbonatados. Abundante fauna de Goniatites. Diseminación abundante de sulfuros en lechos y nódulos. Fuerte crenulación.

Pizarras grises arcillosas, a veces silíceas, con frecuentes niveles muy finos (desde milimétricos a métricos) de grauvacas de grano fino con granoselección, laminación cruzada, estructuras de carga y cantos blandos pizarrosos. Nódulo carbonatado a 530,50 m.

Pizarras grises oscuras arcillosas, con nódulos y finos niveles carbonatados. Fauna de Goniatites. Diseminación de sulfuros en fina lluvia, lechos y nódulos.

Cineritas grises y verdes

Tufitas grises

Pizarras tufíticas grises oscuras, con diseminación de sulfuros en lechos, nódulos y lluvia

Tufitas grises

Tobas grises verdosas, porfídicas, de grano medio

Pizarras tufíticas grises oscuras con diseminación de sulfuros en cubos, lechos y nódulos

Stockwork. MASA VALVERDE

Tobas grises verdosas, porfídicas, de grano fino a medio, cloritizadas, con diseminación esporádica de sulfuros tipo Stockwork

Pizarras tufíticas negras con diseminación de sulfuros a techo

Alternancia de pizarras tufíticas negras y tufitas grises

SONDEO AUTONOMIA 11 (A-11)

COLUMNA ESQUEMATICA

Escala 1/2.000

Fig. 5