



Pizarras grises arcillosas, a veces silíceas.

Niveles detríticos (desde centimétricos a milimétricos) con granoselección y estructuras de carga.

Escasa diseminación de pirita en lentejuelas.

Pizarras grises arcillosas, con nódulos y finos niveles carbonatados. Diseminación de sulfuros en lechos y nódulos. Abundante fauna de Goniatites. Fuerte crenulación. A partir de la cota 324 m. aparecen niveles detríticos centimétricos con granoselección y estructuras de carga, y un nivel de 60 cm. de grauvacas de grano fino a medio.

Tufitas grises alternando con cineritas verdes y algún nivel tobáceo fino a aglomerático.

Cineritas verdosas y grises verdosas.

Tufitas grises con alguna intercalación tobácea.

Cineritas grises, verdes y verde-amarillentas.

Pizarras moradas con un nivel métrico de cineritas verdes.

Cineritas verdes

Tobas esquistosas de grano fino a medio, grises verdosas.

Tufitas verdes y grises, con pequeños niveles tobáceos.

Cineritas beige y verdes, y tobas verdes esquistosas de grano medio.

Tufitas grises y grises verdosas con bandeado centimétrico de tobas verdes. Nivel aglomerático de 70 cm. con clastos cineríticos.

Tobas ácidas esquistosas, verdosas, porfídicas de grano medio, con granoselección. A muro cineritas verdes.

Cineritas moradas.

Cineritas verdes.

Tufitas grises bandeadas con un nivel de pizarras tuffíticas grises oscuras bandeadas.

Cineritas verdes bandeadas con algún nivel de cineritas moradas.