



Pizarras grises arcillosas con frecuentes niveles milimétricos y centimétricos de grauvacas de grano fino con granoselección, laminación cruzada, estructuras de carga y cantos blandos pizarrosos.

Pizarras grises arcillosas con nódulos y finos niveles carbonatados. Fauna de Goniatites. Diseminación de sulfuros en lechos y nódulos. Algún nivel de grauvaca de grano fino.

Pizarras grises arcillosas con frecuentes niveles milimétricos y centimétricos de grauvacas de grano fino con granoselección, laminación cruzada y estructuras de carga. Niveles carbonatados a 196 y 199 m.

Pizarras grises arcillosas con nódulos y finos niveles carbonatados. Diseminación de sulfuros en cubos y nódulos. Algún nivel de grauvaca de grano fino.

Pizarras grises arcillosas con frecuentes niveles milimétricos y centimétricos de grauvacas de grano fino a medio con granoselección, laminación cruzada y estructuras de carga. Nódulos carbonatados a las cotas 274 y 315 m. Fuerte crenulación.

Pizarras grises oscuras arcillosas, con nódulos y finos niveles carbonatados. Fauna de Goniatites. Diseminación de sulfuros en lechos y nódulos.

Pizarras grises arcillosas, con frecuentes niveles (desde milimétricos a métricos) de grauvacas de grano fino a medio con granoselección, estructuras de carga y cantos blandos pizarrosos. Fuerte crenulación.

Pizarras negras con abundante diseminación de sulfuros en fina lluvia, lechos y nódulos. Fuerte crenulación.

Tufitas apizarradas grises con intercalaciones de pizarras tufíticas grises oscuras, con diseminación de sulfuros. A techo 5 cm. de cineritas grises.

Tobas grises de grano fino a medio con intercalaciones milimétricas de pizarras negras. Stockwork.

Sulfuros Masivos. MASA VALVERDE.

Stockwork.

Tufitas grises y cineritas verdes.

Sulfuros Masivos. MASA VALVERDE.

Stockwork.

Sulfuros Masivos. MASA INFERIOR. A techo pizarras negras grafitosas (20 cm.)

Pizarras tufíticas grises oscuras. Fuerte crenulación.