

Pizarras grises arcillosas, con frecuentes niveles (desde milimétricos a métricos) de grauvacas de grano fino a medio con granoselección, laminación cruzada, estructuras de carga y cantos blandos pizarrosos.

Pizarras grises arcillosas, a veces silíceas, con nódulos y finos niveles carbonatados. Posible fauna de Goniatites. Diseminación de sulfuros en fina lluvia, lechos y lentejuelas. Fuerte crenulación.

Pizarras grises arcillosas, con frecuentes niveles (desde milimétricos a métricos) de grauvacas de grano fino a medio, con granoselección, laminación cruzada, estructuras de carga y cantos blandos pizarrosos. Alguna diseminación de sulfuros en lentejuelas. Nódulos carbonatados a 222 y 245 m.

Pizarras grises y grises oscuras arcillosas, con nódulos y finos niveles carbonatados. Abundante fauna de Goniatites. Diseminación de sulfuros en fina lluvia, lechos y nódulos.

Cineritas verdes y verde amarillentas con alguna diseminación de sulfuros en cubos.

Tufitas grises silicificadas, con restos de cineritas verdes, que pasan a tufitas grises verdosas con diseminación de sulfuros, con paso gradual a la masa de sulfuros.

Sulfuros Masivos. MASA VALVERDE

Stockwork.

Sulfuros Masivos. MASA INFERIOR

Alternancia, en tránsito gradual, de tufitas grises, pizarras tufíticas grises oscuras y tobas grises verdosas, porfídicas, de grano fino. A techo hay diseminación de sulfuros y también en las tufitas; a cota 775,85 m. hay un tramo de pirita masiva de 20 cm., con muro fallado. Fuerte crenulación.

SONDEO AUTONOMIA 18 (A-18)

COLUMNA ESQUEMATICA

Escala 1/2.000

Fig. 5