



Pizarras grises arcillosas con frecuentes niveles detríticos milimétricos y centimétricos, con estructuras de carga y laminación cruzada.

Pizarras grises arcillosas con nódulos y finos niveles carbonatados. Posible fauna de Goniatites piritizados. Diseminación de sulfuros en nódulos.

Pizarras grises arcillosas, a veces silíceas, con frecuentes niveles (desde milimétricos a métricos) de grauvacas de grano fino con granoselección, laminación cruzada y estructuras de carga.

Pizarras grises arcillosas, con nódulos y finos niveles carbonatados. Fauna de Goniatites. Diseminación de sulfuros en fina lluvia y en nódulos.

Pizarras grises arcillosas con frecuentes niveles (desde milimétricos a métricos) de grauvacas de grano fino a medio con granoselección, laminación cruzada, estructuras de carga y cantos blandos pizarrosos.

Pizarras grises y grises oscuras arcillosas, con nódulos y finos niveles carbonatados. Abundante fauna de Goniatites. Diseminación de sulfuros en lechos, nódulos y en fina lluvia.

Tufitas grises y cineritas verdes silicificadas. Hacia techo diseminación de sulfuros.

Tobas grises verdosas esquistosas, porfídicas, de grano fino a medio, silicificadas y cloritizadas, con intercalaciones de pizarras tufíticas grises oscuras (l.m.) con diseminación de sulfuros.

Cineritas verdes y grises verdosas, silicificadas, con algún bandeado esporádico de pizarras tufíticas grises oscuras.

Tufitas grises alternando con pizarras tufíticas grises oscuras.

Cineritas verdes.

Pizarras tufíticas grises oscuras. Fuerte crenulación.

Sulfuros Masivos. MASA VALVERDE.

Stockwork.

Sulfuros Masivos. MASA VALVERDE.

Stockwork.

Alternancia en tránsito gradual, de tufitas grises, pizarras tufíticas y tobas porfídicas, grises verdosas, de grano fino. A cota 733,68 m. las pizarras tufíticas tienen diseminación de sulfuros en lechos y un tramo de 0,55 m. de azufrón. Silicificación y fuerte crenulación.

SONDEO AUTONOMIA 20 (A-20)
COLUMNA ESQUEMATICA

Escala 1/2.000

Fig. 5