

Pizarras grises arcillosas, a veces silíceas, con frecuentes niveles detríticos milimétricos y centimétricos, con laminación cruzada y estructuras de carga.

Pizarras grises arcillosas con nódulos y finos niveles carbonatados. Fauna de Goniatites. Diseminación de sulfuros en lechos y nódulos. Fuerte crenulación.

Pizarras grises arcillosas con frecuentes niveles (desde milimétricos a métricos) de grauvacas de grano fino a medio, con granoselección, estructuras de carga y cantos blandos. Nódulos carbonatados a cotas 246, 254, 256, 258, 293 y 300 m.

Pizarras grises y negras con nódulos y finos niveles carbonatados. Fauna de Goniatites. Abundante diseminación de sulfuros en fina lluvia, lechos y nódulos. Fuerte crenulación. A 313 m. un nivel de grauvaca de grano medio.

Cineritas verdes y tufitas grises verdosas.

Pizarras tufíticas grises oscuras con diseminación de sulfuros.

Sulfuros masivos. MASA VALVERDE.

Stockwork. MASA VALVERDE.

Pizarras tufíticas negras con abundante diseminación de sulfuros en fina lluvia, lechos y lentejuelas.

Stockwork.

Pizarras negras con abundante diseminación de sulfuros en fina lluvia, lechos y lentejuelas.

Sulfuros masivos. MASA VALVERDE.

Tufitas y pizarras tufíticas grises oscuras.

Cineritas verdes y verde amarillentas.

Jaspes blancos, rosados, grises, verdes y rojizos con pirita diseminada en cubos, venas y nódulos.

Cineritas grises verdosas y verde amarillentas.

Jaspes blancos, grises y rosados, con pirita diseminada en cubos y venas.

Cuarzo abundante en jaspes grises y blancos y tufitas grises.

Tufitas grises con hilillos de pizarras tufíticas

Cineritas verdes

Cuarzo abundante en cineritas verdes y tufitas grises

Cineritas grises y verdes. Fuerte crenulación.

Pizarras tufíticas negras con diseminación de sulfuros en cubos, lechos y nódulos.

Cuarzo abundante en pizarras tufíticas negras y tufitas grises.

Tufitas grises y verdes

SONDEO AUTONOMIA 21 (A-21)

COLUMNA ESQUEMATICA

Escala 1/2.000

Fig. 5