



Pizarras grises arcillosas, a veces silíceas, con frecuentes niveles (desde milimétricos a métricos) de grauvacas de grano fino con granoselección, laminación cruzada, estructuras de carga y cantos blandos pizarrosos.

Pizarras grises arcillosas con finos niveles carbonatados y detríticos carbonatados.

Pizarras grises arcillosas con frecuentes niveles (desde milimétricos a métricos) de grauvacas de grano medio con granoselección, laminación cruzada, estructuras de carga y cantos blandos pizarrosos.

Pizarras grises y negras con finos niveles carbonatados. Fauna de Goniatites. Diseminación de sulfuros en fina lluvia, lechos y nódulos. A 189 m. un nivel de grauvaca de grano fino.

Pizarras grises arcillosas, con frecuentes niveles (desde milimétricos a métricos) de grauvacas de grano fino, con granoselección, laminación cruzada, estructuras de carga y cantos blandos pizarrosos.

Pizarras grises y grises oscuras con nódulos y finos niveles carbonatados. Fauna de Goniatites. Abundante diseminación de sulfuros en fina lluvia, lechos y nódulos. Dos niveles de grauvaca de grano fino.

Pizarras grises arcillosas, con frecuentes niveles (desde milimétricos a métricos) de grauvacas de grano fino a medio, con granoselección, estructuras de carga y cantos blandos. Entre 365 y 372 m. pizarras grises oscuras con diseminación de sulfuros y finos niveles carbonatados.

Pizarras grises y negras con nódulos y finos niveles carbonatados. Fauna de Goniatites. Abundante diseminación de sulfuros en fina lluvia, venillas, lechos, nódulos y cubos.

Tobas grises porfídicas de grano fino.

Cinieritas verdes (1,40 m.) en tránsito a tobas grises verdosas de grano fino y niveles de jaspes rojos con magnetita bandeada y sulfuros en las diaclasas.

Sulfuros masivos. MASA VALVERDE

Pizarra tufítica negra, milonitizada.

Pizarras moradas con radiolarios.

Cinieritas verdes.

Tufitas grises.

Cinieritas grises, grises verdosas y verdes, en tránsito gradual.

**SONDEO AUTONOMIA 22 (A-22)**

COLUMNA ESQUEMATICA

Escala 1/2.000