



Pizarras grises arcillosas, a veces silíceas, con frecuentes niveles (desde milimétricos a métricos) de grauvacas de grano fino a medio con granoselección, laminación cruzada, estructuras de carga y cantos blandos pizarrosos. Nódulos y niveles carbonatados a 96, 125, 131, 152, 159, 165, 168, 178, 201 y 211 m.

Pizarras grises y negras con nódulos y finos niveles carbonatados. Fauna de Goniatites. Abundante diseminación de sulfuros en lechos, nódulos y cubos.

Pizarras grises arcillosas con frecuentes niveles (desde milimétricos a centimétricos) de grauvacas de grano fino a medio. Granoselección.

Pizarras grises arcillosas con nódulos carbonatados.

Pizarras grises arcillosas con frecuentes niveles (desde milimétricos a métricos) de grauvacas de grano fino a medio con granoselección, estructuras de carga y cantos blandos pizarrosos.

Pizarras grises arcillosas con nódulos carbonatados.

Pizarras grises arcillosas con frecuentes niveles (desde milimétricos a métricos) de grauvacas de grano fino con cantos blandos.

Pizarras grises arcillosas con nódulos y finos niveles carbonatados. A muro (818 m.) pizarras negras con abundante pirita diseminada en fina lluvia, lechos y nódulos.

- Tufitas verdosas
- Stockwork.
- Tobas verdes y grises verdosas, claritizadas, esquistosas, porfídicas, con niveles de jaspes rojos (1 a 3 m.) con hematites en tramos de 2 a 5 cm. y pirita diseminada en piritoedros. También cineritas verdosas.
- Stockwork.
- Pizarras negras.

Sulfuros masivos. MASA VALVERDE.

Pizarras tufíticas grises.

Pizarras tufíticas grises con niveles de tobas de grano fino, tufitas grises y cineritas grises verdosas, con radiolarios, algún nódulo carbonatado y escasa diseminación de sulfuros.

SONDEO "AUTONOMIA 23" (A-23)

COLUMNA ESQUEMATICA

Escala 1/2.000