


Pizarras grises arcillosas.

Frecuentes niveles muy finos (desde milimétricos a centimétricos) de lechos detríticos con estructuras de carga, laminación cruzada y laminación convoluta.

Niveles de grauvaca de grano fino a medio con cantos blandos pizarrosos.

Diseminación de pirita en cubos y en lentejuelas.

Diabasa verdosa, porfídica, grano medio.

Pizarras grises arcillosas, a veces silíceas, con nódulos y finos niveles carbonatados. Fauna de Goniatites. Diseminación de sulfuros en finos lechos y en nódulos. Fuerte crenulación.

Cineritas verdes amarillentas con diseminación de sulfuros en cubos.

Pizarras tufíticas grises oscuras con vetillas de cuarzo y diseminación de sulfuros en lechos y lentejuelas. Intercalaciones de tufitas apizarradas grises.

Tufitas grises con bandeado tectónico producido por la crenulación de 2ª fase. Intercalaciones de tobas finas verdosas.

Tufitas grises verdosas bandeadas, aglomeráticas a techo. Al centro tobas finas bandeadas.

Pizarras tufíticas grises y grises oscuras, bandeadas. Diseminación de sulfuros en lechos.

Tufitas grises claras bandeadas.

Pizarras tufíticas grises oscuras bandeadas. Abundante diseminación de sulfuros en lechos y en nódulos. A 724 m. hay 30 cm. de azufrón.

Tufitas grises. Fuerte crenulación.

Tobas grises aglomeráticas, con clastos de cinerita beige.

Cineritas beige, tipo jabonoso, bandeadas, que pasan a cineritas grises.

Tufitas grises.

Cineritas grises con intercalaciones tobáceas que poseen clastos cineríticos angulosos.

Pizarras moradas con radiolarios.

Cineritas verdes con nodulillos de jaspe.

Pizarras moradas con radiolarios.

Cineritas verdes con niveles de radiolarios.

Tufitas grises, a veces bandeadas

Cineritas verdes.

Tufitas grises

Pizarras tufíticas grises oscuras.

# SONDEO AUTONOMIA 4 (A-4)

## COLUMNA ESQUEMATICA

Escala 1/2.000

Fig. 6