

Pizarras grises arcillosas, a veces silíceas.

Frecuentes niveles muy finos (desde milimétricos a centimétricos) de lechos detríticos con granoselección, laminación cruzada y estructuras de carga.

A las cotas 60,60 m., 63,05 m. y 108 m. aparecen niveles milimétricos carbonatados de forma lenticular con esquistosidad de fractura, alternando con los niveles detríticos.

Niveles de grauvaca de grano fino a medio con cantos blandos pizarrosos.

Diseminación de pirita en cubos y en lentejuelas.

Crenulación de 2ª fase

Pizarras grises arcillosas, a veces silíceas, con nódulos y finos niveles carbonatados. Diseminación de sulfuros en finos lechos y en nódulos. Abundante fauna de Goniatites. Fuerte crenulación.

Cineritas grises y grises-verdosas.

Chert blanco.

Tufitas grises con niveles de radiolarios.

Pizarras tufíticas grises con pirita diseminada en cubos, finos lechos y nódulos. A veces bandeadas.

Tufitas grises claras bandeadas.

Pizarras moradas con radiolarios.

Cineritas verdes claras bandeadas con alguna intercalación tobácea fina. A muro son cineritas verdes y grises bandeadas.

Tufitas grises y cineritas verdes, bandeadas.

Tufitas y pizarras tufíticas grises bandeadas.

Tufitas grises-claras, ligeramente bandeadas con intercalaciones de tobas finas y de pizarras tufíticas.

Alternancia de pizarras tufíticas y tufitas-apizarradas, a veces bandeadas, grises oscuras y grises claras. Diseminación de sulfuros en cubos, lentejuelas y en finos lechos.

Pizarras tufíticas grises oscuras con abundante diseminación de sulfuros en lechos y en nódulos.

SONDEO AUTONOMIA 5 (A-5)

COLUMNA ESQUEMATICA

Escala 1:2.000

Fig. 6