

Pizarras grises, arcillosas y silíceas.

Frecuentes niveles muy finos (desde milimétricos a centimétricos) de lechos detríticos con laminación convoluta y estructuras de carga.

A las cotas 77,80 m., 160 m. y 188 m. aparecen niveles milimétricos carbonatados de forma lenticular con esquistosidad de fractura, alternando con los niveles detríticos.

Diseminación de pirita en finos lechos o en lentejuelas.

Pizarras grises arcillosas, a veces silíceas, con nódulos y finos niveles carbonatados. Diseminación de sulfuros en finos lechos y en nódulos. Fauna de Goniatites. Fuerte crenulación.

Tufitas grises con 10 cm. de cineritas verdes a techo.

Cineritas verdoso-amarillentas que pasan a verdosas y grises-verdosas.

Tufitas grises con intercalaciones centimétricas tobáceas.

Tobas ácidas, porfídicas, de grano grueso, grises y gris-verdosas, cloritizadas y silicificadas.

Pizarras tufíticas grises-oscuras.

Tobas porfídicas, de grano medio-grueso, grises y gris-verdosas, silicificadas. Frecuentes intercalaciones de pizarras tufíticas.

Pizarras tufíticas grises-oscuras con pirita en lechos y en nódulos.

Tufitas verdosas y grises-verdosas.

Pizarras tufíticas-grises.

Tobas ácidas, porfídicas, esquistosas, de aspecto fluido, gris-verdosas, cloritizadas, con frecuentes intercalaciones de pizarras tufíticas.

Cineritas verdes, de aspecto jabonoso (posible nivel acompañante de las pizarras moradas).

Pizarras tufíticas grises, con diseminación de pirita en cubos.

Tufitas apizarradas, grises-claras, algo bandeadas, con diseminación de sulfuros en cubos e intercalaciones tobáceas finas. A muro (705 m.) pasa gradualmente a pizarras tufíticas.

Tobas ácidas grises, porfídicas, de grano fino a medio, algo silíceas.

Tufitas grises.

Tobas ácidas grises, porfídicas, de grano fino a medio, algo silíceas.

Pizarras tufíticas, grises con diseminación de sulfuros en finos lechos y nódulos.

Tobas ácidas, esquistosas, grises-verdosas, porfídicas, de grano medio a grueso, en ocasiones cloritizadas y con intercalaciones lávicas.

Pizarras tufíticas grises, con diseminación de sulfuros en lechos y nódulos.

Tobas ácidas, esquistosas, grises-verdosas, porfídicas, de grano medio a grueso, en ocasiones cloritizadas y con intercalaciones lávicas silicificadas.

SONDEO AUTONOMIA 6 (A-6)

COLUMNA ESQUEMATICA

Escala 1: 2.000

Fig. 6