

Pizarras grises, arcillosas y silíceas.

Frecuentes niveles muy finos (desde milimétricos a centimétricos) de lechos detríticos con granoselección, estructuras de carga, estructuras almohadilladas y laminación cruzada.

A las cotas 60, 139, 162, 170, 192, 201, 212 y 237 m. aparecen niveles milimétricos carbonatados de forma lenticular con esquistosidad de fractura, alternando con los niveles detríticos.

Pizarras grises arcillosas, a veces silíceas, con nódulos y finos niveles carbonatados. Diseminación de sulfuros en lechos, nódulos y lluvia. Abundante fauna de Goniatites. En ocasiones fuerte crenulación. Nivel de grauvaca de grano medio con cantos blandos.

Cineritas verdes con diseminación de sulfuros en nódulos

Tufitas grises

Pizarras tufíticas con diseminación de sulfuros en lentejuelas

Tobas ácidas grises, porfídicas, de grano medio, silíceas.

Pizarras tufíticas grises oscuras con diseminación de sulfuros en lechos y en nódulos.

Tobas ácidas, porfídicas, de grano medio, grises-verdosas, a veces silíceas.

Pizarras tufíticas grises oscuras con diseminación de pirita en nódulos.

Tufitas grises-verdosas.

Cineritas verdes con niveles de radiolarios (nivel acompañante de las pizarras moradas).

Pizarras grises oscuras con nódulos y finos niveles carbonatados. Fauna de pequeños Goniatites. Niveles de grauvaca de 20 cm. Fuerte crenulación. Abundantísima diseminación de sulfuros en lechos, nódulos y fina lluvia de pirita.

Tufitas grises, a veces bandeadas, con intercalaciones de pizarras tufíticas grises oscuras y de tobas finas grises verdosas.

SONDEO AUTONOMIA 7 (A-7)

COLUMNA ESQUEMATICA

Escala 1: 2.000

Fig. 6